

Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant le médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par le pharmacien ou le droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conserver cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Lifo-Scrub®

Qu'est-ce que Lifo-Scrub® et quand doit-il être utilisé ?

Lifo-Scrub® est un savon liquide désinfectant pour la désinfection hygiénique des mains. Il est utilisé uniquement sur prescription médicale pour la désinfection et le lavage du corps entier avant les opérations.

Quand Lifo-Scrub® ne doit-il pas être pris/utilisé ?

Ne pas utiliser Lifo-Scrub en cas d'hypersensibilité connue ou soupçonnée à un ingrédient. Lifo-Scrub ne doit pas être utilisé sur les yeux, autour des yeux ou sur les oreilles (en particulier en cas de lésions du tympan). Éviter tout contact avec les muqueuses, le cerveau et les méninges.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Lifo-Scrub® ?

Consultez votre médecin, pharmacien(ne) ou droguiste avant d'utiliser Lifo-Scrub®.

Lifo-Scrub® ne doit en aucun cas entrer en contact avec les yeux en raison du risque de lésions visuelles. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. En cas d'irritation, de rougeur ou de douleur oculaire ou de troubles de la vision, consultez immédiatement un médecin.

Des cas graves de lésions cornéennes permanentes (lésions de la surface oculaire) nécessitant potentiellement une greffe de cornée ont été signalés chez des patients dont les yeux ont été accidentellement en contact avec des médicaments similaires pendant des interventions chirurgicales sous anesthésie générale (sommeil profond rendant le patient insensible à la douleur).

Ne pas utiliser Lifo-Scrub® chez les personnes ayant présenté des réactions d'hypersensibilité aux colorants azoïques, à l'acide acétylsalicylique (par exemple, aspirine, alcacyle) ainsi qu'à des produits contre le rhumatisme et des analgésiques (inhibiteurs des prostaglandines). Étant donné que Lifo-Scrub® peut provoquer des brûlures chimiques chez les prématurés et les nouveau-nés, utiliser Lifo-Scrub® avec la plus grande prudence dans ces cas-là. Éviter les quantités excessives et veiller à ce que la solution ne s'accumule pas dans les plis cutanés.

Ce médicament contient un parfum contenant de l'alpha-isométhyl ionone, de l'amyl cinnamal, de l'alcool amylcinnamylique, de l'alcool anisal, de l'alcool benzylique, du benzoate de benzyle, du cinnamate de benzyle, du benzyle (2-hydroxybenzoate), de l'aldéhyde cinnamique, du 3-phénylprop-2-en-1-ol, du citral, du citronellol, de la coumarine, de l'eugénol, de l'extrait d'Evernia Furfuracea, de l'extrait d'Evernia Prunastri, du farnésol, du géraniol, du 2-benzylidèneoctanal, de l'hydroxycitronellal, de l'isoeugénol, du D-



limonène, du linalol, du méthyl-2-octynoate, du butylhydroxytoluène (E 321) qui peuvent provoquer des réactions allergiques.

Le butylhydroxytoluène (E 321) peut provoquer des irritations cutanées localisées (p. ex. dermatite de contact), des irritations des yeux et des muqueuses.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si vous

- souffrez d'autres maladies,
- avez des allergies ou
- prenez d'autres médicaments (y compris ceux que vous avez achetés vous-même) ou si vous les appliquez par voie cutanée !

LIFO-SCRUB® peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement ?

En cas de grossesse ou d'allaitement, vous ne devez utiliser Lifo-Scrub® qu'après avoir consulté votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Comment utiliser LIFO-SCRUB® ?

Lavage et désinfection hygiénique des mains: Mouiller les mains à l'eau, les laver avec 5 ml de Lifo-Scrub® pendant au moins 1 minute, puis les rincer soigneusement et les sécher.

Si vous avez les mains sales, ne les lavez pas avec du savon avant l'utilisation de Lifo-Scrub®, car cela risquerait de diminuer l'efficacité du produit.

Lavage et désinfection du corps entier: Si votre médecin vous a prescrit une désinfection du corps avant une opération, vous pouvez réaliser celle-ci avec Lifo-Scrub® soit chez vous, soit à l'hôpital, en procédant de la façon suivante :

Utilisez Lifo-Scrub® comme un savon liquide. Si vous prenez une douche, laissez agir Lifo-Scrub® pendant 2 minutes avant de rincer.

Si possible, se laver deux fois la veille de l'opération avec Lifo-Scrub® : Commencer par le visage, puis se laver tout le corps avec Lifo-Scrub®, de haut en bas, en insistant tout particulièrement sur le nez, les creux axillaires, la région génitale et le nombril. Laisser agir Lifo-Scrub® pendant 2 minutes au moins, puis rincer entièrement et répéter le lavage avec Lifo-Scrub®, en commençant cette fois par les cheveux. Rincez-vous soigneusement et séchez-vous avec une serviette propre.

Conformez-vous à la posologie indiquée dans la présente notice ou prescrite par le médecin. Si vous pensez que l'effet du médicament est trop faible ou au contraire trop fort, veuillez consulter votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Quels effets secondaires LIFO-SCRUB® peut-il provoquer ?

Lifo-Scrub® peut provoquer des maladies cutanées allergiques telles que dermatite (inflammation de la peau), démangeaisons, sécheresse cutanée, rougeurs. Il peut provoquer des réactions d'hypersensibilité des organes respiratoires, en particulier chez les patients souffrant d'asthme, d'urticaire (éruption cutanée chronique) ou d'hypersensibilité à l'acide acétylsalicylique et à d'autres antirhumatiques et analgésiques. Une sensibilité accrue à la lumière du soleil peut survenir. Brûlures cutanées (brûlures chimiques) chez le



nouveau-né en cas d'utilisation inappropriée (voir rubrique «Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Lifo-Scrub®?»).

Autres effets secondaires potentiels dont la fréquence n'est pas connue:

- Lésions cornéennes (lésion de la surface oculaire) et lésions oculaires permanentes, y compris une déficience visuelle permanente (après exposition accidentelle de l'œil lors d'interventions chirurgicales sur la tête, le visage et le cou) chez les patients sous anesthésie générale (sommeil profond rendant le patient insensible à la douleur).

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si vous remarquez des effets secondaires. Cela s'applique aussi en particulier aux effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice.

À quoi faut-il encore faire attention ?

N'utiliser Lifo-Scrub® que jusqu'à la date inscrite sur l'emballage (EXP).

Remarques concernant le stockage

Conserver à une température inférieure à 30 °C. Tenir hors de la portée des enfants.

Le tube de 50 ml est destiné à un usage unique.

Remarques complémentaires

Votre médecin, pharmacien ou droguiste vous fournira de plus amples informations.

Ces personnes disposent des informations spécialisées détaillées.

Que contient LIFO-SCRUB® ?

1 ml de solution contient :

Principes actifs

40 mg de digluconate de chlorhexidine.

Excipients

Oxyde de lauramine, macrogol-60-cetostearylalcoylglycol, alcool isopropylique, parfum (contient : alpha-isométhyl ionone, de l'amylnonanal, de l'alcool amylcinnamyl, de l'alcool anisal, de l'alcool benzylique, du benzoate de benzyle, du cinnamate de benzyle, du benzyle (2-hydroxybenzoate), de l'aldéhyde cinnamique, du 3-phénylprop-2-en-1-ol, du citral, du citronellol, de la coumarine, de l'eugénol, de l'extrait d'Evernia Furfuracea, de l'extrait d'Evernia Prunastri, du farnésol, du géraniol, du 2-benzylidèneoctanal, de l'hydroxycitronellal, de l'isoeugénol, du D-limonène, du linalol, du méthyl-2-octynoate, du butylhydroxytoluène (E 321)), ponceau 4R (E 124), eau purifiée, hydroxyde de sodium, gluconolactone (E 575).

Numéro d'autorisation

53905 (Swissmedic).



Où obtenez-vous LIFO-SCRUB® ? Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?

En pharmacie et droguerie, sans prescription médicale.

Disponible en tubes de 50 ml, flacons de 100 ml, 500 ml, 1000 ml. Bidon de 5 l.

Titulaire de l'autorisation

B. Braun Medical AG, Sempach

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en Mars 2025 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

