

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

SIMILASAN Arnica plus, globules

Médicament homéopathique

Quand SIMILASAN Arnica plus est-il utilisé ?

Selon la conception homéopathique, *SIMILASAN Arnica plus* peut être utilisé en cas de foulures, entorses, luxations, contusions, hématomes, blessures aux endroits sensibles (coupures, piqûres), douleurs musculaires (crampes), brûlures, coups de soleil, troubles postopératoires (douleurs liées à la plaie), troubles après fractures.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée exclusivement sur les principes de l'homéopathie.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?

Les plaies étendues, profondes et très souillées, ainsi que les morsures et les piqûres, exigent un traitement médical (risque de tétanos). De même, une consultation médicale s'impose si une plaie ne régresse pas au bout de quelque temps ou en cas de non-cicatrisation dans les 7 jours. Consulter également le médecin si les bords de la plaie sont fortement rougis, si elle enfle brusquement, si elle est très douloureuse ou si elle s'accompagne de fièvre (risque de septicémie).

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si *SIMILASAN Arnica plus* peut être pris simultanément.

Quand SIMILASAN Arnica plus ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution ?

Ne convient pas aux enfants de moins de 2 ans.

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité connue à *Arnica montana* (arnica), *Calendula officinalis* (souci) ou d'autres composacées (asteracées) (p. ex. *Achillea millefolium* [millefeuille], armoise, etc.)

En cas d'aggravation générale (p.ex. fièvre) un médecin doit immédiatement être consulté.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication !).

SIMILASAN Arnica plus peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement ?



Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Comment utiliser *SIMILASAN Arnica plus* ?

Si votre médecin n'a pas fait une autre prescription:

Enfants (âgés de plus de 2 ans), adolescents et adultes: 7 globules par prise.

- **Troubles aigus:** 6 fois par jour, plus souvent en cas de violents douleurs (voire toutes les demi-heures).
- **Pour parachever la guérison:**
3 fois par jour.

Mode d'emploi:

- Laisser fondre les globules dans la bouche.
- Les globules peuvent être pris même si vous êtes à jeun.

Ne convient pas aux enfants de moins de 2 ans.

Le temps d'action d'un médicament peut varier d'une personne à l'autre. C'est pourquoi il est conseillé d'administrer une nouvelle prise lorsque l'effet de la préparation diminue ou les troubles reviennent.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. En l'absence de l'amélioration escomptée lors d'un traitement chez l'enfant, veuillez consulter un médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires *SIMILASAN Arnica plus* peut-il provoquer ?

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec *SIMILASAN Arnica plus* et informez-en votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

Aucun effet secondaire de *SIMILASAN Arnica plus* n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné. Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention ?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention <EXP> sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25°C).

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires



Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient *SIMILASAN Arnica plus* ?

1 g de globules contient:

Principes actifs

Arnica montana (HAB) D4 2.500 mg / Calendula officinalis (HAB) D4 2.500 mg / Hypericum perforatum (HAB) D4 2.500 mg / Symphytum officinale (HAB) D6 2.500 mg.

Excipients

Calcii carbonas; Xylitolum (E 967)

1 g correspond à 70-90 globules

Numéro d'autorisation

51362 (Swissmedic)

Où obtenez-vous *SIMILASAN Arnica plus*? Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Conditionnement: 15 g

4,5 g (seulement si fait partie de la pharmacie de voyage et de la pharmacie de poche)

Titulaire de l'autorisation

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en février 2022 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

