

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

***SIMILASAN Arnica plus*, globuli**

Medicamento omeopatico

Quando si usa *SIMILASAN Arnica plus* ?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici *SIMILASAN Arnica plus* può essere usato in caso di slogature, lussazioni, contusioni, ematomi, ferite dei tessuti molli (dovute a tagli o punture), dolori muscolari, ustioni, scottature solari, disturbi post-operatori (dolore della ferita), disturbi dovuti a fratture ossee.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa esclusivamente sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Le ferite estese, molto contaminate e profonde, come anche i morsi e le ferite da punta richiedono un trattamento medico (pericolo di tetano). Rivolgersi, inoltre, al medico se le dimensioni della ferita tendono a non ridursi o se la ferita non si rimargina nel giro di 7 giorni. Lo stesso vale se il margine della ferita sono molto arrossati, o la ferita comincia improvvisamente a gonfiarsi e a far molto male o se compare febbre (pericolo di setticemia).

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere *SIMILASAN Arnica plus*.

Quando non si può assumere *SIMILASAN Arnica plus* e quando la sua somministrazione/il suo uso richiede prudenza?

Non indicato per bambini piccoli sotto i 2 anni.

Non usare in caso di ipersensibilità nota a: Arnica montana (arnica), Calendula officinalis (calendula) o altre composite (Asteraceae) (ad es. Achillea millefolium (achillea), artemisia ecc.)

Se lo stato generale dovesse peggiorare (p.es. febbre), bisogna consultare immediatamente un medico.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa)

Si può assumere *SIMILASAN Arnica plus* durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza



dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare *SIMILASAN Arnica plus*?

Salvo diversa prescrizione medica, attenersi alla seguente posologia:

Bambini (sopra i 2 anni), adolescenti e adulti: 7 globuli per ogni somministrazione.

- ***Disturbi acuti***: 6 volte al giorno. In caso di dolori forti anche più spesso (fino a ogni mezz'ora).
- ***Per la guarigione***: 3 volte al giorno.

Avvertenze per l'assunzione:

- Far sciogliere in bocca i globuli.
- L'assunzione può avvenire anche a stomaco vuoto.

Non indicato per bambini piccoli sotto i 2 anni.

La durata dell'effetto varia a seconda del soggetto. In generale si consiglia di ripetere la somministrazione del preparato in caso di riduzione dell'effetto o di ripresa dei sintomi.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere *SIMILASAN Arnica plus* ?

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con *SIMILASAN Arnica plus* e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di *SIMILASAN Arnica plus*. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.*

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene *SIMILASAN Arnica plus*?



1 g di globuli contiene:

Principi attivi

Arnica montana (HAB) D4 2.500 mg / Calendula officinalis (HAB) D4 2.500 mg / Hypericum perforatum (HAB) D4 2.500 mg / Symphytum officinale (HAB) D6 2.500 mg

Sostanze ausiliarie

Calcii carbonas; Xylitolum (E 967)

1 g di globuli equivale a 70-90 globuli

Numero dell'omologazione

51362 (Swissmedic)

Dove è ottenibile *SIMILASAN Arnica plus*? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni: 15 g

4,5 g (solo come parte integrante della farmacia da viaggio e della farmacia tascabile)

Titolare dell'omologazione

Similasan AG, CH-8916 Jönen

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel febbraio 2022 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

