

INFORMATION DESTINÉ AUX PATIENTS

Lisez attentivement cette notice. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament. Ce médicament vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien (ou de votre droguiste). Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Buccalin®

Qu'est-ce que Buccaline et quand est-il utilisé?

Buccaline contient les bactéries inactivées de *Haemophilus influenzae*, *Streptococcus pneumoniae*, *Streptococcus haemolyticus* et *Staphylococcus aureus*.

Buccaline est un immunostimulant pour la prophylaxie des refroidissements bactériens chez l'adulte et l'enfant à partir de 2 ans.

Quand Buccaline ne doit-il pas être utilisé?

Buccaline ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité à l'un des composants du produit ou d'intolérance reconnue au lactose.

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise/utilisation de Buccaline?

Ils n'existent pas de données cliniques sur l'efficacité de la Buccaline dans la prophylaxie de la pneumonie. L'utilisation de Buccaline pour la prophylaxie de la pneumonie n'est donc pas recommandée.

En cas de maladies fébriles aiguës, l'utilisation de Buccaline n'est pas recommandée.

La Buccaline contient du lactose.

Si votre médecin vous a diagnostiqué une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Prévenez votre médecin, pharmacien, ou votre droguiste si vous souffrez d'autres maladies; manifestez des allergies; prenez d'autres médicaments (même en automédication).

Buccaline peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Par précaution, on devra éviter de prendre des médicaments pendant la grossesse et l'allaitement. Jusqu'à présent, on ne dispose que d'une expérience très limitée sur l'utilisation de Buccalin chez la femme enceinte. Il n'existe pas non plus d'études suffisantes chez l'animal. Par mesure de précaution, l'utilisation de Buccalin doit être évitée pendant la grossesse et l'allaitement.

Comment utiliser Buccaline?

Avaler les comprimés sans les croquer avec un peu de liquide, de préférence une heure avant le petit déjeuner ou une heure avant le repas de midi.

Enfants entre 2 et 7 ans: 1 comprimé le premier et le deuxième jour, et 2 comprimés le troisième jour.

Adultes et enfants de plus de 7 ans: 1 comprimé le premier jour, 2 comprimés le deuxième jour, et 4 comprimés le troisième jour.

Ne changez pas de votre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Buccaline peut-il provoquer?



Dans de rares cas la prise de Buccaline peut entraîner les effets secondaires suivants :

nausées, vomissements, douleurs abdominales, diarrhée, fièvre, thrombopénie (diminution du nombre de plaquettes dans le sang), stomatite, dermatite, exanthème maculopapulaire, oedème du visage.

Si vous remarquez d'autres effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Cela vaut en particulier pour les effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice.

A quoi faut-il encore faire attention?

Le médicament ne peut être utilisé au-delà de la date de péremption imprimée sur le récipient avec la mention «Exp.». Conservation à température ambiante (jusqu'à 25 °C) et à l'abri de la lumière.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste qui disposent d'une information détaillée destinée aux représentants des professions médicales.

Que contient Buccaline?

Principes actifs

1 comprimé contient: $1,5 \times 10^9$ CFU Haemophilus influenzae inactivés, 1×10^9 CFU Streptococcus pneumoniae inactivés, 1×10^9 CFU Streptococcus haemolyticus inactivés, 1×10^9 CFU Staphylococcus aureus inactivés.

Excipients:

Lactose, bile bovine séchée et nettoyée, Povidon, stéarate de magnésium, Gomme-laque, oxydes de fer, talc.

Numéro d'autorisation

00680 (Swissmedic).

Où obtenez-vous Buccaline? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et droguerie sans ordonnance médicale (D).

1 blister avec 7 comprimés

Titulaire de l'autorisation

Laboratorio Farmaceutico S.I.T.-Specialità igienico terapeutiche S.r.l., Mede, succursale di Chiasso – 6830 Chiasso

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en janvier 2025 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

