

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.  
Questo medicamento le è stato prescritto medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, farmacista o droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza»

## **BUCCALIN**

### **Che cos'è Buccalin e quando si usa?**

Buccalin contiene i batteri inattivati di *Haemophilus influenzae*, *Streptococcus pneumoniae*, *Streptococcus haemolyticus* e *Staphylococcus aureus*.

Buccalin è un immunostimolante impiegato per la profilassi antibatterica delle malattie da raffreddamento in adulti e bambini a partire da 2 anni.

### **Quando non si può assumere/usare Buccalin?**

Buccalin non deve venir usato in caso di ipersensibilità ad uno dei componenti del prodotto o in caso di intolleranza al lattosio.

### **Quando è richiesta prudenza nella somministrazione/nell'uso di Buccalin?**

Non esistono dati clinici sull'efficacia di Buccalin nella profilassi della polmonite. L'uso di Buccalin per la profilassi della polmonite è quindi sconsigliato.

Durante malattie febbrili acute l'uso di Buccalin non è raccomandato.

Buccalin contiene lattosio.

Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicamento.

Informi il suo medico, farmacista o droghiere nel caso in cui soffre di altre malattie, soffre di allergie o assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa)

### **Si può assumere/usare Buccalin durante la gravidanza o l'allattamento?**

Precauzionalmente, si dovrebbe evitare di assumere farmaci durante la gravidanza e l'allattamento.

Ad oggi, l'esperienza sull'uso di Buccalin nelle donne in gravidanza è nulla o molto limitata. Non esistono inoltre studi adeguati sugli animali. Per motivi precauzionali, l'uso di Buccalin deve essere evitato durante la gravidanza e l'allattamento.

### **Come usare Buccalin?**

Ingerire le compresse con un po' di liquido senza masticarle preferibilmente un'ora prima della colazione o un'ora prima del pranzo.

Bambini tra i 2 e i 7 anni: Somministrare 1 compressa rispettivamente il primo e il secondo giorno e 2 compresse il terzo giorno.

Bambini di età superiore a 7 anni e adulti: Somministrare 1 compressa il primo giorno, 2 compresse il secondo giorno e 4 compresse il terzo giorno.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

### **Quali effetti collaterali può avere Buccalin?**



In rari casi l'assunzione del Buccalin può comportare i seguenti effetti collaterali:

nausea, vomito, dolori addominali, diarrea, febbre, trombopenie (diminuzione del numero di piastrine nel sangue), stomatite, dermatite, esantema maculopapillare, ed edema del viso.

Se osservate degli effetti collaterali, contattate il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere. Ciò vale in particolare anche per gli effetti collaterali che non sono elencati in questo foglietto illustrativo.

### **Di che altro occorre tener conto?**

Il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con «Exp» sulla confezione. Conservare a temperatura ambiente (fino a 25 °C) e al riparo della luce

Conservare fuori dalla portata di bambini..

Il suo medico, farmacista o droghiere, che sono in possesso di documentazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

### **Cosa contiene Buccalin?**

1 compressa contiene:  $1,5 \times 10^9$  CFU Haemophilus influenzae inattivato,  $1 \times 10^9$  CFU Streptococcus pneumoniae inattivato (I,II,III),  $1 \times 10^9$  CFU Streptococcus haemolyticus inattivato,  $1 \times 10^9$  CFU Staphylococcus aureus inattivato.

Lattosio, cistifellea bovina essiccata e pulita, Povidone, Stearato di magnesio, gommalacca, ossido di ferro, talco.

### **Numero dell'omologazione**

00680 (Swissmedic)

### **Dove è ottenibile Buccalin? Quali confezioni sono disponibili?**

In farmacia e in drogheria senza prescrizione medica (D).

1 Blister con 7 compresse

### **Titolare dell'omologazione**

Laboratorio Farmaceutico S.I.T.-Specialità igienico terapeutiche S.r.l., Mede, succursale di Chiasso – 6830 Chiasso

**Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel gennaio 2025 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).**

