

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Otrivin Raffreddore Classic Mentolo

Haleon Schweiz AG

Che cos'è Otrivin Raffreddore Classic Mentolo e quando si usa?

Otrivin Raffreddore Classic Mentolo è usato contro diverse forme di raffreddore.

Otrivin Raffreddore Classic Mentolo è destinato all'applicazione locale nel naso, dove provoca una vasocostrizione cui consegue una decongestione della mucosa nasale e della zona faringea adiacente. Ciò permette in caso di raffreddore di respirare più liberamente attraverso il naso. L'effetto inizia entro pochi minuti e dura alcune ore.

Otrivin Raffreddore Classic Mentolo non deve essere utilizzato per periodi superiori a 1 settimana, perché l'uso prolungato può causare danni permanenti alla mucosa (rinitis medicamentosa).

Quando non si può usare Otrivin Raffreddore Classic Mentolo?

Otrivin Raffreddore Classic Mentolo non deve essere utilizzato:

- in caso di ipersensibilità al principio attivo (xilometazolina) o a una delle sostanze ausiliarie della composizione,
- in presenza di mucosa nasale molto secca o infiammata cronicamente (rinitis sicca o rinitis atrophicans),
- in presenza di glaucoma ad angolo chiuso (aumento della pressione intraoculare),
- dopo un intervento transnasale (intervento chirurgico nella zona del naso con esposizione delle meningi).

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Otrivin Raffreddore Classic Mentolo?

L'uso di Otrivin Raffreddore Classic Mentolo può determinare sintomi di aumentata sensibilità quali disturbi del sonno e della vista o vertigini. Consulti per favore il medico se

- questi fenomeni le danno molto fastidio,
- il raffreddore persiste o peggiora, oppure
- subentrano ulteriori disturbi.

Otrivin Raffreddore Classic Mentolo deve essere utilizzato con cautela e solo dopo aver consultato il medico o il farmacista in caso di:

- ipertensione, disturbi cardiovascolari (per es. sindrome del QT lungo). I pazienti che soffrono di sindrome del QT lungo possono sperimentare gravi aritmie cardiache durante l'uso di Otrivin Raffreddore Classic Mentolo;
- iperattività della tiroide;
- diabete (diabetes mellitus);
- ingrossamenti della prostata;
- feocromocitoma (un tumore del surrene).

Non deve utilizzare Otrivin Raffreddore Classic Mentolo se assume inibitori della monoaminossidasi (MAO-inibitori, farmaci antidepressivi) o se li ha assunti negli ultimi 14 giorni.



Inoltre, non lo usi se assume medicinali che stimolano l'umore (antidepressivi triciclici o tetraciclici) o medicinali per la malattia di Parkinson (Levodopa).

Sono stati segnalati casi di sindrome da encefalopatia posteriore reversibile (PRES) e sindrome da vasocostrizione cerebrale reversibile (RCVS) in seguito all'uso di medicinali contenenti principi attivi come quelli contenuti in Otrivin Raffreddore Classic Mentolo. PRES e RCVS sono malattie rare che possono comportare un ridotto apporto di sangue al cervello.

L'uso di Otrivin Raffreddore Classic Mentolo deve essere interrotto immediatamente e deve essere consultato un medico in caso di pressione alta, malattie cardiovascolari, nausea, vomito, forte mal di testa con esordio improvviso, confusione, convulsioni o cambiamenti nella visione. Questi sintomi possono essere segni di una sindrome da encefalopatia posteriore reversibile (PRES) e di una sindrome da vasocostrizione cerebrale reversibile (RCVS).

Otrivin Raffreddore Classic Mentolo non deve essere utilizzato per periodi superiori a 1 settimana, dato che un uso più prolungato può provocare una congestione della mucosa nasale di origine medicamentosa (rinite medicamentosa o rinite atroficans), con sintomi molto simili a quelli di un raffreddore.

Otrivin Raffreddore Classic Mentolo non deve essere utilizzato nei bambini di età inferiore a 12 anni.

Otrivin Raffreddore Classic Mentolo non deve entrare a contatto con la bocca o con gli occhi.

Non superare la posologia consigliata, in particolare negli adolescenti e nei pazienti anziani.

Informazioni sulle sostanze ausiliarie

Benzalkonio cloruro: questo medicinale contiene 0.014 mg di benzalkonio cloruro per nebulizzazione, corrispondente a 0.1 mg/ml. Il benzalkonio cloruro può causare irritazione o gonfiore della mucosa nasale, soprattutto in caso di uso prolungato.

Macrogol glicerolo idrossistearato: può causare irritazione cutanea.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui:

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume o applica esternamente altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!).

Si può usare Otrivin Raffreddore Classic Mentolo durante la gravidanza o l'allattamento?

Non usare Otrivin Raffreddore Classic Mentolo durante la gravidanza. Durante l'allattamento, usare Otrivin Raffreddore Classic Mentolo solo se prescritto dal medico.

Chieda consiglio al medico o al farmacista prima di usare qualsiasi medicinale.

Come usare Otrivin Raffreddore Classic Mentolo?

Salvo diversa prescrizione del medico, valgono le seguenti raccomandazioni concernenti la posologia:

Adulti e adolescenti dai 12 anni: 1 spruzzo in ogni narice. Ripetere all'occorrenza; al massimo 3 somministrazioni al giorno.

L'ultima somministrazione della giornata avverrà poco prima di coricarsi.

Bambini sotto i 12 anni: Il preparato non deve essere utilizzato.

Istruzioni dettagliate per l'uso della forma farmaceutica sono disponibili nelle istruzioni per l'uso alla fine di questo foglio illustrativo.

Otrivin Raffreddore Classic Mentolo non deve essere utilizzato per periodi superiori a 1 settimana.

Se dovesse aver usato una quantità maggiore di Otrivin Raffreddore Classic Mentolo di quella indicata, informi immediatamente il suo medico. Intossicamenti sono possibili in caso di eccessivo sovradosaggio o di assunzione per errore del medicinale.



Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Otrivin Raffreddore Classic Mentolo?

Sospenda l'uso di Otrivin Raffreddore Classic Mentolo e si rivolga immediatamente al medico se lei o suo figlio presenta uno dei segni seguenti, perché potrebbe trattarsi di una reazione allergica:

- difficoltà a respirare o a deglutire
- gonfiore al viso, alle labbra, alla lingua e/o alla gola
- prurito intenso con eruzione cutanea rossa e/o aree rilevate sulla pelle
- battito cardiaco irregolare

I seguenti effetti collaterali possono verificarsi quando si utilizza Otrivin Raffreddore Classic Mentolo:

Comune (riguarda da 1 a 10 persone su 100):

Mucosa nasale secca e irritata, nausea, mal di testa e sensazione locale di bruciore.

Molto raro (riguarda meno di 1 persona su 10 000):

Reazioni allergiche (eruzione cutanea, prurito), offuscamenti transitori della vista, battito cardiaco irregolare o accelerato, congestione della mucosa nasale dovuta ai medicinali (rinite medicamentosa).

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere. Ciò vale soprattutto anche se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Istruzioni di conservazione

Conservare a temperatura ambiente (15–25°C).

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Indicazioni per lo smaltimento

Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Restituite i medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, presso un punto di dispensazione (farmacie, drogherie, studio medico) o nei punti di raccolta. Queste misure aiutano a proteggere l'ambiente.

Ulteriori indicazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Otrivin Raffreddore Classic Mentolo?

Principi attivi

1 ml di Otrivin Raffreddore Classic Mentolo spray nasale, soluzione 0.1% contiene 1 mg xilometazolina cloridrato;

1 nebulizzazione (= 0.14 ml) contiene 0,14 mg xilometazolina cloridrato.

Sostanze ausiliarie

Sodio fosfato monobasico diidrato, sodio fosfato monobasico dodecaidrato, sodio cloruro, benzalkonio cloruro, sodio edetato, levomentolo, cineolo, sorbitolo, macrogol glicerolo idrossistearato, acqua depurata.

Numero dell'omologazione



Dove è ottenibile Otrivin Raffreddore Classic Mentolo? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica:

Spray nasale, soluzione 0.1% da 10 ml (corrispondenti a 60 nebulizzazioni).

Titolare dell'omologazione

Haleon Schweiz AG, Risch.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel febbraio 2025 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

Istruzioni per l'uso

Modo d'uso dello spray nasale con pompetta ad attivazione verticale

1. 	Non tagliare il nebulizzatore. Lo spray nasale è pronto per il primo pompaggio da effettuare prima dell'applicazione.
2. 	Prima dell'uso, pulire bene il naso (soffiare il naso). Togliere il cappuccio protettivo. Prima di usare il prodotto per la prima volta, azionare la pompetta 4 volte per caricarla. Attenzione a non spruzzare negli occhi o in bocca. Per tutte le ulteriori somministrazioni, lo spray nasale è pronto all'uso. Se lo spray nasale non produce uno spruzzo completo e uniforme durante il processo di nebulizzazione, per es. dopo un'interruzione dell'uso, è necessario ricaricare la pompetta premendola 4 volte. Tenere il flacone in posizione verticale, con il pollice in basso e l'erogatore tra due dita (Fig. 2).
3. 	Piegare lievemente la testa in avanti e inserire l'erogatore nella narice. Pompare 1 volta e contemporaneamente respirare, leggermente, attraverso il naso. Ripetere l'applicazione con l'altra narice. Dopo l'applicazione pulire e asciugare l'erogatore con un panno pulito e ricoprire con il cappuccio protettivo. Lo spray nasale deve essere utilizzato da una sola persona, per evitare la possibile diffusione di un'infezione.

