

Information destinée aux patients

Veuillez lire attentivement cette notice, car elle contient des informations importantes pour vous.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit par votre médecin ou vous l'avez acheté sans prescription médicale en pharmacie ou en droguerie. Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien pour en tirer le meilleur bénéfice.

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Microlax®

JNTL Consumer Health II (Switzerland) GmbH

Qu'est-ce que Microlax et quand est-il utilisé?

Microlax est un médicament à usage rectal. L'action conjuguée des composants actifs de Microlax provoque le ramollissement des selles et permet une élimination intestinale aisée en 5 - 20 minutes.

Microlax s'utilise en traitement de courte durée dans les cas de durcissement des selles responsable d'une constipation siégeant au niveau des segments inférieurs du côlon, pour faciliter l'évacuation de matières fécales particulièrement épaisses à la suite d'interventions chirurgicales ainsi que pour aider à la défécation durant la grossesse, après l'accouchement et au cours de l'allaitement.

Quand Microlax ne doit-il pas être utilisé?

Microlax ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité à l'un de ses composants.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Microlax?

Lors d'une utilisation prolongée ou à haute dose peut provoquer des pertes d'eau et de minéraux (potassium) ainsi que des lésions de la muqueuse intestinale avec une augmentation de la paresse intestinale.

Contient de l'acide sorbique (E 200): Peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple dermatite de contact).

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez ou utilisez d'autres médicaments (même en automédication)!

Consulter un médecin si les symptômes persistent ou s'aggravent et ne pas utiliser Microlax pendant une période prolongée.

Microlax peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

L'expérience dont on dispose à ce jour n'a permis de constater aucun risque pour l'enfant lors d'un usage du médicament conforme à sa destination. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, il est préférable de renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement ou de demander l'avis de votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Comment utiliser Microlax?

Casser la pointe.

Adultes et enfants de plus de 3 ans: Chez l'adulte et l'enfant de plus de 3 ans, introduire la totalité de la canule.

Enfants de moins de 3 ans: n'introduire que la moitié de la longueur de la canule. Veuillez respecter l'anneau de repérage sur la canule.



Une goutte du contenu du tube, étalée sur la canule, suffit comme lubrifiant. Certains cas de constipation persistante peuvent nécessiter l'emploi de 2 tubes. L'effet intervient en général après 5 - 20 minutes.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez en parler à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Microlax peut-il provoquer?

Les effets secondaires suivants dont la fréquence est inconnue ont été rapportés avec Microlax (ne peut être estimée sur la base des données disponibles): réaction allergique soudaine et sévère (réaction anaphylactique, y compris choc anaphylactique, se manifestant par exemple par des difficultés respiratoires, un gonflement, une accélération du rythme cardiaque, une transpiration excessive, des étourdissements ou une perte de connaissance), réactions d'hypersensibilité (par ex. démangeaisons, rougeur cutanée, œdème de l'oreille, urticaire), douleur et gêne abdominale, inconfort rectal, selles liquides.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

A quoi faut-il encore faire attention?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15 - 25 °C). Conserver hors de portée des enfants.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ils disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Microlax?

Principes actifs

citrate de sodium dihydraté 90 mg, laurilsulfoacétate de sodium 9 mg, sorbitol 625 mg par 1 ml de solution.

Excipients

acide sorbique (E 200), glycérol, eau purifiée.

Numéro d'autorisation

29869 (Swissmedic).

Où obtenez-vous Microlax? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans prescription médicale.

Récipients unidoses de 5 ml de solution. Présentation: 4, 12 et 50 tubes.

Titulaire de l'autorisation

JNTL Consumer Health II (Switzerland) GmbH, Risch, Domicile: Rotkreuz

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en juin 2026 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

