

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

SIMILASAN Formation du lait maternel, globules

Médicament homéopathique

Quand *SIMILASAN Formation du lait maternel* est-il utilisé ?

Selon la conception homéopathique, *SIMILASAN Formation du lait maternel* peut être utilisé en cas de manque de lait chez la mère allaitante et pour stimuler la montée du lait.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée exclusivement sur les principes de l'homéopathie.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si *SIMILASAN Formation du lait maternel* peut être pris simultanément.

Quand *SIMILASAN Formation du lait maternel* ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution ?

SIMILASAN Formation du lait maternel ne doit pas être utilisé chez les enfants et les hommes.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication !).

***SIMILASAN Formation du lait maternel* peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement ?**

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Comment utiliser *SIMILASAN Formation du lait maternel*?

Chez les femmes qui allaitent, sauf prescription contraire du médecin:

Important manque de lait, montée de lait très tardive: 7 globules 6 fois par jour

Optimisation et maintien de la quantité de lait: 7 globules 2 - 3 fois par jour



Indications de prise:

- Laisser fondre les globules (granules) dans la bouche.
- Peuvent également être pris l'estomac vide.

Le temps d'action d'un médicament peut varier d'une personne à l'autre. En règle générale, l'administration du médicament doit être répétée lorsque l'effet diminue ou lorsque les troubles reviennent. Durée du traitement: si nécessaire, pendant toute la durée de l'allaitement.

SIMILASAN Formation du lait maternel ne doit pas être utilisé chez les enfants et les hommes.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires *SIMILASAN Formation du lait maternel* peut-il provoquer ?

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec *SIMILASAN Formation du lait maternel* et informez-en votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

Aucun effet secondaire de *SIMILASAN Formation du lait maternel* n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné.

Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention ?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention <EXP> sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25°C).

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient *SIMILASAN Formation du lait maternel*?

1 g de globules contient:

Principes actifs

Medicago Sativa ex herba D6 (HAB2a) 3.333 mg

Lac caninum ex canis familiaris D10 (HAB1a) 3.333 mg

Urtica urens (HAB) D6 3.333 mg

Excipients

Xylitol (E 967) 600 mg; carbonate de calcium 400 mg



1 g de globules correspond à 70-90 globules

Numéro d'autorisation

54925 (Swissmedic)

Où obtenez-vous *SIMILASAN Formation du lait maternel* ? Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Conditionnements: 15 g

4,5 g (seulement si fait partie de la pharmacie de poche)

Titulaire de l'autorisation

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en octobre 2023 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

