

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

***SIMILASAN Lattopoiesi*, globuli**

Medicamento omeopatico

Quando si usa *SIMILASAN Lattopoiesi*?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici *SIMILASAN Lattopoiesi* può essere usato in caso di scarsa produzione di latte e per favorire il flusso latteo.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa esclusivamente sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chiedi al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere *SIMILASAN Lattopoiesi*.

Quando non si può assumere *SIMILASAN Lattopoiesi* e quando la sua somministrazione/il suo uso richiede prudenza?

SIMILASAN Lattopoiesi non va usato in bambini e uomini.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa)

Si può assumere *SIMILASAN Lattopoiesi* durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare *SIMILASAN Lattopoiesi*?

Nelle donne che allattano, salvo diversamente prescritto dal medico:

Forte carenza di latte, flusso latteo molto scarso: 7 globuli 6 volte al giorno

Ottimizzazione e mantenimento della quantità di latte: 7 globuli 2 - 3 volte al giorno

Indicazione d'uso:

- Lasciar sciogliere i globuli (granuli) in bocca.
- Possono essere assunti anche a stomaco vuoto.



L'efficacia della somministrazione può variare individualmente. In generale, ripetere la somministrazione del rimedio quando si percepisce un calo dell'efficacia o il ritorno dei disturbi. Durata di trattamento: se necessario per l'intera durata dell'allattamento.

SIMILASAN Lattopoiesi non va usato in bambini e uomini.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere *SIMILASAN Lattopoiesi*?

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con *SIMILASAN Lattopoiesi* e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di *SIMILASAN Lattopoiesi*. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.*

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene *SIMILASAN Lattopoiesi*?

1 g di globuli contiene:

Principi attivi

Medicago Sativa ex herba D6 (HAB2a) 3.333 mg

Lac caninum ex canis familiaris D10 (HAB1a) 3.333 mg

Urtica urens (HAB) D6 3.333 mg

Sostanze ausiliarie

Xilitolo (E967) 600 mg; calcio carbonato 400 mg

1 g di globuli equivale a 70-90 globuli

Numero dell'omologazione

54925 (Swissmedic)

Dove è ottenibile *SIMILASAN Lattopoiesi*? Quali confezioni sono disponibili?



In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni: 15 g

4,5 g (solo come parte integrante della farmacia tascabile)

Titolare dell'omologazione

Similasan AG, CH-8916 Jönen

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'ottobre 2023 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

