

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen.

Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, Apothekers oder Drogisten bzw. der Ärztin, der Apothekerin oder der Drogistin an, um den grössten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

Coryzalia®, Flüssigkeit zum Einnehmen im Einzeldosisbehälter

Boiron SA

Homöopathisches Arzneimittel

Wann wird Coryzalia angewendet?

Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild kann Coryzalia bei Schnupfen angewendet werden.

Die Anwendung dieses Arzneimittels im genannten Anwendungsgebiet beruht ausschliesslich auf den Prinzipien einer homöopathischen Therapierichtung.

Was sollte dazu beachtet werden?

Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verordnet hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob Coryzalia gleichzeitig eingenommen werden darf.

Wann darf Coryzalia nicht oder nur mit Vorsicht eingenommen werden?

Coryzalia darf nicht bei Kindern unter 6 Monaten angewendet werden. Bei Kindern im Alter von 6 bis 23 Monaten nur auf ärztlichen Rat anwenden.

Coryzalia darf nicht angewendet werden, wenn Sie oder Ihr Kind überempfindlich auf Chrom reagieren oder allergisch gegen einen der Wirkstoffe oder sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Lassen Sie sich ärztlich beraten, wenn die Symptome länger als 7 Tage anhalten oder sich verschlimmern oder wenn die folgenden Symptome auftreten, insbesondere bei Kindern unter 2 Jahren:

- bei hohem Fieber (über 38,5 °C),
- Schwierigkeiten beim Atmen,
- Ohrenschmerzen oder Ausfluss aus dem Ohr,
- bei eitriger Sekretion aus den Augen,
- Schwellung des Augenlids,
- Verdauungsstörungen (Schwierigkeiten beim Essen, Erbrechen, Durchfall).

Nicht in die Nase, die Augen oder in die Ohren verabreichen.

Nicht injizieren.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie oder Ihr Kind

- an anderen Krankheiten leiden,
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbst gekaufte!) einnehmen (oder äusserlich anwenden)!

Darf Coryzalia während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen werden?

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist bei bestimmungsgemässer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt. Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Arzneimittel verzichten oder den Arzt,



Apotheker oder Drogisten bzw. die Ärztin, Apothekerin oder Drogistin um Rat fragen.

Wie verwenden Sie Coryzalia?

Nicht bei Kindern unter 6 Monaten anwenden. Bei Kindern im Alter zwischen 6 und 23 Monaten nur auf ärztlichen Rat anwenden.

Falls vom Arzt bzw. von der Ärztin nicht anders verordnet:

Erwachsene und Kinder ab 6 Monaten: 1 Einzeldosis 3 bis 6-mal täglich oral einnehmen. Nicht mehr als 6 Einzeldosen pro Tag einnehmen.

Bei Besserung die Abstände zwischen den Einnahmen vergrössern und die Einnahme beenden, sobald die Symptome verschwunden sind.

Die Behandlungsdauer sollte eine Woche nicht überschreiten.

Waschen Sie sich vor der Anwendung des Arzneimittels die Hände. Um Coryzalia zu verabreichen:

1. Öffnen Sie den Aluminiumbeutel,
2. Einen Einzeldosisbehälter vom Steg abtrennen,
3. Öffnen Sie den Behälter durch Drehen der Verschlusskappe
4. Den Inhalt des Einzeldosisbehälters durch leichtes Drücken auf den Behälter in den Mund verabreichen.
Bei Kindern sollte die Verabreichung in einer sitzenden Position erfolgen.
5. Den Beutel mit den restlichen Einzeldosen sorgfältig verschliessen, indem die offene Seite umgeklappt wird.

Um eine stets sterile Lösung zu verabreichen, verwenden Sie bei jeder Anwendung einen neuen Einzeldosisbehälter.

Ein Einzeldosisbehälter darf nach dem Öffnen nicht aufbewahrt werden. Der Einzeldosisbehälter sollte nach jedem Gebrauch entsorgt werden.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder von der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn bei der Behandlung eines Kleinkindes / Kindes die gewünschte Besserung nicht eintritt, ist mit ihm ein Arzt bzw. eine Ärztin aufzusuchen. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann Coryzalia haben?

Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). Bei andauernder Verschlechterung setzen Sie Coryzalia ab und informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten oder Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Für Coryzalia sind bisher bei bestimmungsgemäsem Gebrauch keine Nebenwirkungen beobachtet worden.

Wenn Sie dennoch Nebenwirkungen beobachten, informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist ferner zu beachten?

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden.

Aufbrauchfrist nach Anbruch

Nach dem Öffnen des Beutels: Nicht verwendete Einzeldosisbehälter im wiederverschlossenen Beutel aufbewahren und innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen.

Nach dem Öffnen eines Einzeldosisbehälters:

- Das Arzneimittel sollte sofort verwendet werden



- Der Einzeldosisbehälter nach dem Öffnen/der Anwendung entsorgen
- Ihn nicht für eine weitere Anwendung aufbewahren.

Lagerungshinweis

Bei Raumtemperatur (15-25°C) lagern.

Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

Was ist in Coryzalia enthalten?

Ein Einzeldosisbehälter mit 1 ml oraler Flüssigkeit enthält:

Wirkstoffe

Allium cepa (Ph.Fr.) 3 CH (Ph.Eur.Hom. 1.1.10) 0.166 ml

Belladonna (Ph.Eur.Hom.) 3 CH (Ph.Eur.Hom. 1.1.10) 0.166 ml

Gelsemium (Ph.Fr.) 3 CH (Ph.Eur.Hom. 1.1.10) 0.166 ml

Kalium bichromicum (Ph.Eur.Hom.) 3 CH (Ph.Eur.Hom. 3.1.3) 0.166 ml

Pulsatilla (Ph.Fr.) 3 CH (Ph.Eur.Hom. 1.1.10) 0.166 ml

Sabadilla (Ph.Fr.) 3 CH (Ph.Eur.Hom. 1.1.10) 0.166 ml

Hilfsstoffe

Gereinigtes Wasser

Zulassungsnummer

68347 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie Coryzalia? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.

Packungen zu 10, 15, 20 oder 30 Einzeldosisbehältern mit 1 ml Flüssigkeit.

Zulassungsinhaberin

BOIRON AG – CH-1754 Avry-sur-Matran

Herstellerin

BOIRON AG – Frankreich

Diese Packungsbeilage wurde im Juli 2022 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

