

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Coryzalia[®], liquide oral en récipient unidose

Boiron SA

Médicament homéopathique

Quand Coryzalia est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique, Coryzalia peut être utilisé en cas de rhumes.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée exclusivement sur les principes de l'homéopathie.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si Coryzalia peut être pris simultanément.

Quand Coryzalia ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution?

Ne pas utiliser Coryzalia chez l'enfant de moins de 6 mois. Chez les enfants de 6 à 23 mois, n'utiliser le médicament que sur avis médical.

Coryzalia ne doit pas être utilisé si vous ou votre enfant avez une hypersensibilité au chrome ou êtes allergique à l'une des substances actives ou autres composants contenus dans ce médicament.

Consulter un médecin si les symptômes persistent au-delà de 7 jours ou s'aggravent ou en cas d'apparition des symptômes suivants, en particulier chez l'enfant de moins de 2 ans:

- en cas de fièvre élevée (supérieure à 38,5°C),
- difficultés à respirer,
- douleur ou écoulement de l'oreille,
- en cas de sécrétions purulentes de l'œil,
- gonflement de la paupière,
- troubles digestifs (difficultés d'alimentation, vomissements, diarrhées).

Ne pas administrer dans le nez, l'œil ou l'oreille.

Ne pas injecter.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous ou votre enfant souffrez d'une autre maladie
- vous ou votre enfant êtes allergique
- vous ou votre enfant prenez ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication !).

Coryzalia peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments



durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Comment utiliser Coryzalia?

Ne pas utiliser chez l'enfant de moins de 6 mois. Chez les enfants de 6 à 23 mois, n'utiliser le médicament que sur avis médical.

Sauf prescription contraire du médecin:

Adultes et enfants à partir de 6 mois: 1 récipient unidose, 3 à 6 fois par jour, par voie orale. Ne pas dépasser 6 unidoses par jour.

Espacer les prises dès amélioration et cesser les prises dès la disparition des symptômes.

La durée du traitement ne doit pas dépasser une semaine.

Se laver les mains avant d'utiliser le médicament. Pour administrer Coryzalia:

1. Ouvrir le sachet aluminium,
2. Détacher un récipient unidose de la barrette,
3. L'ouvrir en tournant l'embout.
4. Verser le contenu de l'unidose dans la bouche en pressant légèrement dessus.
Chez l'enfant, l'administration doit se faire en maintenant l'enfant en position assise.
5. Refermer soigneusement le sachet contenant les autres unidoses en repliant le côté ouvert.

Afin d'administrer une solution toujours stérile, utiliser une nouvelle unidose lors de chaque utilisation.

Ne pas conserver une unidose après ouverture. L'unidose doit être jetée après chaque usage.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. En l'absence de l'amélioration escomptée lors d'un traitement chez le petit enfant / l'enfant, veuillez consulter un médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Coryzalia peut-il provoquer?

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec Coryzalia et informez-en votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

Aucun effet secondaire de Coryzalia n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné.

Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention <EXP> sur le récipient.

Délai d'utilisation après ouverture

Après ouverture du sachet: conserver les récipients unidoses non utilisés dans le sachet refermé et utiliser dans les 3 mois.

Après ouverture d'un récipient unidose:

- Le produit doit être utilisé immédiatement.
- Jeter l'unidose après utilisation/ouverture.
- Ne pas la conserver pour une utilisation ultérieure.

Remarques concernant le stockage



Conserver à température ambiante (15-25 °C).

Conserver hors de portée des enfants.

Que contient Coryzalia?

Un récipient unidose de 1 ml de liquide oral contient:

Principes actifs

Allium cepa (Ph.Fr.) 3 CH (Ph.Eur.Hom. 1.1.10) 0.166 ml

Belladonna (Ph.Eur.Hom.) 3 CH (Ph.Eur.Hom. 1.1.10) 0.166 ml

Gelsemium (Ph.Fr.) 3 CH (Ph.Eur.Hom. 1.1.10) 0.166 ml

Kalium bichromicum (Ph.Eur.Hom.) 3 CH (Ph.Eur.Hom. 3.1.3) 0.166 ml

Pulsatilla (Ph.Fr.) 3 CH (Ph.Eur.Hom. 1.1.10) 0.166 ml

Sabadilla (Ph.Fr.) 3 CH (Ph.Eur.Hom. 1.1.10) 0.166 ml

Excipients

Eau purifiée

Numéro d'autorisation

68347 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Coryzalia? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Emballages de 10, 15, 20 ou 30 récipients unidoses de 1 ml.

Titulaire de l'autorisation

BOIRON SA – CH-1754 Avry-sur-Matran

Fabricant

BOIRON SA – France

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en juillet 2022 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

