

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen.

Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, Apothekers oder Drogisten bzw. der Ärztin, der Apothekerin oder der Drogistin an, um den grössten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

Zeel comp., Tabletten

Homöopathisches Arzneimittel

Wann wird Zeel comp. angewendet?

Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild kann Zeel comp. bei arthrosebedingten Gelenkbeschwerden, wie Steifigkeit in den Gelenken, die sich durch Einwirkung von Kälte und Nässe verschlechtern, angewendet werden.

Die Anwendung dieses Arzneimittels im genannten Anwendungsgebiet beruht auf den Prinzipien einer homöopathischen Therapierichtung.

Was sollte dazu beachtet werden?

Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verordnet hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob Zeel comp. gleichzeitig eingenommen werden darf. Hinweis für Diabetiker: Dieses Arzneimittel enthält 0,3 g verwertbare Kohlenhydrate pro Tablette.

Wann darf Zeel comp. nicht oder nur mit Vorsicht eingenommen werden?

Bitte nehmen Sie Zeel comp. erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

Nicht anwenden bei Kindern unter 6 Jahren, bei bekannter Allergie (Überempfindlichkeit) gegen Arnika und andere Korbblütler, gegen Giftsumachgewächse, oder einen anderen Bestandteil des Arzneimittels.

Gelenkerkrankungen bei Kindern müssen ärztlich abgeklärt werden. Daher soll Zeel comp. bei Kindern von 6 bis 12 Jahren nicht ohne ärztliche Verschreibung angewandt werden.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden,
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbst gekaufte!) einnehmen!

Darf Zeel comp. während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit angewendet werden?

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist bei bestimmungsgemässer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt. Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Arzneimittel verzichten oder den Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. die Ärztin, Apothekerin oder Drogistin um Rat fragen.

Wie verwenden Sie Zeel comp.?

Soweit nicht anders verordnet:

Standarddosierung:



Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren, sowie Kinder ab 6 Jahren nach ärztlicher Verschreibung: 2-3x täglich 1 Tablette.

Akutdosierung:

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren, sowie Kinder ab 6 Jahren nach ärztlicher Verschreibung: 1 Tablette alle halbe bis ganze Stunde, bis zu 8-12x täglich, anschliessend mit Standarddosierung fortfahren. Nicht anwenden bei Kindern unter 6 Jahren.

Art der Anwendung:

Vorzugsweise die Tablette im Mund zergehen lassen und dann schlucken. Für Kinder können die Tabletten zerdrückt und in etwas Wasser aufgelöst werden. Dieses Arzneimittel sollte in zeitlichem Abstand von der Nahrungsaufnahme eingenommen werden.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder von der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn bei der Behandlung eines Kindes die gewünschte Besserung nicht eintritt, ist mit ihm ein Arzt bzw. eine Ärztin aufzusuchen. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann Zeel comp. haben?

In sehr seltenen Fällen können (Häufigkeit unbekannt) allergische oder Überempfindlichkeitsreaktionen der Haut oder Magen-Darm-Beschwerden auftreten.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten oder Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin. Dies gilt insbesondere auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). Bei andauernder Verschlechterung setzen Sie Zeel comp. ab und informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten oder Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist ferner zu beachten?

Haltbarkeit

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «Verwendbar bis» bezeichneten Datum verwendet werden.

Lagerungshinweis

Nicht über 30°C lagern.

Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

Weitere Hinweise

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist in Zeel comp. enthalten?

1 Tablette (301,5 mg) enthält:

Wirkstoffe

Arnica montana (HAB) D2 0,50 mg



Rhus toxicodendron (HAB) D2 (Ph.Eur.Hom. 1.1.3) 1,00 mg
Sanguinaria canadensis (HAB) D4 (Ph.Eur.Hom. 1.1.8) 0,45 mg
Solanum dulcamara (HAB) D2 0,30 mg
Sulfur (HAB) D6 (HAB SV) 0,75 mg

Hilfsstoffe

Lactose-Monohydrate 300,00 mg, Magnesiumstearat.

Zulassungsnummer

63169 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie Zeel comp.? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.

Packung mit 50 und 250 Tabletten.

ZulassungsinhaberIn

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

HerstellerIn

Biologische Heilmittel Heel GmbH, 76532 Baden-Baden, Deutschland

Diese Packungsbeilage wurde im Juni 2026 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

