

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Zeel comp., Comprimés

Médicament homéopathique

Quand Zeel comp. est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique, Zeel comp. peut être utilisé en cas de troubles articulaires liés à l'arthrose, tels que la raideur des articulations, qui s'aggravent lors d'exposition au froid et à l'humidité. L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée sur les principes de l'homéopathie.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si Zeel comp. peut être pris simultanément.

Remarque à l'intention des diabétiques: ce médicament contient 0,3 g de glucides assimilables par comprimé.

Quand Zeel comp. ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 6 ans, en cas d'allergie (hypersensibilité) connue à l'arnica et à d'autres plantes de la famille des Astéracées, aux Anacardiacees ou à tout autre composant du médicament.

Les affections articulaires chez les enfants doivent faire l'objet d'un examen médical. C'est pourquoi Zeel comp. ne doit pas être utilisé chez les enfants âgés de 6 à 12 ans sans prescription médicale.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication!).

Zeel comp. peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Comment utiliser Zeel comp.?



Sauf prescription contraire:

Posologie standard:

Adultes et adolescents à partir de 12 ans, ainsi que les enfants à partir de 6 ans sur prescription médicale:
1 comprimé 2 à 3 fois par jour.

Posologie en aigu:

Adultes et adolescents à partir de 12 ans, ainsi que les enfants à partir de 6 ans, sur prescription médicale:
1 comprimé toutes les demi-heures à une heure, jusqu'à 8 à 12 fois par jour, puis poursuivre avec la posologie standard.

Ne pas administrer aux enfants de moins de 6 ans.

Mode d'administration:

Laisser de préférence le comprimé se dissoudre dans la bouche, puis l'avaler. Pour les enfants, les comprimés peuvent être écrasés et dissous dans un peu d'eau. Ce médicament doit être pris à distance des repas.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. En l'absence de l'amélioration escomptée lors d'un traitement chez l'enfant, veuillez consulter un médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Zeel comp. peut-il provoquer?

Dans de très rares cas (fréquence inconnue), des réactions allergiques, d'hypersensibilité cutanées ou des troubles gastro-intestinaux peuvent survenir.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec Zeel comp. et informez-en votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «À utiliser jusqu'au» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Ne pas conserver au-dessus de 30 °C.

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient Zeel comp.?

1 comprimé (301,5 mg) contient:

Principes actifs



Arnica montana (HAB) D2 0,50 mg
Rhus toxicodendron (HAB) D2 (Ph.Eur.Hom. 1.1.3) 1,00 mg
Sanguinaria canadensis (HAB) D4 (Ph.Eur.Hom. 1.1.8) 0,45 mg
Solanum dulcamara (HAB) D2 0,30 mg
Sulfur (HAB) D6 (HAB SV) 0,75 mg

Excipients

Lactose monohydraté 300.00 mg, magnesium stéarate

Numéro d'autorisation

63169 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Zeel comp.? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Emballages de 50 et 250 comprimés.

Titulaire de l'autorisation

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlintach

Fabricant

Biologische Heilmittel Heel GmbH, 76532 Baden-Baden, Deutschland

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en juin 2026 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

