

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Zeel comp., Compresse

Medicamento omeopatico

Quando si usa Zeel comp.?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici Zeel comp. può essere usato in caso di disturbi articolari causati dall'artrosi, come la rigidità articolare, che peggiorano a causa del freddo e dell'umidità.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere Zeel comp..

Avviso per i diabetici: questo medicamento contiene 0,3 g di carboidrati disponibili per compressa.

Quando non si può assumere Zeel comp. e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicamento. Non somministrare a bambini di età inferiore ai 6 anni, in caso di allergia nota (ipersensibilità) all'arnica e ad altre composite, alle piante della famiglia delle sumacacee o a qualsiasi altro componente del medicamento.

Le patologie articolari nei bambini devono essere valutate da un medico. Pertanto, Zeel comp. non deve essere somministrato ai bambini dai 6 ai 12 anni senza prescrizione medica.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa).

Si può usare Zeel comp. durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare Zeel comp.?

Salvo diversa prescrizione medica:

Dosaggio standard:



Adulti e adolescenti dai 12 anni in su, nonché bambini dai 6 anni in su su prescrizione medica: 1 compressa 2-3 volte al giorno.

Dosaggio acuto:

Adulti e adolescenti dai 12 anni in su, nonché bambini dai 6 anni in su su prescrizione medica: 1 compressa ogni mezz'ora o ogni ora, fino a 8-12 volte al giorno; successivamente proseguire con il dosaggio standard.

Non somministrare ai bambini di età inferiore ai 6 anni.

Modalità d'uso:

Si consiglia di lasciare sciogliere la compressa in bocca prima di deglutirla. Per i bambini, le compresse possono essere sbriciolate e sciolte in poca acqua. Questo medicamento deve essere assunto a distanza dai pasti.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Zeel comp.?

In casi molto rari (frequenza sconosciuta) possono verificarsi reazioni allergiche o di ipersensibilità a livello cutaneo o disturbi gastrointestinali.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Zeel comp. e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «Verwendbar bis» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Non conservare a temperature superiori a 30 °C.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Zeel comp.?

1 compressa (301,5 mg) contiene:

Principi attivi

Arnica montana (HAB) D2 0,50 mg

Rhus toxicodendron (HAB) D2 (Ph.Eur.Hom. 1.1.3) 1,00 mg

Sanguinaria canadensis (HAB) D4 (Ph.Eur.Hom. 1.1.8) 0,45 mg

Solanum dulcamara (HAB) D2 0,30 mg

Sulfur (HAB) D6 (HAB SV) 0,75 mg



Sostanze ausiliarie

Lattosio monoidrato 300,00 mg, magnesio stearato

Numero dell'omologazione

63169 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Zeel comp.? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni da 50 e 250 compresse

Titolare dell'omologazione

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Fabbricante

Biologische Heilmittel Heel GmbH, 76532 Baden-Baden, Deutschland

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel giugno 2026 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

