

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di far uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Questo medicamento potrebbe nuocere alla loro salute. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Fortakehl D5, soluzione per iniezione

Medicamento omeopatico

Quando si usa Fortakehl D5, soluzione per iniezione?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici, Fortakehl D5, soluzione per iniezione può essere usato su prescrizione del suo medico in caso di disturbi di stomaco (gastrite).

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chiedi al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può usare Fortakehl D5, soluzione per iniezione.

Quando non si può usare Fortakehl D5, soluzione per iniezione e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Non si deve usare Fortakehl D5, soluzione per iniezione in caso di allergia contro la penicillina e simili e nei bambini e negli adolescenti sotto i 18 anni. Informi il suo medico o il suo farmacista se

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri o applica esternamente medicinali (anche se acquistati di propria iniziativa).

Si può usare Fortakehl D5, soluzione per iniezione durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia non sono ancora stati eseguiti studi scientifici sistematici. Per precauzione dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al suo medico o al suo farmacista.

Come usare Fortakehl D5, soluzione per iniezione?

Posologia/uso negli adulti: Iniettare 2 volte alla settimana 1 mL per via sottocutanea o intracutanea. Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. L'uso e la sicurezza dell Fortakehl D5, soluzione per iniezione nei bambini e negli adolescenti sotto i 18 anni finora non sono stati esaminati. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Fortakehl D5, soluzione per iniezione?

In seguito all'applicazione di Fortakehl D5, soluzione per iniezione possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali: Reazioni allergiche contro la penicillina e simili. Se osserva effetti collaterali non descritti, dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista. Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse



persistere, interrompa il trattamento con Fortakehl D5, soluzione per iniezione e informi il suo medico o il suo farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con „verwendbar bis“ sulla confezione. Conservare il medicamento fuori della portata dei bambini. Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C). Il medico, il farmacista possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Fortakehl D5, soluzione per iniezione?

1 fiala di 1 mL contiene:

Penicillium roquefortii D5 aquos. dilutio (HAB; 5b, 11).

Questo preparato contiene inoltre cloruro di sodio come sostanza ausiliaria.

Numero dell'omologazione

54133 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Fortakehl D5, soluzione per iniezione? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia dietro presentazione della prescrizione medica.

Confezioni di 1/10/50 fiale da 1 mL.

Titolare dell'omologazione

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlintach

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel marzo 2004 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

