

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo, che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Gocce-W®

Che cosa sono le Gocce-W® e quando si usano?

Le Gocce-W® contengono una combinazione di sostanze che ammorbidiscono lo strato corneo e vengono usate per la rimozione di occhi di pernice, strato cutaneo corneo e verruche.

Quando non si possono usare le Gocce-W®?

Le Gocce-W® non devono essere usate

- in caso di ipersensibilità all'acido salicilico e/o acido lattico o ad una delle sostanze ausiliarie citate,
- se si soffre di grave patologia renale o epatica.

Eventuali infiammazioni locali o ferite nelle vicinanze del callo o degli occhi di pernice dovranno essere guarite prima di iniziare il trattamento con le Gocce-W®.

Le Gocce-W® non devono essere applicate su voglie, verruche con peli o verruche nelle zone genitali. Le

Gocce-W® non devono essere applicate sul volto o nell'area delle mucose.

Le Gocce-W® non devono essere applicate su neonati o bambini di età inferiore a 2 anni.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione delle Gocce-W®?

Se si soffre di diabete o di gravi disturbi circolatori bisogna applicare le Gocce-W® solo dietro consiglio medico.

Non trattare calli di grosse dimensioni presenti sulla pianta del piede in una sola seduta, ma applicare solo su un'area non superiore a circa 2 cm di diametro.

Se le verruche non scompaiono entro due settimane, dovrà consultare un medico.

Pazienti pediatrici

L'uso e la sicurezza delle Gocce-W® nei bambini sotto i 12 anni finora non sono stati esaminati.

Etanolo

Questo medicamento contiene 13,2 mg di alcool (etanolo) per ml. Può causare sensazione di bruciore sulla pelle danneggiata.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui soffre di altre malattie della pelle, soffre di allergie o assume o applica altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa)!

Si possono usare le Gocce-W® durante la gravidanza o l'allattamento?

Non sono disponibili dati clinici riguardanti l'uso nelle donne in gravidanza né studi scientifici sistematici condotti su animali.



Anche se la quantità assorbita con l'applicazione locale è piccola, per precauzione si consiglia di non utilizzare Gocce-W[®] durante la gravidanza e l'allattamento. L'acido salicilico passa nel latte materno. Le Gocce-W[®] non devono essere utilizzate sul seno se si allatta. Chieda consiglio al medico, al farmacista o al droghiere se è in gravidanza o sta allattando.

Come usare le Gocce-W[®]?

Adulti e adolescenti a partire dai 12 anni

In presenza di occhi di pernice: prima di iniziare il trattamento con le Gocce-W[®] lavare e asciugare accuratamente i piedi. Applicare un po' di vaselina sulle aree cutanee sane adiacenti all'occhio di pernice, tralasciando quest'ultimo. Applicare sull'occhio di pernice Gocce-W[®] ripetutamente (3 o 4 volte). Dopo ogni applicazione aspettare che lo strato applicato si sia asciugato. Applicare le Gocce-W[®] ogni sera per 4-6 giorni. A fine trattamento effettuare un pediluvio caldo e staccare con cautela l'occhio di pernice. In caso di calli ostinati bisogna ripetere il trattamento.

In presenza di calli: il trattamento dei calli viene effettuato allo stesso modo di quello degli occhi di pernice. In presenza di verruche: applicare della vasellina sui punti cutanei sani attorno alla verruca. Far cadere da sola la verruca. Applicare le Gocce-W[®] sulla verruca ogni sera per 4-6 giorni come per il trattamento dell'occhio di pernice.

Far asciugare con cura le Gocce-W[®] dopo l'applicazione. Una volta asciutte le gocce formano una specie di cerotto che non si sposta. Se una goccia di Gocce-W[®] per sbaglio causa una macchia sulla biancheria, sarà facile rimuoverla utilizzando dell'acetone.

Solo per uso esterno!

Bambini sotto i 12 anni

L'utilizzo e la sicurezza delle Gocce-W[®] nei bambini al di sotto dei 12 anni finora non sono stati finora verificati.

Non usare le Gocce-W[®] su neonati o bambini di età inferiore a 2 anni.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritte dal medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali possono avere le Gocce-W[®]?

Frequenza non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili)

Si possono verificare irritazioni cutanee locali come arrossamenti, ustioni o allergie da contatto. Le irritazioni cutanee locali spariscono solitamente dopo breve tempo. In caso di eccessiva irritazione cutanea bisogna sospendere il trattamento con le Gocce-W[®] e risciacquare con molta acqua il punto interessato.

Le Gocce-W[®] che vengono a contatto con cute sana possono causare bruciature della pelle.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.



Stabilità dopo apertura

Una volta aperta la confezione, il prodotto ha una durata di 12 mesi.

Indicazioni di stoccaggio

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Facilmente infiammabile. Non conservare né usare nelle vicinanze di fiamme libere. Le Gocce-W[®] evaporano facilmente, quindi il flacone va sempre tenuto ben chiuso dopo l'utilizzo. Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C). Dopo che la soluzione si è seccata, le Gocce-W[®] non devono più essere utilizzate. Il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contengono le Gocce-W[®]?

1 ml di soluzione cutanea contiene

Principi attivi

Acido lattico 41 mg, acido salicilico 100 mg

Sostanze ausiliarie

Etere, acetato di etile, alcool isopropilico, cotone collodio, etanolo, paraffina densa, olio di ricino raffinato.

Numero dell'omologazione

16598 (Swissmedic)

Dove sono ottenibili le Gocce-W[®]? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Le Gocce-W[®] sono disponibili in flaconi da 10 ml.

Titolare dell'omologazione

MIT Gesundheit Swiss GmbH, Liestal

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'agosto 2024 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

