

Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage avant de prendre le médicament. Ce médicament vous a été remis sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, mêmes si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Pansekrel®, gouttes

Médicament homéopathique-spagyrique

Quand Pansekrel®, gouttes est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique, Pansekrel®, gouttes peut être utilisé sur ordonnance médicale en cas de dysfonctionnements du pancréas.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si Pansekrel®, gouttes peut être pris simultanément. La préparation contient 27 % vol. d'alcool.

Quand Pansekrel®, gouttes ne doit-il pas être utilisé ou seulement avec précaution?

Ne pas utiliser pour les enfants et les adolescences de moins de 18 ans. Si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné, aucune précaution particulière n'est requise. Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien, si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication).

Pansekrel®, gouttes peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis du médecin ou du pharmacien.

Comment utiliser Pansekrel®, gouttes?

Sauf prescription contraire du médecin:

Adultes: 20 gouttes 3-4 fois par jour à prendre dans du liquide avant le repas. Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. L'utilisation et la sécurité de Pansekrel, gouttes n'ont à ce jour pas été testées chez les enfants ni les adolescents de moins de 18 ans. Adressez vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Pansekrel®, gouttes peut-il provoquer?

L'emploi approprié du médicament n'a donné lieu à aucun effet secondaire attesté à ce jour. Si vous remarquez d'effets secondaires, veuillez-en informer votre médecin ou votre pharmacien. La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette



aggravation persiste, cessez le traitement avec Pansekrel, gouttes et informez-en votre médecin ou votre pharmacien.

A quoi faut-il encore faire attention?

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «à utiliser jusqu'au» sur le récipient. Garder le médicament hors de portée des enfants. Conserver à température ambiante (15- 25 °C). Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien. La préparation contient 27 % vol. d'alcool.

Que contient Pansekrel®, gouttes?

1 g de solution contient:

Chionanthus virginicus D4 120 mg ; Eichhornia crassipes D3 120 mg ; Hedera helix spag. Peka D4 120 mg ; Iberis amara D4 120 mg ; Strychnos ignatii (Ignatia) spag. Peka D4 120 mg ; Lycopodium clavatum D4 120 mg ; Glechoma hederacea spag. Peka TM 140 mg ; Taraxacum officinale spag. Peka TM 140 mg.
Cette préparation contient en outre 27 % vol. d'alcool comme excipient.

Numéro d'autorisation

51456 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Pansekrel®, gouttes ? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Emballage de 100 ml.

Titulaire de l'autorisation

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en juin 2005 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

