

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di far uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Questo medicamento potrebbe nuocere alla loro salute. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Pansekrel®, gocce

Medicamento omeopatico-spagirico

Quando si usa Pansekrel®, gocce?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici, Pansekrel®, gocce può essere usato su prescrizione del suo medico in caso di disturbi della funzione del pancreas.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere Pansekrel®, gocce. Contiene 27 % vol. di alcool.

Quando non si può assumere Pansekrel®, gocce e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Non deve essere utilizzato nei bambini e negli adolescenti sotto i 18 anni. Non sono necessarie precauzioni particolari, a condizione che il preparato sia usato correttamente. Informi il suo medico o il suo farmacista se

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume o applica esternamente altri medicinali (anche se acquistati di propria iniziativa).

Si può assumere Pansekrel®, gocce durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia non sono ancora stati eseguiti studi scientifici sistematici. Per precauzione dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al suo medico o al suo farmacista.

Come usare Pansekrel®, gocce?

Salvo diversa prescrizione medica, adulti 3-4 volte al giorno 20 gocce con un po' d'acqua prima dei pasti. Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. L'uso e la sicurezza del Pansekrel®, gocce nei bambini e negli adolescenti sotto i 18 anni finora non sono stati esaminati. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Pansekrel®, gocce?

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso di Pansekrel®, gocce. Se osserva effetti collaterali, non menzionati dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista. Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se



l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Pansekrel®, gocce e informi il suo medico, o il suo farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con "Verw.b." sulla confezione. Conservare il medicamento fuori dalla portata dei bambini. Conservare a temperatura ambiente (15- 25 °C). Il medico, il farmacista possono darle ulteriori informazioni. Contiene 27 % vol. di alcool.

Cosa contiene Pansekrel®, gocce?

1 g di soluzione contiene:

Chionanthus virginicus D4 120 mg; Eichhornia crassipes D3 120 mg; Hedera helix spag. Peka D4 120 mg; Iberis amara D4 120 mg; Strychnos ignatii (Ignatia) spag. Peka D4 120 mg; Lycopodium clavatum D4 120 mg; Glechoma hederacea spag. Peka TM 140 mg; Taraxacum officinale spag. Peka TM 140 mg.

Questo preparato contiene inoltre sostanze ausiliarie 27 % vol. di alcool.

Numero dell'omologazione

51456 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Pansekrel®, gocce? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia dietro prescrizione della presentazione medica.

Confezione da 100 ml.

Titolare dell'omologazione

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel giugno 2005 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

