

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Synerga

Laves-Arzneimittel GmbH Ronnenberg

Synerga è stato omologato esclusivamente sulla base di una pluriennale esperienza nel Cantone Appenzello Esterno. Swissmedic non ne ha verificato l'efficacia né la sicurezza.

Che cos'è Synerga e quando si usa?

Synerga si usa negli adulti per il trattamento di supporto di malattie allergiche, come ad es.:

- rinocongiuntivite allergica (febbre da fieno)
- eczema atopico (neurodermatite)
- eruzione polimorfa alla luce

Quando non si può assumere Synerga?

A causa del contenuto di alcol, l'uso di Synerga non è raccomandato nei bambini e negli adolescenti di età inferiore ai 18 anni.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Synerga?

Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere Synerga.

Questo medicamento contiene 0.85 g di lattosio e 0.087 g di glucosio per dose. Da tenere in considerazione in persone affette da diabete mellito. Può danneggiare i denti.

Questo medicamento contiene 210 mg di alcol (etanolo) per 5 ml, equivalenti a 42 mg/ml (5.3 % (v/v)). Ciò equivale a circa 5 ml di birra o 2 ml di vino. La piccola quantità di alcol contenuta nel medicamento non ha effetti percepibili.

Questo medicamento contiene 14.4 mg di sodio (componente principale del sale da cucina) per 5 ml (dose singola) o 28.8 mg di sodio per 10 ml (dose singola massima). Questo equivale a 0.72 % o a 1.44 % dell'assunzione massima giornaliera raccomandata con la dieta di un adulto.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui:

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa!).

Si può assumere Synerga durante la gravidanza o l'allattamento?

A causa del contenuto di alcol, l'assunzione non è raccomandata durante la gravidanza e l'allattamento.

Tuttavia non sono mai stati condotti studi scientifici sistematici negli esseri umani e negli animali. Per precauzione, durante la gravidanza e l'allattamento è consigliabile rinunciare all'uso del medicamento per quanto possibile o consultare il medico, il farmacista o il droghiere.

Come usare Synerga?

Se non diversamente prescritto, la posologia raccomandata è di 5 ml di Synerga 1 volta al giorno, al mattino, a seconda della gravità, fino a 5 ml di Synerga 3 volte al giorno.

Dopo aver consultato il medico, si può aumentare la dose a un massimo di 10 ml di Synerga 3 volte al giorno.



Prelevare la dose con il misurino fornito nella confezione.

Assumere Synerga mezz'ora prima dei pasti, con un po' di liquido.

Osservare le seguenti avvertenze:

- Dopo ogni prelievo, lavare il misurino con acqua bollente e asciugarlo!
- Non bere dal flacone!
- Chiudere il flacone immediatamente dopo aver prelevato la dose!

La durata del trattamento dipende dalla sintomatologia e può protrarsi fino a 6 mesi.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere. Se non nota un miglioramento dei sintomi o se rileva un peggioramento dopo 8-12 settimane di trattamento, consulti il suo medico per valutare l'opportunità di terminare la terapia con Synerga.

Quali effetti collaterali può avere Synerga?

Come tutti i medicinali, anche Synerga può causare effetti collaterali, che però non si manifestano necessariamente in tutte le persone.

Possono insorgere, tra l'altro, reazioni di ipersensibilità (eruzioni cutanee, arrossamenti), fastidi allergici o gastrointestinali (diarrea, crampi addominali, fastidi allo stomaco, stitichezza, gonfiore addominale). Sono state segnalate anche sensazioni anomale in bocca e mal di testa.

Se osserva effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo, informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sull'etichetta.

Termine di consumo dopo l'apertura

Se si seguono queste istruzioni, Synerga rimane stabile per 4 settimane nel contenitore aperto a temperatura ambiente (tra 15 e 25°C). In frigorifero rimane stabile per 5 settimane. Un aspetto torbido o un'alterazione dell'odore indica che il prelievo non è stato effettuato in condizioni igieniche appropriate. In tal caso, non assumere più il medicamento.

Nel medicamento conservato in frigorifero può formarsi un precipitato cristallino, che si scioglie se il flacone viene immerso in acqua calda.

Istruzioni di conservazione

Conservare a temperatura ambiente (15-25°C).

Non congelare.

Conservare nella confezione originale.

Tenere ben chiuso il contenitore.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Indicazioni per lo smaltimento

Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. I medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, possono essere consegnati nelle farmacie o nei punti di raccolta. Queste misure aiutano a proteggere l'ambiente.

Ulteriori indicazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.



Cosa contiene Synerga?

5 ml di soluzione orale contengono:

Principi attivi

4.07 g di Escherichia coli – lisato (ceppo Laves)

Sostanze ausiliarie

Acqua depurata, 850 mg di lattosio, 210 mg di etanolo 96 % equiv. a etanolo 5.3 % v/v, 87 mg di glucosio, sodio cloruro equiv. a sodio 14.4 mg.

Numero dell'omologazione

69887 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Synerga? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezione contenente un flacone in vetro marrone da 100 ml con misurino accluso.

Titolare dell'omologazione

Laves-Arzneimittel GmbH

Lavesstrasse, CH-6247 Schötz

Questo foglietto illustrativo è stato aggiornato l'ultima volta nel maggio 2024 dal titolare dell'omologazione. Nessuna verifica contenutistica da parte di Swissmedic.

