

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant de prendre ou d'utiliser ce médicament. Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Renelix®, gouttes

Médicament homéopathique-spagyrique

Quand Renelix®, gouttes est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique, Renelix®, gouttes peut être utilisé sur ordonnance médicale en cas de maladies inflammatoires des voies urinaires et des calculs rénaux.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si Renelix®, gouttes peut être pris simultanément.

Quand Renelix®, gouttes ne doit-il pas être utilisé ou seulement avec précaution?

Renelix®, gouttes ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité connue contre la toxine de l'abeille (Apis mellifica D4). Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien, si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication).

Renelix®, gouttes contient 22 % V/V d'alcool.

Renelix®, gouttes peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Renelix®, gouttes ne doit pas être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.

Comment utiliser Renelix®, gouttes?

Sauf prescription contraire du médecin adultes 14-21 gouttes, enfants 8-12 gouttes jusqu'à trois fois par jour dans du liquide avec les repas. Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Renelix®, gouttes peut-il provoquer?

La prise de Renelix®, gouttes peut provoquer les effets secondaires suivants: Rarement des réactions d'hypersensibilité. Dans ce cas-là il faut arrêter le traitement immédiatement et consulter un médecin. Si vous remarquez des effets secondaires, qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cassez le traitement avec Renelix®, gouttes et informez-en votre médecin ou votre pharmacien.



A quoi faut-il encore faire attention?

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «A utiliser jusqu'au» sur le récipient. Conserver le médicament hors de portée des enfants. Conserver à température ambiante (15-25 °C). Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien. Renelix®, gouttes contient 22 % V/V d'alcool.

Que contient Renelix®, gouttes?

1 g de solution de gouttes contient:

Acidum benzoicum e resina D6 125mg ; Acidum nitricum D6 125mg ; Apis mellifica D4 105mg ; Berberis vulgaris spag. PEKA D6 145mg ; Capsella Bursa pastoris spag. PEKA D4 145mg ; Colchicum autumnale D4 145mg ; Dactylopius coccus D8 85mg ; Solidago virgaurea D6 125mg.

Cette préparation contient en outre 22 % V/V éthanol comme excipient.

Numéro d'autorisation

55335 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Renelix®, gouttes? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Emballage de 50 ml.

Titulaire de l'autorisation

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en mai 2004 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

