

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di far uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Questo medicamento potrebbe nuocere alla loro salute. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Renelix®, gocce

Medicamento omeopatico-spagirico

Quando si usa Renelix®, gocce?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici Renelix®, gocce può essere usato su prescrizione del suo medico in caso di malattie urinarie infiammabili e sofferenza di calcoli renali.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere Renelix®, gocce.

Quando non si può assumere Renelix®, gocce e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Renelix®, gocce non può essere usato in caso di ipersensibilità al veleno di api. Informi il suo medico o il suo farmacista se

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume o applica esternamente altri medicinali (anche se acquistati di propria iniziativa). Renelix®, gocce contiene 22 % vol. di alcol.

Si può assumere Renelix®, gocce durante la gravidanza o l'allattamento?

Renelix®, gocce non deve essere usato durante la gravidanza e l'allattamento.

Come usare Renelix®, gocce?

Salvo diversa prescrizione medica adulti fino a 3 volte per giorno 14-21 gocce, bambini fino a 3 volte per giorno 8-12 gocce in liquido con i pasti.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Renelix®, gocce?

In seguito all'assunzione di Renelix®, gocce possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali: In casi rari reazioni di ipersensibilità. In questo caso si deve annullare la terapia immediatamente e consultare un medico. Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Renelix®, gocce e informi suo medico o il suo farmacista.



Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con "Verw. B." sulla confezione.

Conservare il medicamento fuori dalla portata dei bambini. Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Il medico, il farmacista possono darle ulteriori informazioni. Renelix®, gocce contiene 22% vol. di alcol.

Cosa contiene Renelix®, gocce?

1g di soluzione contiene:

Acidum benzoicum e resina D6 125mg; Acidum nitricum D6 125mg; Apis mellifica D4 105mg; Berberis vulgaris spag. PEKA D6 145mg; Capsella Bursa pastoris spag. PEKA D4 145mg; Colchicum autumnale D4 145mg; Dactylopius coccus D8 85mg; Solidago virgaurea D6 125mg.

Contiene inoltre 22% vol. di alcol come sostanza ausiliaria.

Numero dell'omologazione

55335 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Renelix®, gocce? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia dietro presentazione della prescrizione medica.

Confezione da 50 ml.

Titolare dell'omologazione

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel maggio 2004 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

