

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Burgerstein Vitamine B6 100 mg

Antistress Aktiengesellschaft

Qu'est-ce que Burgerstein Vitamin B6 100 mg et quand doit-il être utilisé?

La vitamine B6 est une substance vitale qui doit être fournie à l'organisme par l'alimentation. Burgerstein Vitamin B6 100 mg est indiqué en cas de carence en vitamine B6 qui peut apparaître lors de besoins augmentés par la prise régulière de la pilule contraceptive ou de remèdes tels que certains produits antituberculeux et pénicillamines qui affaiblissent l'action de la vitamine B6. Une carence en vitamine B6 peut entraîner des modifications de la peau et des muqueuses et dans les cas graves, on peut également observer une anémie et des spasmes cérébraux.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien ou droguiste si Burgerstein Vitamin B6 100 mg peut être pris en même temps que ces médicaments.

Quand Burgerstein Vitamin B6 100 mg ne doit-il pas être utilisé?

Ce remède est contre-indiqué chez les patients ayant une hypersensibilité connue à la vitamine B6 ainsi que chez les personnes souffrant de la maladie de Parkinson et traités par la L-dopa.

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise de Burgerstein Vitamin B6 100 mg?

La vitamine B6 peut diminuer l'effet anticonvulsivant de remèdes utilisés en cas d'épilepsie (barbituriques, phénytoïne) et l'action de la L-dopa utilisée chez les parkinsoniens. Si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné, aucune précaution particulière n'est requise.

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste si vous souffrez d'une autre maladie, si vous êtes allergique ou si vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication!)

Burgerstein Vitamin B6 100 mg peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis du médecin ou du pharmacien ou du droguiste.

Comment utiliser Burgerstein Vitamin B6 100 mg?

Adultes: Sauf prescription contraire du médecin, prendre 1 comprimé de Burgerstein Vitamin B6 100 mg, sans le croquer, avec du liquide. L'utilisation et la sécurité de Burgerstein Vitamin B6 100 mg n'ont pas été établies à ce jour pour les enfants et les adolescents.

Si nécessaire, le comprimé Burgerstein 100 mg Vitamine B6 peut être cassé en deux (rainure de cassure) pour être avalé l'un après l'autre. Veuillez toutefois noter que la division au niveau de la rainure de rupture n'est pas adaptée pour une réduction de moitié de la dose.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien ou à votre droguiste.



Quels effets secondaires Burgerstein Vitamin B6 100 mg peut-il provoquer?

Les effets secondaires suivants peuvent se manifester lors de la prise de Burgerstein Vitamin B6 100 mg: Lors de la prise quotidienne de plus de 500 mg de vitamine B6 durant plusieurs semaines à plusieurs mois, des troubles des fonctions nerveuses ou de la coordination motrice peuvent être observés.

Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «Exp» sur le récipient.

Burgerstein Vitamin B6 100 mg doit être conservé hors de la portée des enfants, dans un endroit bien fermé, sec et à température ambiante (15-25°C).

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Burgerstein Vitamin B6 100 mg?

Principes actifs

Chaque comprimé pelliculé contient 100 mg de vitamine B6.

Excipients

Amidon de pomme de terre, lactose monohydraté, dextrine (amidon de maïs), talc, huile de ricin, dioxyde de silicium, gomme-laque (E 904).

Numéro d'autorisation

47054 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Burgerstein Vitamin B6 100 mg? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Emballages de 100 comprimés pelliculés.

Titulaire de l'autorisation

Antistress SA, Société pour la protection de la santé, CH-8640 Rapperswil-Jona

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en mars 2024 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

