

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Mucohäm D3, supposte

Medicamento omeopatico

Quando si usa Mucohäm D3?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici Mucohäm D3 può essere usato in caso di emorroidi e lesioni anali.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può usare Mucohäm D3.

Quando non si può usare Mucohäm D3 e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

In caso di forte perdita di sangue nelle feci, se i disturbi persistono ostinati per oltre due settimane nonché se sintomi nuovi e non abituati si presentano, si rivolge al medico per escludere la possibilità di oltre affezione.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- ⌚ ■ soffre di altre malattie
- ⌚ ■ soffre di allergie o
- ⌚ ■ assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa)!

Si può usare Mucohäm D3 durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare Mucohäm D3?

Salvo diversa prescrizione medica, introdurre 1 supposta al giorno nell'ano prima di coricarsi.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino piccolo/di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Mucohäm D3?



Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Mucohä m D3 e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di Mucohä m D3.

Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicinale non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «verwendbar bis» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Mucohä m D3?

1 supposta da 2 g contiene:

Principi attivi

Mucor racemosus e volumine cellulae (lyophil., steril.) D3 (HAB 6) 0.2 g

Sostanze ausiliarie

lattosio monoidrato, grasso duro

Numero dell'omologazione

50231 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Mucohä m D3? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezione da 10 supposte.

Titolare dell'omologazione

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Fabbricante

SANUM-Kehlbeck, GmbH & Co. KG, Postfach 1355, D-27316 Hoya

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel giugno 2024 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

