

Qu'est-ce que Panadol Junior 60 mg et quand doit-il être utilisé?

Panadol Junior 60 mg contient le principe actif paracétamol, qui apaise les douleurs et diminue la fièvre. Panadol Junior 60 mg est utilisé pour le traitement de courte durée des maux de tête, maux de dents, douleurs articulaires et ligamentaires, maux de dos, douleurs posttraumatiques (par ex. blessures sportives), douleurs en cas de refroidissement et fièvre.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Comme tous les antipyrétiques et analgésiques, Panadol Junior 60 mg ne doit pas être utilisé pendant plus de 3 jours, sans avis médical.

Les analgésiques ne doivent pas être utilisés régulièrement pendant une période prolongée sans contrôle médical. Des douleurs ou une fièvre persistante nécessitent une consultation médicale. Une fièvre élevée ou une aggravation de l'état général des enfants nécessite une consultation médicale à temps.

La posologie indiquée ou prescrite par le médecin ne doit pas être dépassée.

Pour éviter tout risque de surdosage, il faut s'assurer que les autres médicaments administrés en même temps ne contiennent *pas* de paracétamol (p.ex. des autres analgésiques, médicaments contre la fièvre ou des symptômes de refroidissement). Un surdosage de paracétamol peut provoquer des troubles hépatiques graves.

Rappelez-vous également que l'utilisation prolongée d'analgésiques peut elle aussi contribuer à entretenir les maux de tête.

L'administration prolongée d'analgésiques, particulièrement lorsqu'il s'agit d'une association de plusieurs principes actifs analgésiques, peut provoquer des lésions rénales durables impliquant un risque d'insuffisance rénale.

Quand Panadol Junior 60 mg ne doit-il pas être utilisé?

Panadol Junior 60 mg ne doit pas être utilisé dans les cas suivantes:

- En cas d'hypersensibilité au principe actif paracétamol et des substances apparentées (p.ex. du propacétamol) ou à l'un des excipients (voir «*Que contient Panadol Junior 60 mg?*»). Une hypersensibilité de cette espèce se manifeste, par ex. par de l'asthme, des difficultés respiratoires, des symptômes circulatoires, un gonflement de la peau et des muqueuses ou des éruptions cutanées (urticaire).
- En cas d'affections graves du foie (p.ex. hépatite aigüe; une cirrhose; une ascite, c'est-à-dire une accumulation de liquide dans la cavité abdominale).
- En cas de trouble héréditaire hépatique (appelé maladie de Meulengracht).

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Panadol Junior 60 mg?

Vous devez consulter le médecin de l'enfant avant l'administration de ce médicament:

- en cas d'insuffisance hépatique ou rénale;
- en présence d'une maladie héréditaire rare des globules rouges nommée «carence en glucose-6-phosphate déshydrogénase»;
- en cas d'utilisation concomitante de médicaments agissant sur le foie;
- en cas d'infection grave (p.ex. une septicémie);
- si les médicaments suivantes sont administrés:
 - médicaments anticoagulants (par ex. Marcoumar);
 - Cholestyramine (médicament pour baisser le taux de graisse dans le sang);



- Chloramphénicol (médicament contre les infections);
- Métoclopramide (médicament pour la nausée, vomissement);
- Phénytoïne, phénobarbital, carbamazépine (médicament contre l'épilepsie (convulsions));
- Rifampicine, isoniazide (médicament contre la tuberculose);
- Probenécide (médicament contre la goutte);
- Salicylamide (médicament contre les douleurs et la fièvre)
- Zidovudine (médicament contre le sida).

Dans de très rares cas, le paracétamol peut provoquer des réactions cutanées graves (par ex. pustulose exanthématique aiguë généralisée (PEAG), nécrolyse épidermique toxique (NET, syndrome de Lyell). Syndrome de Stevens-Johnson (SSJ). En cas d'apparition de réactions cutanées, il convient d'interrompre l'utilisation de Panadol Junior 60 mg et de consulter un médecin (voir « Quels effets secondaires Panadol Junior 60 mg peut-il provoquer? »).

Il ne faut pas administrer de médicaments contenant le principe actif paracétamol à des enfants qui ont bu de l'alcool. Le risque de lésion hépatique est accru, en particulier en cas de carence alimentaire concomitante.

Il est conseillé d'administrer Panadol Junior, suppositoires avec prudence en cas de trouble alimentaire tels que l'anorexie, la boulimie et un fort amaigrissement ainsi qu'en cas de malnutrition chronique. Soyez également prudent en cas de déshydratation et d'une quantité de sang moindre.

Certaines personnes présentant une hypersensibilité aux analgésiques ou antirhumatismaux peuvent aussi développer une réaction d'hypersensibilité au Panadol Junior 60 mg. Dans des cas très rares le paracétamol peut provoquer de fortes réactions cutanées (voir « *Quels effets secondaires Panadol Junior 60 mg peut-il provoquer?* »).

Si les symptômes ne s'améliorent pas, veuillez consulter le médecin de l'enfant.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si l'enfant à traiter

- souffre d'une autre maladie,
- s'il est allergique
- ou si vous lui faites prendre ou utiliser par voie externe déjà d'autres médicaments (même en automédication!).

Panadol Junior 60 mg peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Ce médicament est uniquement destiné à une utilisation chez les nourrissons et chez les enfants. Lors de la prise éventuelle de Panadol Junior 60 mg par des femmes adolescentes ou adultes, il faut tenir compte des informations suivantes:

Par mesure de précaution, il faut renoncer si possible à prendre des médicaments pendant la grossesse ou l'allaitement ou demander conseil à votre médecin ou pharmacien.

Si nécessaire, Panadol Junior 60 mg peut être utilisé pendant la grossesse. Sur la base de l'expérience acquise, le risque pour l'enfant est actuellement considéré comme faible en cas d'utilisation à court terme de la substance active paracétamol aux doses indiquées. Il est recommandé d'utiliser la dose la plus faible possible pour soulager votre douleur et/ou votre fièvre et d'utiliser le médicament pendant la période la plus courte possible. Consultez votre médecin ou votre pharmacien si les douleurs et/ou la fièvre ne sont pas soulagées ou si vous devez prendre le médicament à une fréquence plus régulière.

Bien que l'utilisation du paracétamol soit considérée comme compatible avec l'allaitement, la prudence est de mise lors de l'utilisation de Panadol Junior 60 mg pendant l'allaitement, car le paracétamol passe dans le lait maternel. Des éruptions cutanées ont été rapportées chez des nourrissons allaités. Cependant, aucune conséquence négative pour le nourrisson n'est connue.

Comment utiliser Panadol Junior 60 mg?



Les doses unitaires de suppositoires ne doivent pas être administrées plus fréquemment qu'indiqué ci-dessous.

Il ne faut pas dépasser la dose journalière maximale indiquée. Pour soulager les douleurs, vous devriez toujours administrer la dose efficace la plus faible pendant la plus courte durée possible.

Introduire les suppositoires dans le rectum.

Chez les nourrissons de moins de 3 mois, Panadol Junior 60 mg ne peut être utilisé qu'en accord avec le médecin.

Nourrissons de 4 à 6 kg de poids corporel (de 3 à 6 mois):

Toutes les 6 à 8 heures: 1 suppositoire Panadol Junior 60 mg au besoin jusqu'à 4 fois par 24 heures; la dose journalière maximale est de 4 suppositoires de 60 mg (= 240 mg de paracétamol/jour).

Nourrissons de 6 à 7 kg de poids corporel (3 à 6 mois):

Toutes les 4 à 6 heures: 1 suppositoire Panadol Junior 60 mg au besoin jusqu'à 6 fois par 24 heures; la dose journalière maximale est de 6 suppositoires de 60 mg (= 360 mg de paracétamol/jour).

Il existe d'autres dosages de Panadol Junior suppositoires adaptés aux autres tranches d'âge.

La durée du traitement rectal doit être aussi courte que possible.

L'utilisation de suppositoires n'est pas recommandée chez les patients souffrant de diarrhée.

Veuillez-vous conformer au dosage figurant dans cette notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous avez l'impression que l'efficacité du médicament est trop faible ou trop forte, veuillez-vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Panadol Junior 60 mg peut-il provoquer?

Arrêtez l'administration de Panadol Junior 60 mg et informez immédiatement votre médecin lorsqu'un ou plusieurs des symptômes suivants survient, ce qui pourrait être le signe d'une réaction allergique rare (réaction d'hypersensibilité):

- Éruption cutanée (incluant l'urticaire, démangeaison), rougeur, desquamation de la peau, très rarement jusqu'à de graves réactions cutanées avec vésication et/ou symptômes grippaux;
- gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge, formation de petites bulles, inflammation des muqueuses buccales, nausée;
- respiration haletante, asthme, dyspnée, insuffisance respiratoire, surtout si cela vous est déjà arrivé lors de l'utilisation d'acide acétylsalicylique ou d'autres antirhumatismaux non stéroïdiens (NSAIDs);
- hématome inattendus ou saignements.

Dans de rares cas, des modifications de la formule sanguine telles qu'une diminution du nombre de plaquettes (thrombopénie) ou une diminution sévère d'un type particulier de globules blancs (agranulocytose) ont été observées.

Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention?

Tenir hors de la portée des enfants.

Conserver à température ambiante (15 à 25 °C).

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

En cas d'utilisation incontrôlée (surdosage), consulter immédiatement un médecin, même si l'enfant ne présente aucun symptôme. Des mesures médicales immédiates s'imposent en raison d'un risque potentiel de lésions hépatiques très graves. Des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales, un manque d'appétit, une sensation générale de malaise peuvent être un signe de surdosage, survenant



toutefois plusieurs heures à un jour après l'utilisation.

Des médicaments contenant du paracétamol ne doivent pas être administrés à des enfants qui ont pris accidentellement de l'alcool.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux représentants des professions médicales.

Que contient Panadol Junior 60 mg?

1 suppositoire contient 60 mg paracétamol comme principe actif et des glycérides hémisynthétiques solides comme excipient.

Numéro d'autorisation

57454 (Swissmedic).

Où obtenez-vous Panadol Junior 60 mg? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Boîtes de 10 suppositoires Panadol Junior 60 mg.

Titulaire de l'autorisation

Haleon Schweiz AG, Risch.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en février 2025 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

