

Che cos'è Panadol Junior 60 mg e quando si usa?

Panadol Junior 60 mg contiene il principio attivo paracetamolo, che ha effetto analgesico e antipiretico. Panadol Junior 60 mg si usa per la terapia a breve scadenza di mal di testa, mal di denti, dolori alle articolazioni ed ai legamenti, mal di schiena, dolori dopo traumi (per esempio dovuti ad attività sportiva), dolori nelle malattie da raffreddamento e febbre.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Come tutti gli analgesici e gli antipiretici, anche il Panadol Junior 60 mg non va usato senza prescrizione medica per più di 3 giorni.

Gli analgesici non vanno somministrati regolarmente a lunga scadenza senza controllo medico. Dolori o febbre che persistono a lungo richiedono un chiarimento da parte del medico. In caso di febbre alta o di un peggioramento dei sintomi nei bambini, consultare tempestivamente il medico.

Non superare la posologia indicata o prescritta dal medico.

Per evitare il rischio di iperdosaggio, occorre accertarsi che altri medicinali (ad es. altri analgesici, antipiretici o medicinali contro le malattie da raffreddamento) che vengono assunti nello stesso tempo *non* contengano paracetamolo. Un sovradosaggio di paracetamolo può causare gravi danni epatici.

Si deve anche tener presente che la somministrazione continuata di analgesici può di per sé contribuire a far sì che il mal di testa persista.

La somministrazione a lunga scadenza di analgesici, specialmente in caso di associazione di diversi principi attivi antidolorifici, può provocare delle lesioni renali permanenti con rischio di insufficienza renale.

Quando non si può usare Panadol Junior 60 mg?

Nei seguenti casi non deve usare Panadol Junior 60 mg:

- In caso di ipersensibilità al principio attivo paracetamolo e a sostanze simili (ad es. proparacetamolo) o a uno degli eccipienti (vedi «*Cosa contiene Panadol Junior 60 mg?*»).
- Un'ipersensibilità di questo genere si manifesta per es. sotto forma di asma, difficoltà respiratorie, disturbi circolatori, gonfiori a livello della pelle e delle mucose o eruzioni cutanee (orticaria).
- In presenza di gravi malattie del fegato (ad es. epatite acuta; cirrosi epatica; ascite ovvero accumulo di liquidi nell'addome).
- In presenza di un disturbo ereditario del fegato (cosiddetta malattia di Meulengracht).

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Panadol Junior 60 mg?

Si consiglia di consultare il medico del bambino prima dell'assunzione:

- in caso di malattie epatiche o renali;
- nel caso di una rara malattia ereditaria dei globuli rossi del sangue, la cosiddetta «careenza di glucosio-6-fosfato deidrogenasi»;
- durante l'uso contemporaneo di medicinali che influenzano il fegato;
- se ha una grave infezione (per es. sepsi);
- se assume i seguenti medicinali:
 - Medicamenti antiaggreganti (ad es. Marcumar);
 - Colestiramina (medicamento contro il colesterolo);
 - Cloramfenicolo (medicamento contro le infezioni);
 - Metoclopramide (medicamento contro nausea e vomito);



- Fenitoina, fenobarbital, carbamazepina (medicamenti contro l'epilessia (convulsioni));
- Rifampicina, isoniazide (medicamento contro la tubercolosi);
- Probenecid (medicamento contro la gotta);
- Salicilammide (medicamento contro dolori e febbre);
- Zidovudina (medicamento contro l'infezione da HIV (AIDS)).

In casi molto rari, il paracetamolo può causare gravi reazioni cutanee (ad es. pustolosi esantematica acuta generalizzata (PEAG), necrolisi epidermica tossica (NET, sindrome di Lyell), sindrome di Stevens-Johnson (SJS)). Se si verificano reazioni cutanee, interrompere l'uso di Panadol Junior 60 mg e consultare il medico (cfr. «Quali effetti collaterali può avere Panadol Junior 60 mg?»).

I medicinali a base del principio attivo paracetamolo non possono essere somministrati ai bambini che abbiano bevuto alcool. Il rischio di un danno epatico aumenta soprattutto in assenza di concomitante assunzione di cibo.

In caso di disturbi dell'alimentazione come anoressia, bulimia e forte dimagrimento, nonché di denutrizione cronica, è opportuno impiegare Panadol Junior supposte con cautela. Occorre inoltre prestare attenzione in caso di disidratazione e ridotte quantità di sangue.

Singole persone ipersensibili ad analgesici o antireumatici possono avere una reazione di ipersensibilità anche con Panadol Junior 60 mg (vedi «Quali effetti collaterali può avere Panadol Junior 60 mg?»).

Consulti il medico del bambino se i sintomi non migliorano.

Informi il medico, il farmacista o il droghiere se il bambino da trattare

- soffre di altre malattie,
- è allergico
- o se somministra al bambino o gli applica esternamente altri medicinali (anche se acquistati di propria iniziativa!).

Si può somministrare Panadol Junior 60 mg durante la gravidanza o l'allattamento?

Questo medicinale è destinato unicamente all'uso nei bambini. In caso di eventuale assunzione di Panadol Junior 60 mg da parte di donne adolescenti o adulte, valgono le seguenti indicazioni:

Per prudenza si dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista.

Se necessario, Panadol Junior 60 mg può essere utilizzato durante la gravidanza. Sulla base delle esperienze precedenti, il rischio per il bambino derivante dall'uso a breve termine del principio attivo paracetamolo nel dosaggio specificato è attualmente considerato basso. È necessario utilizzare la dose più bassa possibile per alleviare il dolore e/o la febbre e utilizzare il medicinale per il periodo di tempo più breve possibile. Consulti il medico o il farmacista se il dolore e/o la febbre non si attenuano o se deve assumere il medicinale più spesso.

Sebbene l'uso del paracetamolo sia considerato compatibile con l'allattamento al seno, occorre usare cautela nell'uso di Panadol Junior 60 mg durante l'allattamento, poiché il paracetamolo passa nel latte materno. Sono state riportate eruzioni cutanee in neonati allattati al seno. Tuttavia, non sono noti effetti negativi per il neonato.

Come usare Panadol Junior 60 mg?

Non somministrare le singole dosi di supposte più frequentemente di quanto indicato di seguito.

La dose massima giornaliera indicata non deve essere superata. Per alleviare i sintomi si dovrebbe sempre usare la dose efficace più bassa per la durata più breve possibile.

Introdurre le supposte nell'intestino retto.

Nei lattanti di età inferiore ai 3 mesi Panadol Junior 60 mg può essere utilizzato solo dopo aver consultato il medico.



Lattanti con un peso corporeo di 4-6 kg (di 3-6 mesi):

Ogni 6-8 ore: 1 supposta da Panadol Junior 60 mg, al bisogno fino a 4 somministrazioni in 24 ore; la dose massima giornaliera è di 4 supposte da 60 mg (= 240 mg di paracetamolo/giorno).

Lattanti con un peso corporeo di 6-7 kg (di 3-6 mesi):

Ogni 4-6 ore: 1 supposta da Panadol Junior 60 mg, al bisogno fino a 6 somministrazioni in 24 ore; la dose massima giornaliera è di 6 supposte da 60 mg (= 360 mg di paracetamolo/giorno).

Per le altre fasce di età esistono supposte di Panadol Junior con altri dosaggi.

La durata del trattamento per via rettale deve essere il più breve possibile.

L'uso delle supposte è sconsigliato nei pazienti con diarrea.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte, ne parli al medico, al farmacista o al droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Panadol Junior 60 mg?

Interrompa l'assunzione di Panadol Junior 60 mg e informi subito il suo medico se si manifestano uno o più dei seguenti sintomi, che possono essere segni di una rara reazione allergica (reazione di ipersensibilità):

- Eruzione cutanea (comprese orticaria e prurito), arrossamento cutaneo, desquamazione cutanea, reazioni cutanee da molto rare a gravi con vescicole e/o sintomi simil-influenzali;
- Gonfiore del viso, delle labbra, della lingua o della gola, comparsa di vesciche, infiammazione della mucosa orale, nausea;
- Respiro sibilante, asma, dispnea, mancanza di respiro, soprattutto se tali reazioni si sono già manifestate in precedenza in relazione all'impiego di acido acetilsalicilico o altri antireumatici non steroidei (FANS);
- Ematomi o emorragie imprevisti.

In rari casi sono state osservate alterazioni dell'emogramma quali la diminuzione del numero di piastrine (trombocitopenia) o un forte calo di determinati globuli bianchi (agranulocitosi).

Se osserva effetti collaterali qui non descritti dovrebbe informare il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Si può usare Panadol Junior 60 mg solo fino alla data indicata con «EXP» sulla confezione.

In caso di somministrazione incontrollata (sovradosaggio), consultare immediatamente un medico, anche se il bambino non ha ancora sintomi. A causa del rischio di un grave danno epatico, un tempestivo intervento medico è decisivo. Nausea, vomito, dolori di ventre, inappetenza, sensazione generale di essere ammalato possono essere indizi di iperdosaggio, ma si manifestano solamente da alcune ore a un giorno dopo il impiego del medicamento.

I medicinali con il principio attivo paracetamolo non vanno somministrati a bambini che hanno assunto per sbaglio dell'alcol.

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di documentazione specializzata e dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Panadol Junior 60 mg?

1 supposta contiene 60 mg di paracetamolo quale principio attivo e la sostanza ausiliaria adeps solidus.

Numero dell'omologazione



57454 (Swissmedic).

Dov'è ottenibile Panadol Junior 60 mg? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e drogheria senza prescrizione medica.

Confezioni da 10 supposte Panadol Junior 60 mg.

Titolare dell'omologazione

Haleon Schweiz AG, Risch.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel febbraio 2025 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

