

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant de prendre ou d'utiliser ce médicament. Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Aloxi® 500 microgrammes capsule molle

Medius AG

Qu'est-ce que Aloxi et quand doit-il être utilisé?

Aloxi appartient à un groupe de médicaments appelés antagonistes de la sérotonine (5-HT₃).

Ces médicaments peuvent inhiber (bloquer) l'action de la sérotonine, une substance chimique qui peut causer des nausées et des vomissements.

Aloxi est indiqué pour la prévention des nausées et vomissements associés aux chimiothérapies anticancéreuses chez les patients adultes, selon prescription du médecin.

Quand Aloxi ne doit-il pas être pris?

N'utilisez jamais Aloxi

- si vous êtes allergique au palonosétron ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise d'Aloxi?

Veuillez informer votre médecin:

- si vous avez une occlusion intestinale aiguë ou des antécédents de constipation fréquente.
- si Aloxi vous est administré avec d'autres médicaments qui peuvent provoquer des anomalies du rythme cardiaque, par exemple des médicaments contre les troubles du rythme cardiaque (p.ex. amiodarone, nicardipine, quinidine), des médicaments contre les infections (p.ex. des antibiotiques tels que la moxifloxacine ou l'érythromycine), des médicaments antipsychotiques (p.ex. halopéridol, chlorpromazine, quétiapine), des médicaments stimulants de la motilité gastrointestinale (p.ex. dompéridone).
- si vous prenez des médicaments pour traiter la dépression ou l'anxiété, notamment des médicaments appelés ISRS («inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine») tels que la fluoxétine, la paroxétine, la sertraline, la fluvoxamine, le citalopram, l'escitalopram) ou IRSN («inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline») tels que la venlafaxine, la duloxétine. Ceux-ci peuvent entraîner le développement d'un syndrome sérotoninergique et doivent donc être utilisés avec précaution.
- si vous avez des antécédents personnels ou familiaux d'une modification particulière du rythme cardiaque (allongement de l'intervalle QT),
- si vous avez d'autres problèmes cardiaques,
- si vous présentez un déséquilibre de certains minéraux dans le sang tels que le potassium et le magnésium, qui n'a pas été traité.

Aloxi ne doit pas être utilisé les jours suivant la chimiothérapie, sauf si vous devez recevoir un autre cycle de chimiothérapie.

Ce médicament contient 7 mg de sorbitol par capsule molle. Le sorbitol est une source de fructose. Si votre médecin vous a informé(e) que vous présentiez une intolérance à certains sucres ou si vous avez été diagnostiqué(e) avec une intolérance héréditaire au fructose (IHF), un trouble génétique rare caractérisé par l'incapacité à décomposer le fructose, parlez-en à votre médecin avant que vous ne preniez ou ne



receviez ce médicament.

Ce médicament peut contenir des traces de lécithine de soja. Si vous êtes allergique à l'arachide ou au soja, vous devez consulter immédiatement votre médecin si vous remarquez des signes de réaction allergique. Les signes peuvent être de l'urticaire, une éruption cutanée, des démangeaisons, des difficultés à respirer ou à avaler, un gonflement des lèvres, du visage, de la langue ou de la gorge, ainsi que, dans certains cas, une chute de la tension artérielle.

Aloxi peut provoquer des étourdissements ou une fatigue. Si vous ressentez ces symptômes, vous ne devez pas conduire un véhicule ou utiliser des machines.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication!).

Aloxi peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Grossesse

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, votre médecin n'utilisera pas Aloxi, sauf en cas de nécessité absolue.

On ne sait pas si Aloxi peut avoir des effets nocifs lorsqu'il est administré pendant la grossesse.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Allaitement

On ne sait pas si Aloxi est excrété dans le lait maternel.

Si vous allaitez, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant d'utiliser Aloxi.

Comment utiliser Aloxi?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

En général, vous devrez prendre Aloxi capsule molle par voie orale environ 60 minutes avant le début de la chimiothérapie.

La dose recommandée est une capsule molle (500 microgrammes) d'Aloxi prise au cours ou en dehors des repas.

Si vous pensez que vous pouvez avoir pris plus d'Aloxi que vous n'auriez dû, informez immédiatement votre médecin.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit, Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Aloxi peut-il provoquer?

Fréquent (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 100):

Maux de tête

Occasionnel (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 1000):

Troubles du sommeil

Essoufflement

Gonflement des yeux

Anomalies de la transmission de l'influx électrique dans le cœur

Constipation



Nausées

Taux élevé du pigment bilirubine (un marqueur de troubles hépatiques) dans le sang

Douleurs musculaires

Très rare (concerne moins d'un utilisateur sur 10 000):

Réaction allergique

Les signes peuvent être un gonflement des lèvres, du visage, de la langue ou de la gorge, des difficultés pour respirer ou un collapsus respiratoire; vous pourriez également remarquer une éruption nodulaire qui démange (urticaire). Vous devez consulter immédiatement votre médecin si vous remarquez un de ces signes de réaction allergique.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur l'emballage.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25 °C).

Conserver hors de la portée des enfants.

Mention concernant l'élimination des médicaments

Ne jetez aucun médicament avec les eaux usées ou les ordures ménagères. Rapportez les médicaments périmés ou qui ne sont plus utilisés dans les ménages dans un point de remise ou un centre de collecte. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Aloxi?

Principes actifs

1 capsule molle contient 500 microgrammes de palonosétron (sous forme de chlorhydrate)

Excipients

Monocaprylocaprate de glycérol (type I), glycérol, dioléate de polyglycérol-3, eau purifiée, butylhydroxyanisole (E320), gélatine, solution de sorbitol et de sorbitane, dioxyde de titane (E171).

Numéro d'autorisation

62952 (Swissmedic).

Où obtenez-vous Aloxi? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

Aloxi est disponible en pharmacie, sur ordonnance médicale.

Boîte de 1 capsule molle.

Titulaire de l'autorisation

Medius AG, 4132 MuttENZ

Fabricant

Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd., Irlande.



Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en janvier 2026 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

