

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico o del suo farmacista. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

KCI Retard Hausmann, compresse a rilascio prolungato

Doetsch Grether AG

Che cos'è le compresse a rilascio prolungato KCI Retard Hausmann e quando si usa?

Il potassio è un elemento vitale. Una carenza di potassio può provocare disturbi muscolari, renali, digestivi e cardiaci. KCI Retard Hausmann, compresse a rilascio prolungato contengono un sale di potassio. Sono indicate in caso di carenza di potassio con tendenza all'alcalosi (aumento del pH nel sangue). La carenza di potassio si verifica per esempio, con perdite eccessive, ad esempio con l'uso o l'abuso di alcuni diuretici (saluretici), lassativi, farmaci per il cuore (digossina), malattie epatiche.

Anche un eccesso di potassio è pericoloso e può provocare disturbi digestivi, neuromuscolari e cardiaci. Per questa ragione si raccomanda di prendere KCI Retard Hausmann, compresse a rilascio prolungato solo dopo consultazione del medico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Si deve bere a sufficienza.

Quando non si possono assumere le compresse a rilascio prolungato KCI Retard Hausmann?

Non si devono prendere le compresse a rilascio prolungato KCI Retard Hausmann se soffre dei disturbi seguenti:

- iperkaliemia (livello troppo alto di potassio nel sangue);
- insufficienza renale, oliguria (escrezione di urina molto ridotta);
- insufficienza delle ghiandole surrenali (per esempio malattia di Addison non trattata);
- essiccasi grave (grave disidratazione del corpo), ustioni gravi;
- ulcere gastrointestinali;
- se sta prendendo alcuni diuretici che favoriscono la ritenzione di potassio (spironolattone, canrenone, triamterene, amiloride);
- in caso di restringimento del tratto gastrointestinale (stenosi);
- in caso di motilità gastrointestinale gravemente ridotta a causa di alcune malattie o trattamenti (anticolinergici);
- tuttavia, la semplice stitichezza non è una controindicazione.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione delle compresse a rilascio prolungato KCI Retard Hausmann?

Informi il suo medico nel caso in cui soffre delle malattie seguenti:

- malattie cardiovascolari;
- malattie renali. Bisogna assicurarsi che l'escrezione di urina da parte del rene sia funzionante;
- in caso di miotonia congenita (spasmi muscolari, malattia di Thomsen).

L'equilibrio idro-elettrolitico e l'equilibrio acido-base devono essere monitorati regolarmente.



Alcuni farmaci per abbassare la pressione sanguigna (i cosiddetti ACE-inibitori come captopril o enalapril) o farmaci per il cuore (preparati digitalici) possono causare un aumento dei livelli di potassio e devono quindi essere assunti insieme a KCl Retard Hausmann, compresse a rilascio prolungato solo su espressa prescrizione del medico.

Informi il suo medico o il suo farmacista, nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa).

Si possono assumere le compresse a rilascio prolungato KCl Retard Hausmann durante la gravidanza o l'allattamento?

Sì, se il medico lo prescrive.

Come usare le compresse a rilascio prolungato KCl Retard Hausmann?

La posologia deve venire adattata per ogni paziente. Si attenga scrupolosamente alle istruzioni del suo medico. Le posologie seguenti sono solo dei valori medi.

La dose giornaliera dovrebbe venire suddivisa in 2-4 prese, con i pasti.

Salvo diversa prescrizione del medico:

Adulti

Trattamento preventivo

Da 3 a 5 compresse a rilascio prolungato al giorno.

Trattamento di una carenza di potassio

Da 7 a 10 compresse a rilascio prolungato al giorno.

La somministrazione della dose giornaliera in una sola volta è inadeguata. Può provocare un iperdosaggio o una eliminazione troppo rapida. La durata del trattamento viene stabilita dal medico.

L'uso e la sicurezza delle compresse a rilascio prolungato KCl Retard Hausmann nei bambini e negli adolescenti non sono stati finora esaminati.

Ingerire le *compresse a rilascio prolungato* con molta acqua, *senza masticarle* (dopo i pasti).

Se dimentica una dose, continui il trattamento, ma non prenda più di una dose alla volta.

La somministrazione di una dose eccessiva può provocare dei disturbi neuromuscolari e cardiaci (pizzicori o pesantezza nelle membra, debolezza, apatia, paralisi, abbassamento della pressione sanguigna, disturbi del ritmo cardiaco, stato di shock).

In tal caso, smetta immediatamente il trattamento e consulti il medico.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista.

Quali effetti collaterali possono avere le compresse a rilascio prolungato KCl Retard Hausmann?

Con l'assunzione delle compresse a rilascio prolungato KCl Retard Hausmann possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Raro (riguarda da 1 a 10 persone su 10 000):

Disturbi digestivi (nausea, vomito, diarrea, dolori al ventre, flatulenze), pizzicore e/o eruzione cutanea come pure orticaria.

Molto raro (riguarda meno di 1 persona su 10 000):



Ostruzione, sanguinamento e ulcerazione al livello gastrointestinale, con o senza perforazione.

Una iperkaliemia (tasso eccessivo di potassio nel sangue) può sopravvenire nei pazienti in cui l'eliminazione renale e la distribuzione del potassio nell'organismo sono perturbate.

Se i sintomi sono gravi o se le feci contengono sangue o sono nere, si deve interrompere immediatamente il trattamento e avvertire il medico.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico o al suo farmacista soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

La matrice delle compresse a rilascio prolungato (ossia la massa che conteneva il principio attivo) può essere ritrovata intatta nelle feci. Questo non ha nessuna conseguenza sull'efficacia del prodotto.

Istruzioni di conservazione

Conservare a temperatura ambiente (15-25°C).

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contengono le compresse a rilascio prolungato KCl Retard Hausmann?

Principi attivi

746 mg di cloruro di potassio, corrispondente a 10 mmol di potassio rispettivamente a 391 mg di potassio.

Sostanze ausiliarie

Ammonio metacrilato copolimero (tipo A), ammonio metacrilato copolimero (tipo B), trietile citrato, silice colloidale anidra, magnesio stearato, talco, simeticone.

Guscio della compressa: talco, ammonio metacrilato copolimero (tipo A), ammonio metacrilato copolimero (tipo B), macrogol 6000, trietile citrato, titanio diossido (E171), indigotina (E132), simeticone.

Numero dell'omologazione

36360 (Swissmedic)

Dove sono ottenibili le compresse a rilascio prolungato KCl Retard Hausmann? Quali confezioni sono disponibili?

Ottenibili in farmacia, senza prescrizione medica, dopo una consulenza professionale personale da parte del farmacista.

Confezioni da 40 o 200 compresse a rilascio prolungato.

Titolare dell'omologazione

Doetsch Grether AG, 4051 Basel

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel dicembre 2021 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

