

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico o del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Desloratadina Spirig HC®

Spirig HealthCare AG

Che cos'è Desloratadina Spirig HC e quando si usa?

Desloratadina Spirig HC allevia i sintomi della rinite allergica (ad esempio raffreddore da fieno), come starnuti, naso che cola, prurito al naso, naso intasato, prurito al palato, prurito agli occhi, occhi arrossati o lacrimanti.

Desloratadina Spirig HC è inoltre impiegato nel trattamento dei sintomi associati all'orticaria (una malattia della pelle causata da un'allergia). Di questi sintomi fanno parte il prurito e la tipica eruzione cutanea.

Quando non si può assumere Desloratadina Spirig HC?

Desloratadina Spirig HC non può essere usato in caso d'ipersensibilità alla desloratadina o alla loratadina o ad uno degli altri componenti di Desloratadina Spirig HC.

I bambini sotto i 12 anni non possono assumere Desloratadina Spirig HC compresse rivestite con film.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Desloratadina Spirig HC?

Non sono disponibili dati reattivi all'uso di Desloratadina Spirig HC nei pazienti affetti da malattie renali ed epatiche.

Generalmente Desloratadina Spirig HC non compromette la capacità di rendimento o di concentrazione. Si raccomanda, tuttavia, di non svolgere attività che richiedono una vigilanza mentale, quali ad esempio la guida di autoveicoli o l'uso di macchinari, fino a quando non si è stabilita la propria reazione al medicamento.

Desloratadina Spirig HC contiene isomalto. Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicamento.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o,
- assume o applica altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa!) o li applica esternamente o se ha una storia medica o familiare di convulsioni.

Si può assumere Desloratadina Spirig HC durante la gravidanza o l'allattamento?

Durante la gravidanza o l'allattamento non dovrebbe assumere Desloratadina Spirig HC.

Informi il suo medico se è in stato di gravidanza o sta pianificando una gravidanza o se allatta.

Come usare Desloratadina Spirig HC?

Adulti e ragazzi sopra i 12 anni

Una compressa rivestita di Desloratadina Spirig HC da 5 mg una volta al giorno.

La compressa rivestita va inghiottita intera (senza masticare) con un po' d'acqua.

Le compresse rivestite di Desloratadina Spirig HC si possono assumere indipendentemente dai pasti.

Assuma Desloratadina Spirig HC per tutto il tempo prescritto dal medico.



Bambini sotto i 12 anni

Nei bambini di età inferiore ai 12 anni, non è possibile un adeguato aggiustamento della dose con Desloratadina Spirig HC 5 mg, la compressa rivestita. In questo caso, si raccomanda l'uso di una preparazione di desloratadina che permette un dosaggio inferiore adattato (per esempio soluzione orale con il principio attivo desloratadina). Se ha assunto più Desloratadina Spirig HC del dovuto, si rivolga immediatamente al suo medico o al suo farmacista.

Se ha dimenticato di prendere Desloratadina Spirig HC, non assuma una dose doppia per compensare quella dimenticata, ma prosegua il trattamento secondo lo schema posologico abituale con la dose successiva.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Desloratadina Spirig HC?

Con l'assunzione di Desloratadina Spirig HC si possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Comune (riguarda da 1 a 10 persone su 100)

Stanchezza.

Non comune (riguarda da 1 a 10 persone trattate su 1000)

Mal di testa e secchezza delle fauci.

Molto raro (riguarda da 1 a 10 persone trattate su 10 000)

Gravi reazioni allergiche (difficoltà respiratorie, respiro sibilante), eruzioni cutanee e prurito, tachicardia, palpitazioni, polso irregolare, nausea, mal di stomaco, vomito, disturbi di stomaco, diarrea, vertigini, allucinazioni, sonnolenza, agitazione associata ad aumentata attività fisica, convulsioni, dolori muscolari, infiammazione del fegato e disturbi della funzionalità epatica.

Frequenza non nota (non può essere definita sulla base dei dati disponibili)

Aumentato appetito.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Istruzioni di conservazione

Conservare Desloratadina Spirig HC nella confezione originale, a temperature non superiori a 30°C e fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Desloratadina Spirig HC?

Principi attivi

1 compressa rivestita con film di Desloratadina Spirig HC contiene 5 mg di desloratadina come principio attivo.

Sostanze ausiliarie



Nucleo della compressa: Isomalto (E 953), amido pregelatinizzato, cellulosa microcristallina, magnesio ossido pesante, idrossipropilcellulosa, crospovidone (tipo A), magnesio stearato.

Rivestimento della compressa: alcool polivinilico, titanio diossido (E 171), macrogol 3350, talco, indigotina (E 132).

Numero dell'omologazione

63030 (Swissmedic).

Dov'è ottenibile Desloratadina Spirig HC? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Sono disponibili confezioni da 10, 30 e 50 compresse rivestite con film.

Titolare dell'omologazione

Spirig HealthCare SA, 4622 Egerkingen.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel marzo 2024 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

