

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo, perchè contiene informazioni importanti. Questo medicamento le è stato prescritto dal medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica, in farmacia. Faccia uso corretto del medicamento o segua le indicazioni del medico o del farmacista al fine di ottenere il maggior beneficio. Conservi questo foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Gocce Dr. Reckeweg® R41 Fortivirone

Che cosa sono le gocce Dr. Reckeweg® R41 Fortivirone e quando si usano ?

Secondo i canoni della medicina omeopatica le gocce Dr. Reckeweg® R41 Fortivirone trovano principalmente impiego in caso di esaurimento nervoso nell'uomo.

Quali precauzioni sono da osservare durante il trattamento?

Nel caso in cui il medico le avesse già prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se è possibile associare ad essi le gocce Dr. Reckeweg® R41 Fortivirone. In caso di disturbi persistenti per più di un mese consultare un medico.

Quando non si possono usare le gocce Dr. Reckeweg® R41 Fortivirone e quando la loro somministrazione richiede prudenza?

Non somministrare le gocce Dr. Reckeweg® R41 Fortivirone ai bambini e adolescenti.

Informi il suo medico o il suo farmacista se:

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie,
- assume altri medicinali o fa uso di medicinali per uso esterno (anche acquistati di propria iniziativa).

Come usare le gocce Dr. Reckeweg® R41 Fortivirone?

Salvo diversa prescrizione medica, assumere 15 gocce, in poca acqua, 2-3 volte al dì. Nei casi cronici e per ottenere un effetto terapeutico più rapido, 10-15 gocce ogni 1-2 ore per 2-3 giorni. Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali possono avere le gocce Dr. Reckeweg® R41 Fortivirone?

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto delle gocce Dr. Reckeweg® R41 Fortivirone. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista. Nel corso dell'assunzione di medicinali omeopatici si può verificare un aggravamento temporaneo dei sintomi (aggravamento iniziale). In caso di aggravamento persistente interrompa il trattamento con le gocce Dr. Reckeweg® R41 Fortivirone e informi il medico o il farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicinale può essere utilizzato solamente fino alla data indicata con «EXP» sul contenitore. Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C). Conservare fuori della portata dei bambini. Altre informazioni possono essere fornite dal suo medico o farmacista. Le gocce contengono alcool 35 % Vol.

Cosa contengono le gocce Dr. Reckeweg® R41 Fortivirone?

10 ml contengono: Acidum phosphoricum D12 1 ml, Cinchona succirubra (China) D12 1 ml, Conium maculatum D30 1 ml, Phosphorus D6 1 ml, Sepia officinalis D30 1 ml, Testis (suis) D12 1 ml, Turnera diffusa (Damiana) D6 1 ml, Vitex agnus-castus D8 1 ml e come eccipienti alcool e acqua. Contiene alcool 35 % Vol.

Numero dell'omologazione

45069

Dove sono ottenibili le gocce Dr. Reckeweg® R41 Fortivirone? Quali confezioni sono disponibili?



In vendita in farmacia senza ricetta medica. Flacons di gocce da 50 ml.

Titolare dell'omologazione

Laboratoire Jacques Reboh et fils SA

Route de la Glâne 4

CH-1680 Romont

Fabbricante

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH

D - 64625 Bensheim

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel 08/2004 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

