

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Sulfarlem S 25®

Che cos'è Sulfarlem S25 e quando si usa?

Sulfarlem S25 elimina o previene la bocca secca, che può essere causata, tra l'altro, da trattamenti farmacologici o radiologici.

Sulfarlem S25 facilita la prosecuzione di questi trattamenti ed evita i problemi di bocca secca che spesso si verificano con terapie a lungo termine.

Sulfarlem S25 è utilizzato principalmente per l'insufficienza salivare causata da alcuni medicinali o osservata durante la terapia radiologica, in alcune malattie o nei pazienti anziani.

Sulfarlem S25 può essere utilizzato anche per trattare la riduzione della lacrimazione.

Quando non si può assumere/usare Sulfarlem S25?

Sulfarlem S25 non deve essere utilizzato in caso di ostruzione delle vie biliari o di gravi disturbi della funzionalità epatica.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione/nell'uso di Sulfarlem S25?

I pazienti che presentano reazioni di ipersensibilità ai coloranti azoici, all'acido acetilsalicilico nonché agli antireumatici e antidolorifici (inibitori delle prostaglandine), non devono usare Sulfarlem S25. Questo medicamento contiene solo una piccolissima quantità di glutine (dall'amido di frumento) ed è molto improbabile che possa causarle problemi se è celiaco. Se lei è allergico al frumento (condizione diversa dalla celiachia) non prenda questo medicamento.

Sulfarlem S25 contiene lattosio. Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

Sulfarlem S25 contiene due coloranti (giallo arancio S (E 110) e rosso cocciniglia A (E 124)), che possono causare reazioni allergiche.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente.

Si può assumere/usare Sulfarlem S25 durante la gravidanza o l'allattamento?

In generale, durante la gravidanza e l'allattamento i medicinali vanno assunti con grande cautela e solo su indicazione del medico.

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza



dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare Sulfarlem S25?

Secondo le indicazioni del medico.

In generale, 3 confetti al giorno (1 prima di ogni pasto).

Il trattamento può essere effettuato in modo continuativo o con una pausa di 5 giorni al mese.

L'effetto terapeutico ottimale si manifesta gradualmente dopo alcuni giorni.

L'uso e la sicurezza di Sulfarlem S25 confetti nei bambini e negli adolescenti finora non sono stati esaminati.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte, ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Sulfarlem S25?

Con l'assunzione di Sulfarlem S25 si possono manifestare i seguenti effetti collaterali:

Può scatenare reazioni da ipersensibilità della pelle e degli organi respiratori, soprattutto in pazienti con asma, orticaria cronica o ipersensibilità all'acido acetilsalicilico e ad altri antireumatici e antidolorifici.

Casi isolati e lievi, principalmente gastrointestinali, spesso diarrea lieve, che scompaiono con un adeguamento temporaneo del dosaggio.

La colorazione delle urine è normale e non deve preoccupare.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Istruzioni di conservazione

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Sulfarlem S25?

1 confetto contiene

Principi attivi

25 mg di anetoltritone

Sostanze ausiliarie

Lattosio monoidrato 6 mg, gomma arabica (E414), amido di frumento 8,5 mg, saccarosio 46,18 mg, amido di mais 1,6 mg, gomma di guar (E412), silice colloidale idrata, magnesio stearato, gelatina, talco, titanio



diossido (E171), giallo arancio S 0,04 mg (E110), rosso cocciniglia A 0,01 mg (E124), cera carnauba (E903).

Numero dell'omologazione

37234 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Sulfarlem S25? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezione da 60 confetti.

Titolare dell'omologazione

Recordati AG, 4057 Basel

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel settembre 2023 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

