

SIMILASAN maux de voyage N

Médicament homéopathique

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant le médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Quand SIMILASAN maux de voyage N est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique SIMILASAN maux de voyage N peut être utilisé en cas de:
Maux de voyage (en voiture, avion, bateau, train) tels que nausée, vomissements, vertige
Nausée et vomissements précédant un voyage

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Ce médicament contient 0,24 g d'hydrates de carbone digestibles par dose simple.

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si le médicament homéopathique SIMILASAN maux de voyage N peut être pris simultanément.

Quand SIMILASAN maux de voyage N ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution?

Ne pas utiliser SIMILASAN maux de voyage N chez les nourrissons et les enfants de moins de 2 ans. Aucune limitation d'emploi n'est connue à ce jour. Si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné, aucune précaution particulière n'est requise.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique,
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication).

SIMILASAN maux de voyage N peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement ?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Comment utiliser SIMILASAN maux de voyage N ?

Ne pas utiliser SIMILASAN maux de voyage N chez les nourrissons et les enfants de moins de 2 ans.

Si votre médecin n'a pas fait une autre prescription: Enfants à partir de 2 ans et adultes:

Prévention avant le voyage: 2 à 3 fois 1 comprimé, la veille.

Le jour du voyage: 1 à 2 fois avant le départ. Pendant le voyage, plusieurs fois 1 comprimé par jour, au gré des besoins (toutes les demi-heures pour les cas extrêmes).

Mode d'emploi:

Laisser fondre le comprimé dans la bouche (éventuellement mâcher) et bien le répartir avec la langue sur les muqueuses avoisinantes.

Les comprimés peuvent être pris même si vous êtes à jeun.

Le temps d'action d'un médicament peut varier d'une personne à l'autre. C'est pourquoi il est conseillé d'administrer une nouvelle prise lorsque l'effet de la préparation diminue ou lorsque les troubles reviennent. Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si l'amélioration escomptée de l'enfant en bas âge / de l'enfant ne se produit pas, faites-le examiner par un médecin.



Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires SIMILASAN maux de voyage N peut-il provoquer?

L'emploi approprié du médicament n'a donné lieu à aucun effet secondaire attesté à ce jour. Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale).

Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec SIMILASAN maux de voyage N et informez votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

A quoi faut-il encore faire attention?

Conserver hors de portée des enfants.

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date indiquée sur le récipient par la mention <Exp.>.

Conserver à température ambiante entre 15 et 25 °C.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient SIMILASAN maux de voyage N ?

1 comprimé contient: Cerium oxalicum D15 / Hyoscyamus niger D15 / Mandragora e radice siccata D15 / Anamirta cocculus D15 à parts égales 6,25 mg.

Excipients: lactose, amidon de maïs et stéarate de magnésium.

Numéro d'autorisation

67510

Où obtenez-vous SIMILASAN maux de voyage N ? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Conditionnement: 60 comprimés

Titulaire de l'autorisation

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en août 2019 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

