

SIMILASAN disturbi da viaggio N

Medicamento omeopatico

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni. Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Quando si usa SIMILASAN disturbi da viaggio N?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici, SIMILASAN disturbi da viaggio N può essere usato in caso di:

Disturbi da viaggio (automobile, aeroplano, nave, ferrovia) come nausea, vomito e vertigini

Nausea e vomito prima del viaggio

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere SIMILASAN disturbi da viaggio N.

Questo medicamento contiene 0,24 g di carboidrati digeribili per singola dose.

Qualora siano stati prescritti altri medicinali da parte del medico curante, consultare il medico o il farmacista per sapere se è possibile assumere contemporaneamente anche SIMILASAN disturbi da viaggio N.

Quando non si può assumere SIMILASAN disturbi da viaggio N e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

SIMILASAN disturbi da viaggio N non deve essere assunto nei neonati e nei bambini di età inferiore a 2 anni. Finora non sono note limitazioni d'uso. Se usato correttamente non è necessario adottare particolari precauzioni.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere inel caso in cui:

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o,
- assume esternamente altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa).

Si può usare SIMILASAN disturbi da viaggio N durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare SIMILASAN disturbi da viaggio N?

SIMILASAN disturbi da viaggio N non deve essere assunto nei neonati e nei bambini di età inferiore a 2 anni. Salvo diversa prescrizione medica, attenersi alla seguente posologia: Bambini oltre due anni e adulti:

Profilassi prima del viaggio: 2–3 volte una pastiglia il giorno prima del viaggio

Il giorno del viaggio: 1–2 pastiglie prima della partenza. Durante il viaggio, a seconda dei disturbi, 1 pastiglia più volte al giorno (nei casi più estremi, ogni mezz'ora).

Avvertenze per l'assunzione:

Far sciogliere la pastiglia in bocca (eventualmente masticandola) e distribuirla con la lingua sulle mucose della bocca.

Può essere somministrato anche a stomaco vuoto.

La durata dell'effetto varia a seconda del soggetto.



In generale si consiglia di ripetere la somministrazione del preparato in caso di riduzione dell'effetto o di ripresa dei sintomi. Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento riguarda un bambino e non si ottiene il miglioramento desiderato, il bambino deve essere visitato da un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere SIMILASAN disturbi da viaggio N?

Se osserva effetti collaterali qui non descritti dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere. Non sono stati finora osservati effetti collaterali in seguito all'impiego corretto di SIMILASAN disturbi da viaggio N.

Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere. Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale).

Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con SIMILASAN disturbi da viaggio N e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con <EXP.> sul contenitore.

Conservare a temperatura ambiente (15–25 °C).

Il medico o il farmacista o il droghiere, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene SIMILASAN disturbi da viaggio N?

1 pastiglia contiene: Cerium oxalicum D15 / Hyoscyamus niger D15 / Mandragora e radice seccata D15 / Anamirta cocculus D15 in parti uguali 6,25 mg. Eccipienti: lattosio, amido di mais e stearato di magnesio.

Numero dell'omologazione

67510

Dove è ottenibile SIMILASAN disturbi da viaggio N? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezione: 60 pastiglie

Titolare dell'omologazione

Similasan AG, CH-8916 Jönen

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel agosto 2019 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

