Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni. Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico o del suo farmacista.
Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Regenaplex Nr. 28a Gocce

Medicamento omeopatico

Quando si usa Regenaplex Nr. 28a?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicamenti omeopatici, Regenaplex Nr. 28a può essere usato in caso di parodontosi, stomatite ulcerosa (lesione della gengiva e infiammazione della mucosa della bocca).

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicamenti, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere Regenaplex Nr. 28a.

Quando non si può usare Regenaplex Nr. 28a e quando il suo uso richiede prudenza?

Finora non sono note limitazioni d'uso. Se usato correttamente, non è necessario adottare particolari precauzioni.
Informi il suo medico o il suo farmacista nel caso in cui
- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicamenti (anche se acquistati di sua iniziativa!).

Si può assumere Regenaplex Nr. 28a durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicamenti durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista.

Come usare Regenaplex Nr. 28a?

Se il medico non ha prescritto diversamente:
Adulti: 8 - 10 gocce, 1 - 2 volte al giorno.
Istruzioni per l'assunzione: Versare le gocce direttamente sulla lingua o diluire con un po' d'acqua. Trattenere le gocce in bocca almeno per un minuto, prima di deglutirle. Non mangiare né bere nulla 15 minuti prima e 15 minuti dopo l'assunzione del medicamento.
Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Regenaplex Nr. 28a?

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di Regenaplex Nr. 28a. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista. Con l'assunzione di medicamenti omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Regenaplex Nr. 28a e informi il suo medico o il suo farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Conservare le gocce a temperatura ambiente (15 - 25 °C).
Le gocce contengono alcool 50% vol.
Il medico o il farmacista possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Regenaplex Nr. 28a?

10,0 ml contiene volta 1,00 ml: Acidum arsenicosum D 30, Acidum hydrochloricum D 10, Acidum nitricum D 8, Agave americana D 4, Angelica archangelica D 6, Apis mellifica D 6, Cochlearia officinalis D 3, Glechoma hederacea D 3, Lachesis D 20, Thuja occidentalis D 4.Le gocce contengono alcool 50% vol.

Numero dell'omologazione

36850 01 019

Dove è ottenibile Regenaplex Nr. 28a? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia, senza prescrizione medica.
Confezioni: 15 ml

Titolare dell'omologazione

REGENA AG, Tägerwilen

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel novembre 2011 dall'autorità competente in materia di medicamenti (Swissmedic).