

Selomida® Peau

Poudre pour solution buvable

Médicament biochimique selon le Dr. Schüssler

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Selomida® Peau, Poudre pour solution buvable

Médicament biochimique selon le Dr. Schüssler

Quand Selomida Peau est-il utilisé?

Conformément aux principes thérapeutiques biochimiques selon le Dr. Schüssler, Selomida Peau peut être utilisé pour favoriser la cicatrisation et traiter les problèmes de peau se manifestant par des symptômes tels qu'éruptions cutanées, démangeaisons, desquamation, mucosités et sécrétions humides.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée exclusivement sur les principes thérapeutiques biochimiques.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Ce médicament ne convient pas au traitement d'états de carence en substances grossières (par ex. en zinc, potassium).

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si Selomida Peau peut être pris simultanément.

Ce médicament contient 7,5 g d'hydrates de carbone digestibles par dose simple.

Quand Selomida Peau ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution?

Les plaies étendues, très sales et profondes, ainsi que les plaies dues à des morsures et des piqûres nécessitent un traitement médical (risque de tétanos). Si l'étendue d'une plaie ne diminue pas pendant un certain temps ou que la plaie ne guérit pas en l'espace de 7 jours, il est également nécessaire de consulter un médecin. Il en va de même lorsque les berges de la plaie sont fortement rouges, que la plaie enfle soudainement, est douloureuse ou que la blessure s'accompagne de fièvre (risque de septicémie).

En cas de lésions cutanées étendues, d'infections et de soupçon de maladies systémiques, il est nécessaire de consulter un médecin.

Ne pas administrer chez les enfants de moins de 2 ans.

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament. Contient 7,5 g de lactose (3,75 g de glucose et 3,75 g de galactose) par dose/sachet. Ceci est à prendre en compte pour les patients atteints de diabète sucré.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie,



- vous êtes allergique ou
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication!).

Selomida Peau peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Comment utiliser Selomida Peau?

Enfants dès 2 ans, adolescents et adultes:

En cas de troubles aigus, dissoudre le contenu d'un sachet dans un grand verre d'eau ou de thé jusqu'à 3 fois par jour, puis boire la solution à petites gorgées.

En cas de troubles chroniques, dissoudre chaque jour le contenu d'un sachet dans un grand verre d'eau ou de thé, puis boire la solution à petites gorgées réparties sur toute la journée.

Ne pas administrer chez les enfants de moins de 2 ans.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. En l'absence de l'amélioration escomptée lors d'un traitement chez l'enfant, veuillez consulter un médecin.

Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Selomida Peau peut-il provoquer?

Ce médicament peut déclencher chez les personnes souffrant d'intolérance au lactose des troubles gastro-intestinaux ou des diarrhées.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25°C).

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient Selomida Peau?

7,5 g (1 sachet) contient:

Principes actifs

Nº 1 Calcium fluoratum (HAB) D12 1,25 g

Nº 4 Kalium chloratum (HAB) D6 (HAB 6) 1,25 g

Nº 6 Kalium sulfuricum (HAB) D6 (HAB 6) 1,25 g

Nº 8 Natrium chloratum (HAB) D6 (HAB 6) 1,25 g



N° 11 Silicea (HAB) D12 1,25 g

N° 21 Zincum chloratum (Ph.Eur.) D12 (HAB 6) 1,25 g

Excipients

Monohydrate de lactose 7,5 g

Numéro d'autorisation

65359 (Swissmedic) ((*Vignette D*))

Où obtenez-vous Selomida Peau? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Emballages de 30 sachets à 7,5 g poudre pour solution buvable.

Titulaire de l'autorisation

Schwabe Pharma AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en novembre 2022 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

