

Selomida® Cute

Polvere per soluzione orale

Medicamento biochimico secondo il Dr. Schüssler

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico, del farmacista o del droghiere.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Selomida® Cute, Polvere per soluzione orale

Medicamento biochimico secondo il Dr. Schüssler

Quando si usa Selomida Cute?

Secondo il principio terapeutico biochimico del Dr. Schüssler, Selomida Cute può essere utilizzato come supporto nella guarigione delle ferite e nel trattamento dei disturbi cutanei che si manifestano con sintomi quali eruzione cutanea, prurito, desquamazione, croste o secrezioni umide.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa esclusivamente sui principi di un indirizzo terapeutico biochimico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Questo medicamento non è destinato al trattamento delle carenze minerali (es. di zinco, potassio).

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere Selomida Cute.

Questo medicamento contiene 7,5 g di carboidrati digeribili per singola dose.

Quando non si può assumere Selomida Cute e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Le ferite di grandi dimensioni, molto contaminate e profonde, le ferite da morso e da puntura richiedono un trattamento medico (rischio di tetano). Anche se le dimensioni della ferita rimangono immutate per qualche tempo o se la ferita non si rimargina entro 7 giorni è necessaria una visita medica. Rivolgersi al medico anche se i margini della ferita sono fortemente arrossati, se la ferita improvvisamente si gonfia, è molto dolorosa o se è accompagnata da febbre (pericolo di sepsi).

In presenza di ampie alterazioni cutanee, di infezioni e sospetto di malattie sistemiche, consultare il medico.

Non adatto a bambini di età inferiore a 2 anni.

Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicamento. Contiene 7,5 g di lattosio (3,75 g di glucosio e 3,75 g di galattosio) per dose/bustina. Da tenere in considerazione in persone affette da diabete mellito.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa!).



Si può assumere Selomida Cute durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico, farmacista o droghiere.

Come usare Selomida Cute?

Bambini dai 2 anni, adolescenti e adulti:

Nei disturbi acuti, sciogliere fino a 3 volte al giorno il contenuto di una bustina in un bicchiere d'acqua o di tè e bere a piccoli sorsi.

Nei disturbi cronici, sciogliere ogni giorno il contenuto di una bustina in un bicchiere d'acqua o di tè e bere a piccoli sorsi distribuiti nel corso della giornata.

Non adatto a bambini di età inferiore a 2 anni.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Selomida Cute?

Nelle persone con intolleranza al lattosio (lo zucchero del latte), l'assunzione del medicamento può causare disturbi gastrointestinali o avere un effetto lassativo.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Selomida Cute?

7,5 g (1 bustina) contiene:

Principi attivi

Nº 1 Calcium fluoratum (HAB) D12 1,25 g

Nº 4 Kalium chloratum (HAB) D6 (HAB 6) 1,25 g

Nº 6 Kalium sulfuricum (HAB) D6 (HAB 6) 1,25 g

Nº 8 Natrium chloratum (HAB) D6 (HAB 6) 1,25 g

Nº 11 Silicea (HAB) D12 1,25 g

Nº 21 Zincum chloratum (Ph.Eur.) D12 (HAB 6) 1,25 g

Sostanze ausiliarie

Lattosio monoidrato 7,5 g



Numero dell'omologazione

65359 (Swissmedic) ((*Vignette D*))

Dove è ottenibile Selomida Cute? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni da 30 bustine da 7,5 g polvere per soluzione orale.

Titolare dell'omologazione

Schwabe Pharma AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel novembre 2022 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

