

▼ Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Vous pouvez y contribuer en signalant tout effet secondaire. Voir à la fin de la rubrique «Quels effets secondaires Hepcludex peut-il provoquer?» pour savoir comment déclarer les effets secondaires.

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant d'utiliser ce médicament. Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Si Hepcludex a été prescrit à votre enfant, veuillez noter que toutes les informations contenues dans la présente notice d'emballage s'appliquent à votre enfant (dans ce cas, veuillez lire «votre enfant» au lieu de «vous»).

HEPCLUDEX®, POUDRE POUR SOLUTION INJECTABLE

Gilead Sciences Switzerland Sàrl

Qu'est-ce que l'Hepcludex et quand doit-il être utilisé?

Hepcludex contient le principe actif bulévirtide. Il s'agit d'un médicament antiviral, utilisé dans le traitement des infections à long terme (chroniques) par le virus de l'hépatite delta (VHD) chez les adultes et les enfants de 3 ans ou plus dont le poids corporel est d'au moins 10 kg présentant une maladie hépatique compensée (chez lesquels le foie travaille encore assez bien). Une infection par le virus de l'hépatite delta mène à une inflammation du foie.

Pour entrer dans les cellules, le VHD a besoin d'une certaine protéine présente dans les cellules du foie. Le bulévirtide, principe actif de ce médicament, bloque la protéine et empêche ainsi que le VHD arrive dans les cellules du foie. Cela permet d'empêcher la propagation du VHD dans le foie et de calmer l'inflammation.

Vous ne pouvez obtenir Hepcludex que sur prescription de votre médecin.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Avant d'utiliser Hepcludex, assurez-vous que les professionnels de la santé vous ont appris à préparer et à injecter Hepcludex.

Quand Hepcludex ne doit-il pas être utilisé?

Hepcludex ne doit pas être utilisé

- si vous êtes allergique au bulévirtide ou à l'un des excipients contenus dans ce médicament.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation d'Hepcludex?

Informez votre médecin avant d'utiliser Hepcludex si:

- Vous avez d'autres problèmes de foie qu'une infection par le virus de l'hépatite D et de l'hépatite B.
- Vous avez des problèmes rénaux.
- Vous avez une infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ou une infection par le virus de l'hépatite C (VHC) - on ignore l'efficacité d'Hepcludex en présence de ces co-infections. Votre médecin peut vous prescrire des analyses de sang afin de vérifier si vous présentez une infection par le VIH ou le VHC.
- Vous avez une ou plusieurs autres maladies.

Pendant l'administration d'Hepcludex



Hepcludex peut provoquer des effets secondaires graves, y compris:

- Aggravation d'une infection par le VHD ou le virus de l'hépatite B (VHB). Votre infection par le VHD ou le VHB peut s'aggraver (poussée de la maladie) si vous utilisez Hepcludex, puis arrêtez de l'utiliser. On parle de «poussée de la maladie» lorsque l'infection par le VHD ou le VHB réapparaît brusquement, sous une forme plus grave que précédemment. N'interrompez pas l'utilisation d'Hepcludex sans en avoir parlé au préalable à votre médecin.

Si l'un des points mentionnés ci-dessus vous concerne (ou si vous avez des doutes), adressez-vous immédiatement à votre médecin. Vous trouverez d'autres informations dans la rubrique «Quels effets secondaires Hepcludex peut-il provoquer?»

Utilisation d'Hepcludex avec d'autres médicaments

Informez votre médecin ou votre pharmacien de tous les autres médicaments que vous utilisez, avez utilisés récemment ou pourriez utiliser à l'avenir. Hepcludex peut avoir des interactions avec d'autres médicaments.

Certains médicaments peuvent renforcer les effets secondaires d'Hepcludex et vous ne devez pas prendre ces médicaments en même temps. Il convient donc d'informer votre médecin si vous prenez un des médicaments suivants:

- ciclosporine, un médicament supprimeur du système immunitaire;
- ézétimibe, utilisé pour traiter l'excès de cholestérol dans le sang;
- irbésartan, utilisé pour traiter l'hypertension artérielle et les maladies cardiaques;
- ritonavir, utilisé pour traiter une infection par le VIH;
- sulfasalazine, utilisée pour traiter la polyarthrite rhumatoïde, la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn.

Hepcludex peut renforcer ou diminuer l'efficacité ou les effets secondaires de certains médicaments en cas de prise simultanée. Dans certains cas, des examens spécifiques doivent être effectués ou votre médecin pourra modifier la posologie ou vous surveiller régulièrement:

- ciclosporine, sirolimus et tacrolimus, qui ciblent le système immunitaire;
- carbamazépine, un médicament utilisé pour traiter les crises d'épilepsie;
- estrone-3-sulfate, un complément hormonal pour la ménopause;
- atorvastatine, fluvastatine, pitavastatine, pravastatine, rosuvastatine et simvastatine utilisés pour traiter l'excès de cholestérol dans le sang;
- hormones thyroïdiennes utilisées dans le traitement des problèmes de thyroïde;
- bosentan, utilisé pour le traitement de l'hypertension pulmonaire;
- docétaxel et paclitaxel, médicaments utilisés pour traiter le cancer;
- féxofénadine, un antihistaminique utilisé en cas d'allergies;
- glyburide, répaglinide et natéglinide pour le traitement du diabète;
- olméstartan, telmisartan et valsartan pour le traitement de l'hypertension artérielle;
- glécaprévir, grazoprévir et voxilaprévir, médicaments utilisés pour traiter l'hépatite C.

Enfants et adolescents

À ce jour, l'utilisation et la sécurité d'Hepcludex chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans n'ont pas été étudiées dans des études cliniques. La posologie recommandée d'Hepcludex d'une fois par jour pour les enfants de 3 ans ou plus dont le poids corporel est d'au moins 10 kg, atteints d'une maladie hépatique compensée, est basée sur des méthodes de modélisation qui prennent en compte les concentrations du médicament dans le sang. Il peut exister un risque accru d'une faible teneur en vitamines liposolubles (y compris d'une déficience en vitamine D). Un complément en vitamines peut, dans ce cas,



s'avérer nécessaire.

Sodium

Un flacon d'Hepcludex contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par injection, c.-à-d. qu'il est essentiellement «sans sodium».

Aptitude à la conduite et l'utilisation de machines

Aucune étude n'a été menée concernant les effets d'Hepcludex sur l'aptitude à conduire ou la capacité à utiliser des machines. Une sensation de vertige peut survenir comme effet secondaire, ce qui pourrait affecter votre aptitude à la conduite et à l'utilisation de machines.

Veillez informer votre médecin ou votre pharmacien si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez d'autres médicaments (même en automédication!)

Hepcludex peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, ou si vous présumez d'être enceinte ou envisagez une grossesse, demandez conseil à votre médecin avant l'utilisation de ce médicament. N'utilisez ce médicament que si votre médecin vous l'a spécifiquement prescrit.

Si vous êtes une femme en âge d'avoir des enfants, vous devez utiliser ce médicament uniquement en association avec une méthode de contraception efficace.

Discutez avec votre médecin afin de décider si vous pouvez allaiter votre enfant pendant que vous prenez Hepcludex.

On ignore si Hepcludex passe dans le lait maternel. Cela est toutefois improbable. Il faut donc décider si l'allaitement doit être interrompu ou si Hepcludex doit être arrêté.

Comment utiliser Hepcludex?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. En cas de doute, adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien.

Hepcludex doit être administré, une fois par jour, par injection directement sous la peau (injection sous-cutanée).

Dose recommandée

La dose recommandée chez l'adulte est de 2 mg une fois par jour.

La dose recommandée d'Hepcludex chez les patients de 3 à moins de 18 ans dépend du poids corporel, comme indiqué dans le tableau présenté ci-dessous.

Âge / poids corporel	Dose	Quantité à injecter
Enfants de 3 ans et plus, qui pèsent au moins 10 kg, mais moins de 25 kg	1 mg une fois par jour	0,5 ml
Enfants de 3 ans et plus qui pèsent au moins 25 kg mais moins de 35 kg	1,5 mg une fois par jour	0,75 ml
Enfants de 3 ans et plus qui pèsent 35 kg ou plus	2 mg une fois par jour	1,0 ml



L'administration de 2 mg/ml d'Hepcludex par injection sous-cutanée correspond à une dose administrée de 1,7 mg.

Votre médecin vous indiquera la durée d'utilisation de ce médicament.

Votre médecin et les professionnels de la santé vous montreront comment préparer et injecter Hepcludex. Cette notice d'emballage contient un guide d'injection étape par étape, pour vous aider lors de l'injection du médicament. Voir sous «Instructions d'utilisation» à la fin de cette notice d'emballage.

- Avant d'utiliser Hepcludex, assurez-vous que les professionnels de la santé vous ont appris à préparer et à injecter Hepcludex.
- Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de votre médecin. Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit, sauf si le médecin vous l'a conseillé.
- Utilisez Hepcludex une fois par jour (toutes les 24 heures).
- Restez sous surveillance médicale quand vous utilisez Hepcludex.

Oubli d'une injection d'Hepcludex

Ne manquez **aucune** dose d'Hepcludex.

Si vous oubliez une dose, rattrapez la dose manquante dès que possible le même jour. S'il est déjà presque l'heure de la prochaine dose, sautez la dose oubliée et reprenez le schéma habituel pour la prochaine dose. Ne prenez pas de dose double.

Ne pas interrompre l'utilisation d'Hepcludex

N'interrompez pas l'utilisation d'Hepcludex sans en avoir parlé au préalable à votre médecin. L'arrêt du traitement peut entraîner la réactivation de l'infection et l'aggravation de votre maladie. Si cela se produit, vous devrez peut-être recommencer le traitement par Hepcludex. Si vous arrêtez de prendre Hepcludex, votre médecin doit vérifier souvent votre état de santé et effectuer des analyses sanguines régulièrement afin de surveiller votre foie. Informez votre médecin de tout symptôme nouveau ou inhabituel qui surviendrait après l'arrêt de l'utilisation d'Hepcludex.

Si vous avez utilisé une plus grande quantité d'Hepcludex que vous n'auriez dû

Si vous pensez avoir utilisé plus d'Hepcludex que vous n'auriez dû, contactez immédiatement votre médecin.

Enfants et adolescents

Les enfants de moins de 3 ans ou dont le poids corporel est inférieur à 10 kg ne doivent pas être traités par Hepcludex.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Hepcludex peut-il provoquer?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut également provoquer des effets secondaires, mais ils ne surviennent pas chez tout le monde.

Très fréquent (concerne plus d'une personne sur 10)

- maux de tête
- réactions au site d'injection
- démangeaison de la peau
- augmentation des sels biliaires dans le sang

Fréquent (concerne 1 à 10 personnes sur 100)

- sensation vertigineuse



- nausées
- fatigue
- augmentation du nombre de globules blancs (éosinophiles)

Fréquence inconnue (ne peut être estimée sur la base des données disponibles)

- Hypersensibilité, y compris réaction anaphylactique

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Tenir hors de portée des enfants.

Conserver au réfrigérateur (2-8 °C).

Conserver le flacon dans l'emballage d'origine pour protéger le contenu de la lumière.

Utiliser les flacons immédiatement après la reconstitution. Cependant, si ce n'est pas possible, ils peuvent être conservés à une température allant jusqu'à 25 °C pendant une durée maximale de 2 heures.

Important: les flacons, les seringues, les aiguilles ou le reste d'eau stérile pour préparations injectables d'Hepcludex ne doivent pas être réutilisés. Hepcludex et les composants sont à usage unique. Tous les composants doivent être éliminés après utilisation, y compris l'eau stérile pour préparations injectables non utilisée.

Remarque concernant l'élimination des médicaments

Ne jetez aucun médicament avec les eaux usées ou les ordures ménagères. Les médicaments périmés ou qui ne sont plus utilisés dans les ménages peuvent être rapportés dans les pharmacies ou dans les centres de collecte. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Hepcludex?

Chaque flacon d'Hepcludex contient:

Principes actifs

Bulévirtide acétate correspondant à 2 mg de bulévirtide.

En raison du résidu de médicament restant dans la seringue et dans l'aiguille, la dose réellement injectée est de 1,7 mg lorsque 2 mg/ml d'Hepcludex sont administrés par voie sous-cutanée.

Excipients

Carbonate de sodium anhydre, bicarbonate de sodium, mannitol, acide chlorhydrique (pour l'ajustement du pH), hydroxyde de sodium (pour l'ajustement du pH)

Numéro d'autorisation

68338 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Hepcludex? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, seulement sur ordonnance médicale non renouvelable.



Emballages de 30 flacons unidoses.

Titulaire de l'autorisation

Gilead Sciences Switzerland Sàrl, Zug

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en novembre 2025 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).



Instructions d'utilisation – Hepcludex, 2 mg poudre pour solution injectable

Avant d'utiliser Hepcludex, vous devez d'abord lire la notice d'emballage.

Avant de commencer le traitement par ce médicament chez vous, votre médecin ou les professionnels de la santé vous montreront comment préparer et injecter Hepcludex. Ce guide vous explique comment vous injecter vous-même Hepcludex. Si quelque chose ne vous semble pas clair, si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide ou d'informations complémentaires, parlez-en avec votre médecin ou les professionnels de la santé. Prenez le temps de soigneusement préparer et injecter Hepcludex.



Si Hepcludex a été prescrit à votre enfant, veuillez noter que ces instructions d'injection étape par étape pour l'administration d'Hepcludex sont conçues pour vous, c.-à-d. la personne en charge de l'enfant, si l'enfant ne peut pas s'administrer lui-même Hepcludex. Les enfants ou les adolescents ne doivent s'administrer eux-mêmes l'injection que s'ils ont été formés par un professionnel de santé et s'ils sont supervisés par une personne adulte qui est responsable d'eux.

Remarque: les fournitures (aiguilles, seringues, eau stérile pour préparations injectables) non incluses dans la boîte d'Hepcludex peuvent présenter une taille, une forme et une couleur légèrement différentes de celles illustrées dans ce guide d'injection étape par étape. Ces instructions décrivent les étapes à suivre pour reconstituer et injecter Hepcludex à l'aide d'un exemple de kit de fournitures. Si vous avez des questions, veuillez contacter votre professionnel de la santé ou votre pharmacien(ne).



Sites d'injection	Bas-ventre	Partie supérieure de la cuisse
Les sites d'injection les plus appropriés sont le ventre et la partie supérieure de la cuisse, comme indiqué sur les images. Afin de réduire les réactions au site d'injection, vous pouvez changer de site d'injection d'Hepcludex à chaque injection. N'injectez pas Hepcludex dans les zones suivantes: genou, aine, partie inférieure ou interne des fesses, directement au-dessus d'un vaisseau sanguin, autour du nombril, dans du tissu cicatriciel, dans un bleu, un grain de beauté, une cicatrice chirurgicale, un tatouage ou une brûlure, ou au niveau d'un site où vous présentez déjà une réaction au site d'injection.		

1. Avant l'injection




			
1A	1B	1C	1D
Conservation	Préparer des doses	Se laver les mains	Nettoyer le flacon
Les flacons d'Hepcludex doivent être conservés dans leur emballage original au réfrigérateur (2-8 °C), afin de protéger Hepcludex de la lumière.	Les instructions suivantes sont valables pour la dilution d'une dose unique.	Lavez-vous soigneusement les mains au savon et à l'eau chaude et séchez-les avec un linge propre. Une fois que vos mains sont propres, ne touchez plus à rien, excepté au médicament, à vos fournitures médicales et à la zone autour du site d'injection.	Essuyez le haut du flacon avec une compresse d'alcool neuve et laissez-le sécher à l'air libre. Si vous touchez le haut du bouchon en caoutchouc après l'avoir nettoyé, répétez l'opération à l'aide d'une compresse d'alcool neuve.

2. Mélange pour l'injection

		
2A	2B	2C
Prélever de l'eau stérile pour préparations injectables	Injecter l'eau stérile pour préparations injectables dans la poudre	Mélanger doucement Hepcludex





Prenez la seringue. Fixez l'aiguille la plus longue dessus. Important! Assurez-vous que l'aiguille munie de son capuchon est bien fixée en appuyant légèrement dessus tout en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Retirez le capuchon en plastique. Ouvrez le flacon contenant l'eau stérile pour préparations injectables. Insérez l'aiguille dans le flacon d'eau et retournez le flacon doucement vers le bas. Assurez-vous que le bout de l'aiguille reste toujours sous la surface de l'eau pour éviter que des bulles d'air n'entrent dans la seringue. Tirez lentement sur le piston, jusqu'à prélever 1 ml d'eau stérile pour préparations injectables dans la seringue. Retirez prudemment l'aiguille et la seringue du flacon.	Tapotez doucement le flacon d'Hepcludex pour détacher la poudre. Insérez entièrement l'aiguille de la seringue contenant l'eau stérile dans le flacon d'Hepcludex en la faisant pénétrer à 90° verticalement au centre du bouchon en caoutchouc. Injectez lentement la totalité de l'eau stérile pour préparations injectables. Retirez l'aiguille du flacon, puis entreposez la seringue et l'aiguille dans un endroit sûr.	Tapotez doucement le flacon d'Hepcludex du bout du doigt pendant 10 secondes pour que la poudre commence à se dissoudre. Roulez ensuite lentement le flacon d'Hepcludex entre vos mains pour bien mélanger le contenu. Vérifiez qu'il n'y a pas de poudre d'Hepcludex collée aux parois du flacon. Important! Ne secouez pas le flacon d'Hepcludex. Si vous le secouez, vous ferez mousser le médicament et il mettra beaucoup plus de temps pour se dissoudre.
---	--	---

		
2D	2E	2F
Inspecter Hepcludex	Hepcludex prêt pour l'injection	Nettoyer le flacon
Une fois que la poudre commence à se dissoudre, mettez-la simplement de côté	Une fois qu'elle est entièrement mélangée, la solution d'Hepcludex devrait être limpide.	Nettoyez une nouvelle fois le haut du flacon d'Hepcludex à l'aide d'une compresse d'alcool






jusqu'à dissolution complète. La dissolution peut prendre jusqu'à 3 minutes après que vous avez tapoté le flacon.	Important! Lorsqu'il est entièrement dissous, Hepcludex doit être limpide et ne doit pas mousser. Si la solution d'Hepcludex contient de la mousse, attendez un peu plus, jusqu'à ce que la poudre soit dissoute. Si vous voyez des bulles, tapotez doucement le flacon jusqu'à ce que les bulles disparaissent. Si vous voyez des particules dans la solution d'Hepcludex une fois que la poudre est (entièrement) dissoute, n'utilisez pas ce flacon. Contactez votre médecin ou le pharmacien qui vous l'a délivré. Hepcludex reconstitué doit être utilisé immédiatement.	neuve. Laissez sécher à l'air libre.
---	---	--

3. Injection de la dose




			
3A	3B	3C	3D
Insérer l'aiguille dans le flacon	Prélever Hepcludex	Terminer la préparation	Changer d'aiguille et jeter l'aiguille usagée
Prenez la seringue en main.	Retournez doucement le flacon vers le bas. Assurez-vous que le bout de l'aiguille reste	Tapotez doucement la seringue et poussez/tirez sur le piston pour retirer	Retirez l'aiguille longue de la seringue et jetez-la de façon appropriée dans un récipient pour



Réinsérez entièrement l'aiguille dans le flacon d'Hepcludex en la faisant pénétrer à 90° verticalement au centre du bouchon en caoutchouc.	toujours sous la surface de la solution d'Hepcludex pour éviter que des bulles d'air n'entrent dans la seringue. Vérifiez à nouveau la quantité à injecter à l'aide du tableau intitulé <i>Dose recommandée</i> dans le chapitre «Comment utiliser Hepcludex?» dans la notice d'emballage. Retirez lentement le piston de la seringue afin d'aspirer la quantité requise de liquide.	l'excès d'air et les bulles. Vous devrez peut-être tirer le piston au-delà de la graduation sur la seringue pour vous assurer d'avoir finalement prélevé la quantité exacte d'Hepcludex dans la seringue. Retirez prudemment l'aiguille et la seringue du flacon.	objets tranchants ou pointus afin que personne ne puisse se blesser. Important! Ne remettez pas le capuchon en plastique sur l'aiguille.
---	---	--	---

			
3E	3F	3G	3H
Fixer l'aiguille pour l'injection	Choisir le site d'injection	Rabattre le dispositif de sécurité vers l'arrière (le cas échéant)	Retirer le capuchon de l'aiguille
Fixez l'aiguille la plus courte sur la seringue. Important! Assurez-vous que l'aiguille munie de son capuchon est bien fixée en appuyant légèrement dessus tout en la tournant dans le sens des aiguilles d'une	Choisissez un site différent de celui que vous avez utilisé pour votre dernière injection. Nettoyez le site d'injection à l'aide d'une compresse d'alcool neuve. Commencez par le centre, puis appuyez et nettoyez en effectuant des cercles de l'intérieur	Remarque: en l'absence de dispositif de sécurité sur l'aiguille d'injection, passez directement à l'étape 3H. Tenez fermement la seringue d'une main et rabattez le dispositif de	Retirez prudemment le capuchon en plastique de l'aiguille d'injection. Ne touchez pas l'aiguille et ne la laissez pas entrer en contact avec une autre surface.



montre.	vers l'extérieur.	sécurité vers la seringue.	
Remarque: l'aiguille la plus courte peut être munie ou non d'un dispositif de sécurité latéral.	Important! Laissez le site d'injection sécher à l'air libre.	Ne retirez pas le dispositif de sécurité de l'aiguille d'injection.	
			
3I	3J	3K	3L
Préparer le site d'injection	Injecter Hepcludex	Après l'injection, replacer le dispositif de sécurité sur l'aiguille (le cas échéant)	Jeter l'aiguille de façon appropriée



Pincez un pli de peau nettoyée autour du site d'injection et maintenez-le.	Enfoncez l'aiguille dans la peau selon un angle de 45 degrés. L'aiguille doit être presque entièrement insérée. Poussez doucement le piston jusqu'au bout afin d'injecter Hepcludex. Retirez l'aiguille de la peau.	Remarque: en l'absence de dispositif de sécurité sur l'aiguille d'injection, passez directement à l'étape 3L. Placez le dispositif de sécurité de l'aiguille d'injection sur la surface de travail. Appuyez l'aiguille contre le dispositif de sécurité pour recouvrir l'aiguille et verrouillez le dispositif de sécurité. Ne touchez pas l'aiguille.	Retirez l'aiguille de la seringue, puis jetez-la (éliminez-la) dans le récipient pour objets tranchants ou pointus afin que personne ne puisse se blesser. Éliminez la seringue (sans l'aiguille) séparément et conformément aux directives locales.
---	--	---	--

Important! Ne réutilisez pas, à des fins d'injection, le flacon, la seringue, les aiguilles ou l'eau stérile restante. Éliminez le flacon après usage, y compris le liquide en excès éventuellement restant.

Les flacons d'Hepcludex et les composants sont à usage unique. Tous les composants doivent être éliminés après utilisation, y compris l'eau stérile pour préparations injectables non utilisée.

