

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Claritine®

Bayer (Schweiz) AG

Che cos'è Claritine e quando si usa?

Claritine è un preparato per il trattamento delle malattie allergiche. Esercita un effetto bloccante di lunga durata nei confronti dell'istamina, che viene rilasciata nell'organismo in caso di reazioni allergiche. Grazie alla sua lunga durata d'azione, è possibile una singola somministrazione al giorno. Alla posologia abituale, Claritine non compromette generalmente la capacità di prestazione né la capacità di concentrazione e inoltre non induce generalmente sonnolenza.

Claritine si usa negli adulti e negli adolescenti a partire dai 12 anni di età per il trattamento preventivo e sintomatico del raffreddore da fieno, in caso di rinite allergica cronica, congiuntivite allergica e orticaria cronica.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Questo medicamento contiene 89,3 mg di carboidrati digeribili per singola dose.

Quando non si può assumere Claritine?

In caso di ipersensibilità nota al principio attivo di Claritine o a uno dei componenti.

I bambini di età inferiore ai 12 anni non devono assumere Claritine compresse a causa della mancanza di esperienza clinica.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Claritine?

L'assunzione di dosi elevate può causare sedazione (stanchezza, sonnolenza).

Alla guida di veicoli a motore o durante l'utilizzo di macchine non si deve superare la posologia raccomandata.

Claritine non potenzia l'effetto depressivo dell'alcol o del diazepam.

Se soffre di un disturbo funzionale del fegato, il medico normalmente ridurrà la dose, ovvero lei assumerà Claritine solo a giorni alterni.

Consulti il suo medico prima di assumere Claritine se soffre di un'intolleranza agli zuccheri.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui soffre di altre malattie, soffre di allergie o assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente.

Si può assumere Claritine durante la gravidanza o l'allattamento?

Se è incinta o sta allattando, l'assunzione di Claritine è sconsigliata. Consulti il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere prima di assumere qualsiasi medicamento durante la gravidanza o l'allattamento.

Come usare Claritine?

Adolescenti a partire dai 12 anni e adulti

1 compressa di Claritine 1 volta al giorno.

Bambini di età inferiore a 12 anni

L'uso e la sicurezza di Claritine nei bambini di età inferiore a 12 anni non sono stati stabiliti.



Corretta modalità di assunzione

L'assunzione può avvenire indipendentemente dal momento della giornata. Al fine di ottenere un effetto il più rapido possibile, dovrebbe assumere Claritine a digiuno. Se preferisce assumere Claritine durante un pasto, l'effetto può essere leggermente ritardato.

Le compresse di Claritine si assumono con un po' di liquido, senza masticarle.

La compressa non deve essere divisa lungo la scanalatura decorativa.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Claritine?

Con l'assunzione di Claritine possono verificarsi i seguenti effetti collaterali:

Molto comune (riguarda più di 1 persona su 10):

Mal di testa.

Comune (riguarda da 1 a 10 persone su 100):

Capogiro, stordimento, nausea, tosse, sangue dal naso, raffreddore, infezioni delle vie aeree superiori, diarrea, bocca secca, disturbi della digestione, aumento dell'appetito, infiammazione della gola, stanchezza.

Non comune (riguarda da 1 a 10 persone su 1000):

Stati di agitazione, stati d'ansia, confusione, depressione, emicrania, nervosismo, attacchi di sudorazione, sete, vomito, formicolio, congiuntiviti, dolore agli occhi, mal d'orecchio, tinnito, dolori al petto, pressione sanguigna alta, irregolarità del ritmo cardiaco, bronchite, asma, secchezza/congestione nasale, respiro corto, infiammazioni dei seni paranasali, starnuti, disturbi della formazione della voce, alterazioni del gusto, flatulenza, gastrite, stitichezza, mal di denti, prurito, eruzioni cutanee, sensazione di calore, orticaria, dolori articolari, sensazione di debolezza generale, mal di schiena, minzioni più frequenti o più rare, mestruazioni dolorose, febbre, malessere.

Raro (riguarda da 1 a 10 persone su 10 000):

reazioni allergiche, peggioramento dell'allergia, perdita della memoria, inappetenza, disturbi della concentrazione, irrequietezza, disturbi del tatto, tremori, vista offuscata, alterazione del flusso lacrimale, tosse con sangue, pressione sanguigna bassa, gonfiori, temporanea perdita di coscienza, palpitazioni, laringite, infiammazioni della mucosa orale, sanguinamento nella pelle, secchezza dei capelli, cute secca, sensibilità alla luce, crampi alle gambe, gonfiori delle estremità, gonfiori del viso e intorno agli occhi, gonfiore delle labbra, della lingua e della laringe, impotenza, perdita della libido, mestruazioni abbondanti, vampate.

Molto raro (riguarda meno di 1 persona su 10 000):

Perdita di peso, allucinazioni, convulsione, spasmo della palpebra, alterazione del flusso salivare, disturbi della funzione epatica (epatite), necrosi epatiche, itterizia, perdita dei capelli, arrossamento della pelle, dolori muscolari, colorazione delle urine, vaginite, ingrossamento delle mammelle nell'uomo (ginecomastia), brividi.

Se osserva urine scure, feci chiare ed eventualmente una colorazione giallastra della pelle, deve interrompere immediatamente l'assunzione di Claritine e consultare un medico.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.



Istruzioni di conservazione

Conservare a temperatura ambiente (15–25 °C). Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni:

Se occorre eseguire un test delle allergie, la terapia con Claritine deve essere sospesa 48 ore prima dell'esecuzione del test, poiché la somministrazione di antistaminici può evitare o attenuare reazioni positive.

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darne ulteriori informazioni.

Cosa contiene Claritine?

1 compressa contiene:

Principi attivi

loratadina 10 mg

Sostanze ausiliarie

Lattosio, amido di mais e magnesio stearato.

Numero dell'omologazione

48243 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Claritine? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria senza prescrizione medica:

confezioni da 14, 30 e 42 compresse con scanalatura decorativa.

Titolare dell'omologazione

Bayer (Schweiz) AG, Zurigo.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel settembre 2022 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

