

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di assumere o fare uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Magnesiocard® 2.5 Compresse rivestite con film

Biomed AG

Che cos'è Magnesiocard 2.5 Compresse rivestite con film e quando si usa?

Su prescrizione medica.

Magnesiocard contiene come principio attivo magnesio aspartato cloridrato triidrato ed è prescritto per il trattamento della carenza di magnesio, che può verificarsi, ad esempio, in casi di malnutrizione, terapia con agenti disidratanti o altri farmaci (ved. «Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Magnesiocard 2.5 Compresse rivestite con film?»), diarrea, abuso di alcol ecc. Inoltre, Magnesiocard è utilizzato per coprire un elevato fabbisogno nello sport agonistico e durante la gravidanza, soprattutto per prevenire l'aborto precoce, così come nel trattamento del travaglio prematuro, dell'ipertensione indotta dalla gravidanza o dell'ipertensione gravidica; inoltre per alcune aritmie cardiache e per l'ipereccitabilità neuromuscolare; Magnesiocard può essere utilizzato in caso di crampi notturni ai polpacci.

Magnesiocard è disponibile in diversi dosaggi e sotto forma di compresse rivestite con film, granulato per la preparazione di una soluzione da bere e come compresse effervescenti.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Questo medicamento contiene 0.1 g di carboidrati digeribili per singola dose. Il medicamento è comunque adatto per i diabetici.

Quando non si può assumere Magnesiocard 2.5 Compresse rivestite con film?

Non utilizzare Magnesiocard in caso di grave disfunzione renale e di disidratazione corporea. In questi casi il suo medico dovrà sorvegliare il tasso serico del magnesio.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Magnesiocard 2.5 Compresse rivestite con film?

È richiesta cautela in caso di funzionalità renale lievemente a moderatamente ridotta. Determinati antibiotici (tetracicline) devono essere assunti 2-3 ore prima o dopo Magnesiocard per evitare che l'interferenza reciproca pregiudichi l'assorbimento nel sangue.

Determinati medicinali accelerano l'escrezione o inibiscono l'assorbimento del magnesio e possono causare quindi una carenza di magnesio. Pertanto potrebbe essere necessaria una dose di magnesio aggiuntiva se Magnesiocard viene assunto in associazione ai seguenti medicinali:

- medicinali diuretici
- gastroprotettori (come omeprazolo e pantoprazolo),
- determinati medicinali antitumorali (come derivati del platino, cetuximab ed erlotinib)
- determinati medicinali contro le infezioni batteriche e micotiche (come amfotericina B e pentamidina) e antivirali (foscarnet),
- medicinali immunosoppressori (come ciclosporina, sirolimus)

Informi il suo medico o il suo farmacista, nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa).



Si può assumere Magnesiocard 2.5 Compresse rivestite con film durante la gravidanza o l'allattamento?

Sì.

Come usare Magnesiocard 2.5 Compresse rivestite con film?

Se il medico non ha prescritto diversamente, la posologia usuale di Magnesiocard 2.5 Compresse rivestite con film è la seguente:

Adulti e adolescenti a partire da 15 anni: 2 compresse rivestite con film 3 volte al giorno.

Bambini da 10 a 14 anni: 2 compresse rivestite con film 2 volte al giorno.

Bambini da 4 a 9 anni: 2 compresse rivestite con film 1-2 volte al giorno.

Magnesiocard deve essere assunto con un po' di liquido prima dei pasti per favorire l'assorbimento del magnesio nella circolazione sanguigna nel tratto gastrointestinale.

Magnesiocard può essere assunto contemporaneamente ai preparati a base di ferro.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Magnesiocard 2.5 Compresse rivestite con film?

L'assunzione di Magnesiocard può causare gli effetti collaterali seguenti:

Non comune (riguarda da 1 a 10 persone su 1000): la comparsa di diarrea e feci molli non deve destare preoccupazione.

Può essere dovuta a una terapia a base di magnesio ad alto dosaggio. In caso di diarrea fastidiosa, ridurre la dose giornaliera.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico o farmacista soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore. Se dovesse essere in possesso di Magnesiocard 2.5 Compresse rivestite con film scadute, le riporti nella sua farmacia perché vengano distrutte.

Istruzioni di conservazione

Non conservare a temperature superiori a 30 °C e fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Magnesiocard 2.5 Compresse rivestite con film?

1 compressa rivestita con film contiene:

Principi attivi

615 mg di magnesio aspartato cloridrato triidrato, corrispondenti a 2.5 mmol di magnesio o 60.8 mg di magnesio.

Sostanze ausiliarie

Amido di patate, silice altamente dispersibile, stearato di magnesio, copolimero di acido metacrilico e di acrilato di etile (1:1), talco, dimeticone, citrato di trietile.



Numero dell'omologazione

45'730 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Magnesiocard 2.5 Compresse rivestite con film? Quali confezioni sono disponibili?

Magnesiocard 2.5 Compresse rivestite con film si trova in farmacia, soltanto su presentazione di prescrizione medica.

Magnesiocard 2.5 Compresse rivestite con film: confezione da 100.

Titolare dell'omologazione

Biomed AG, CH-8600 Dübendorf.

Fabbricante

Verla-Pharm Arzneimittel GmbH & Co. KG, DE-82327 Tutzing.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'agosto 2022 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

