

GENCYDO® 1%, Spray nasal

Médicament anthroposophique

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, pharmacien ou droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Quand Gencydo 1% est-il utilisé?

Selon la connaissance anthroposophique de l'être humain et de la nature, Gencydo 1% peut être utilisé en cas de rhume d'origine allergique tel p.ex. le rhume des foins.

Gencydo 1% est un médicament pour une application locale, qui exerce un effet constricteur sur les muqueuses nasales. L'écoulement diminue et les muqueuses sont décongestionnées. Gencydo 1% est bien toléré et ne compromet pas la fonction de l'épithélium vibratile.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'application indiqué est basée sur les principes de la connaissance anthroposophique de l'être humain et de la nature.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Veuillez contacter votre médecin en cas d'aggravation des symptômes ou si une amélioration n'est pas visible. Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou pharmacien si Gencydo 1% peut être appliqué simultanément.

Quand Gencydo 1% ne doit-il pas être utilisé ou seulement avec précaution?

Gencydo 1% ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité connue aux agrumes. Chez les enfants de moins de 6 ans, utiliser uniquement sur ordonnance médicale.

Veuillez informer votre médecin, pharmacien ou droguiste, si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique ou
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication!).

Gencydo 1% peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin, pharmacien ou droguiste.

Comment utiliser Gencydo 1%?



Sauf prescription contraire du médecin, pulvérisez Gencydo 1% dans chaque narine jusqu'à ce que les symptômes s'atténuent.

Posologie:

Adultes et adolescents à partir de 12 ans: 3–5 fois par jour 1–2 pulvérisations dans chaque narine.

Enfants à partir de 6 ans: 3–4 fois par jour 1 pulvérisation dans chaque narine.

Chez les enfants de moins de 6 ans, utiliser uniquement sur ordonnance médicale.

Mode d'emploi:




Figure 1 Figure 2

1. Retirez le capuchon protecteur.
2. Tenez le spray nasal verticalement et appuyez plusieurs fois sur la pointe du gicleur jusqu'à l'obtention d'une pulvérisation (lors du premier emploi) [voir figure 1].
3. Placez la pointe du gicleur verticalement dans une narine et pulvérisez en appuyant une fois sur la pointe du gicleur. Il est recommandé d'inspirer en même temps par le nez et de se boucher l'autre narine [voir figure 2].
4. Nettoyez la pointe du gicleur après chaque utilisation et remettez immédiatement le capuchon protecteur.

N'enlevez pas le gicleur du flacon. Si la fonction de pulvérisation est momentanément interrompue (p.ex. si le spray nasal n'est pas en position verticale), attendez 1–2 minutes afin d'équilibrer la pression et actionnez plusieurs fois le gicleur en position verticale jusqu'à ce qu'une nouvelle pulvérisation soit obtenue.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. En l'absence de l'amélioration escomptée lors d'un traitement chez l'enfant, veuillez consulter un médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, pharmacien ou droguiste.

Quels effets secondaires Gencydo 1% peut-il provoquer?

Dans quelques rares cas, brûlures de la muqueuse nasale (réaction d'hypersensibilité) ont été constatées. Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, pharmacien ou droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité: Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Délai d'utilisation après ouverture: Ne pas utiliser le produit pendant plus de 12 mois.

Remarques concernant le stockage: Conserver hors de portée des enfants et à température ambiante (15–25°C).

Remarques complémentaires: Un système spécial de valve et de filtre prévient toute contamination microbienne du contenu du flacon par l'écoulement nasal ou l'air aspiré. Pour des raisons techniques, le



flacon ne peut être vidé complètement. Lors du remplissage, on a cependant tenu compte du volume résiduel.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, pharmacien ou droguiste.

Que contient Gencydo 1%?

1ml de liquide contient:

Principes actifs: 8-12mg jus de citron frais (Citrus limon (L.) Burm. f., fructus) (corresp. à 0,65mg acides de fruits, calculés en acide citrique) / 30mg extrait aqueux de fruits de coings frais (Cydonia oblonga, fructus), fruits : agent d'extraction 1:2.1, agent d'extraction: eau purifiée.

Excipients: eau pour préparations injectables, chlorure de sodium.

1ml correspond à env. 7 pulvérisations.

Numéro d'autorisation

55300 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Gencydo 1%? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Flacons en verre munis d'une pointe de gicleur à 20 ml.

Titulaire de l'autorisation

Weleda SA, Arlesheim, Suisse

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en janvier 2025 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

26016900 / 4

