

## **Informazione destinata ai pazienti**

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di fare uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

## **Vitamin A «Blache», unguento oftalmico**

**Bausch & Lomb Swiss AG**

### ***Che cos'è Vitamin A «Blache», unguento oftalmico e quando si usa?***

Su prescrizione medica.

Per il trattamento di determinate lesioni e malattie della congiuntiva o della cornea. La Vitamina A ne promuove la guarigione.

### ***Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?***

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico per il trattamento dei suoi disturbi oculari correnti. Non lo usi per il trattamento di altre malattie o di altre persone.

**Indicazione per i portatori di lenti a contatto:** le lenti a contatto possono influire sul processo di guarigione. Per questo motivo, durante e dopo il trattamento, si possono portare le lenti a contatto solamente con l'esplicito consenso dell'oculista. In tal caso devono essere accuratamente pulite.

### ***Quando non si può usare Vitamin A «Blache», unguento oftalmico?***

In caso d'ipersensibilità (allergia) nota o presunta ad uno qualsiasi dei componenti di questo unguento oftalmico come pure in caso di sovradosaggio di vitamina A.

### ***Quando è richiesta prudenza nell'uso di Vitamin A «Blache», unguento oftalmico?***

Poiché subito dopo l'applicazione di unguenti oftalmici la vista può annebbiarsi, non si deve guidare veicoli o utilizzare macchine per almeno 20 minuti!

Informi il suo medico o il suo farmacista, nel caso in cui soffra di altre malattie, soffra di allergie o assuma altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa) o li applichi sull'occhio.

Questo medicamento contiene grasso di lana. Il grasso di lana può causare reazioni cutanee locali (ad es. dermatite da contatto).

### ***Si può usare Vitamin A «Blache», unguento oftalmico durante la gravidanza o l'allattamento?***

Durante la gravidanza e l'allattamento il preparato Vitamin A «Blache» non deve essere usato.

### ***Come usare Vitamin A «Blache», unguento oftalmico?***

**Adulti:**

Generalmente si applica una striscia di unguento di 3-5 mm di lunghezza, da 2 a 4 volte al giorno, nel sacco congiuntivale dell'occhio interessato. Vitamin A «Blache» può essere utilizzato anche sotto un bendaggio oculare. Richiudere bene il tubo subito dopo l'uso.

L'uso e la sicurezza di Vitamin A «Blache» nei bambini e negli adolescenti finora non sono stati esaminati.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

### ***Quali effetti collaterali può avere Vitamin A «Blache», unguento oftalmico?***

Con l'applicazione di Vitamin A «Blache», unguento oftalmico possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali: subito dopo l'uso può comparire un disturbo della vista (visione annebbiata) di breve durata. I principi attivi contenuti in preparati oftalmici possono raggiungere la circolazione sanguigna. Pertanto sono possibili effetti collaterali anche nel resto del corpo come ad es. irritabilità, sonnolenza, capogiri e vomito.



Se osserva effetti collaterali si rivolga al suo medico o al suo farmacista, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

### ***Di che altro occorre tener conto?***

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore. Una volta concluso il trattamento, riportare il medicamento al punto di consegna (medico o farmacista) per il corretto smaltimento.

#### ***Termine di consumo dopo l'apertura***

Dopo l'apertura del tubo, non utilizzare per più di 30 giorni.

#### ***Indicazione di stoccaggio***

Conservare nella confezione originale chiusa, in frigorifero (2-8 °C). Dopo l'apertura del tubo conservare a temperatura ambiente (15-25 °C). Tenere fuori dalla portata dei bambini.

#### ***Ulteriori indicazioni***

Per preservare la sterilità dell'unguento oftalmico, non toccare l'estremità del tubo né con le mani né con l'occhio. Chiudere bene il tubo subito dopo l'uso.

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

### ***Che cosa contiene Vitamin A «Blache», unguento oftalmico?***

1 g di unguento oftalmico contiene

#### ***Principi attivi***

Vitamina A (retinolo palmitato) 15'000 U.I.

#### ***Sostanze ausiliarie***

D,L-alfa-tocoferolo acetato (E 307), grasso di lana, vaselina bianca, paraffina liquida.

### ***Numero dell'omologazione***

22398 (Swissmedic)

### ***Dove è ottenibile Vitamin A «Blache», unguento oftalmico? Quali confezioni sono disponibili?***

In farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica.

Vitamin A «Blache», unguento oftalmico è disponibile in tubi da 5 g.

### ***Titolare dell'omologazione***

Bausch & Lomb Swiss SA, 6301 Zug.

**Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel febbraio 2023 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).**

