

Qu'est-ce que MALVEOL et quand doit-il être utilisé?

Malveol contient de la mauve qui grâce à ses substances mucilagineuses exerce une action adoucissante sur les lésions et favorise la décongestion des tissus enflammés. Malveol est une émulsion émolliente (adouçissante) et antiseptique (désinfectante), pour le traitement local des maladies de la gorge et de la muqueuse buccale.

Traitement local d'affections aiguës dans la région de la bouche et de la gorge, comme pharyngites, stomatites (inflammations de la muqueuse buccale), gingivites (inflammations des gencives) et aphtes. Comme adjuvant en cas d'angines

Quand MALVEOL ne doit-il pas être utilisé?

Si vous êtes allergique à l'une des substances contenues dans le Malveol évitez l'utilisation de ce médicament.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de MALVEOL?

Malveol ne doit être utilisé que par des patients qui maîtrisent la technique du gargarisme.

Les enfants et les adolescents présentant de la fièvre et souffrant de grippe, de varicelle ou d'autres affections virales ne doivent prendre Malveol que sur prescription médicale et en traitement de deuxième intention. Si au cours de ces maladies ou après leur rémission, des troubles de la connaissance apparaissent, suivis de forts vomissements, il convient de consulter immédiatement un médecin.

Ce médicament contient un parfum contenant du d-limonène. Le d-limonène peut provoquer des réactions allergiques.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si:

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique,
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication !) en usage interne ou externe.

MALVEOL peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Malveol ne doit être utilisé que sur le conseil du médecin pendant la grossesse et l'allaitement

Comment utiliser MALVEOL?

Adultes:

Bien agiter le flacon puis mettre une cuillerée à café de Malveol dans ½ verre d'eau tiède et se gargariser.

Après une opération: se rincer la gorge et la bouche avant et après chaque repas (½ cuillerée à café de Malveol pour ½ verre d'eau).

Pour badigeonnages locaux: utiliser Malveol non dilué, selon avis du médecin.

Pour bains de bouche: ½ cuillerée à café de Malveol dans ½ verre d'eau tiède.

L'utilisation et la sécurité de Malveol chez les enfants et les adolescents n'ont pas, à ce jour, été étudiées.



Malveol ne peut être utilisé chez les enfants et les adolescents présentant de la fièvre liée à une infection virale que sur prescription médicale et en traitement de deuxième intention (cf. «Quelles sont les précautions à observer lors de la prise de Malveol» ?)

La solution peut être avalée par erreur, l'utilisation en bain de bouche ou gargarisme n'est pas conseillée chez les enfants de moins de 6 ans.

Veuillez-vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez-vous adresser à votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Quels effets secondaires MALVEOL peut-il provoquer?

Très rare (concerne moins d'un utilisateur sur 10 000):

Syndrome de Reye

Fréquence inconnue (ne peut être estimée sur la base des données disponibles):

Réactions locales d'hypersensibilité

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15 - 25°C).

Conserver hors de portée des enfants.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels

Que contient MALVEOL?

1 g d'émulsion buccale contient:

Principes actifs

Acide salicylique 4 mg, Mucilage de feuille de mauve 335 mg, Mucilage de feuille de guimauve 335 mg, Huile essentielle de menthe poivrée 4.5 mg

Une cuillerée à café (correspondant à 5 ml d'émulsion buccale) contient Acidum salicylicum 21.13 mg, Malvae folii mucilago 1,77 g, Althaeae folii mucilago 1.77 g, Menthae piperitae aetheroleum 23.77 mg

Excipients

Gomme arabique, Paraffine liquide, Saccharose, Hydrogencitrate de diammonium, Huile essentielle de romarin, Huile essentielle de sauge, Saccharine sodique, Vanilline, Eau purifiée

Numéro d'autorisation

11275 (Swissmedic)

Où obtenez-vous MALVEOL? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.



Flacons de 100 ml d'émulsion.

Titulaire de l'autorisation

Plavidente GmbH, Wangenried

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en juin 2023 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

