

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant de prendre ou d'utiliser ce médicament.

Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Clopidogrel Sandoz® eco 75 mg

Sandoz Pharmaceuticals AG

Qu'est-ce que Clopidogrel Sandoz eco 75 mg et quand doit-il être utilisé?

Selon prescription du médecin.

Le clopidogrel, principe actif des comprimés pelliculés de Clopidogrel Sandoz eco 75 mg, appartient à une classe de substances appelées antiagrégants plaquettaires. Les plaquettes sanguines (thrombocytes) sont de très petits éléments circulant dans le sang, de taille inférieure à celle des globules rouges et blancs, et qui s'agrègent lors de la formation d'un thrombus (caillot de sang). En empêchant cette aggrégation, les antiagrégants plaquettaires réduisent le risque d'une thrombose (formation de caillots de sang).

Ayant récemment subi une attaque cérébrale ou une crise cardiaque ou souffrant d'un rétrécissement du calibre des artères, vous avez un risque élevé de réapparition de ces événements.

Afin de réduire ce risque, votre médecin vous a prescrit Clopidogrel Sandoz eco 75 mg.

Clopidogrel Sandoz eco 75 mg a pu également vous être prescrit si

- vous souffrez d'artériopathie des membres inférieurs, ou
- vous avez eu une douleur thoracique grave connue sous le nom «d'angor instable» ou «infarctus du myocarde» (crise cardiaque). Dans ce cas votre médecin peut également vous prescrire de l'acide acétylsalicylique (une substance présente dans de nombreux médicaments, utilisée pour soulager la douleur et faire baisser la fièvre) ou
- vous souffrez d'une fréquence cardiaque irrégulière, maladie nommée fibrillation auriculaire et vous ne pouvez pas être traité par les médicaments appelés «anticoagulants oraux». Dans ce cas, votre médecin vous prescrit également de l'acide acétylsalicylique.

Clopidogrel Sandoz eco 75 mg est également utilisé pour la prévention des thromboses après la pose d'endoprothèse vasculaire (stent), en association avec l'acide acétylsalicylique.

Clopidogrel Sandoz eco 75 mg ne doit être pris que sur prescription du médecin et ne doit pas être donné à une autre personne.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Les maladies artérielles ayant pour origine certains facteurs (tels que l'hypertension artérielle, un taux élevé de cholestérol, le tabagisme, le diabète), il est important pour vous d'adapter votre mode de vie, afin de diminuer ces facteurs de risque.

Demandez conseil à votre médecin.

Quand Clopidogrel Sandoz eco 75 mg ne doit-il pas être pris?

Clopidogrel Sandoz eco 75 mg ne doit pas être utilisé si vous

- présentez une hypersensibilité (allergie) à l'encontre de ce médicament ou des antécédents d'hypersensibilité à la substance ticlopidine ou à la substance prasugrel;
- avez des troubles de la coagulation du sang favorisant les hémorragies internes (par ex. saignements au sein d'un tissu, d'un organe ou d'une articulation);
-



souffrez d'une maladie qui vous prédispose à un risque élevé d'hémorragies internes (par ex. un ulcère de l'estomac ou de l'intestin);

- présentez une tendance aux saignements;
- souffrez d'une insuffisance hépatique sévère.

L'emploi sûr et l'efficacité du médicament n'ont pas été démontrés chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans.

Si vous pensez être concerné/ée par l'une de ces maladies ou en cas de doute, veuillez consulter votre médecin avant de prendre les comprimés pelliculés Clopidogrel Sandoz eco 75 mg.

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise de Clopidogrel Sandoz eco 75 mg?

Avant de prendre Clopidogrel Sandoz eco 75 mg, veuillez informer votre médecin si vous

- avez eu récemment une blessure grave;
- avez récemment subi une intervention chirurgicale (y compris dentaire);
- présentez des troubles de la coagulation favorisant les hémorragies internes (saignement au sein d'un tissu, d'un organe ou d'une articulation);
- êtes atteints d'une maladie qui peut provoquer un saignement (telle qu'un ulcère gastrique);
- allez subir une intervention chirurgicale (y compris dentaire) dans les 15 jours à venir;
- souffrez de troubles des reins ou du foie;
- avez subi récemment un accident vasculaire cérébral;
- avez subi récemment un infarctus du myocarde (Clopidogrel Sandoz eco 75 mg ne doit pas être utilisé après traitement par la streptokinase);
- avez de l'hypertension mal contrôlée ou non traitée;
- souffrez d'hémophilie acquise (troubles de la coagulation sanguine);
- si vous avez des antécédents d'allergie ou de réactions allergiques à tout médicament utilisé pour traiter votre maladie.

Clopidogrel Sandoz eco 75 mg influence le pouvoir de coagulation du sang. Si vous vous coupez ou vous blessez, l'arrêt du saignement pourrait demander un peu plus de temps que d'habitude.

Des coupures ou blessures mineures (par ex. au cours du rasage), sont généralement sans importance. Toutefois, en cas de doute ou de saignement anormal, veuillez immédiatement informer votre médecin.

Après la pose d'endoprothèse vasculaire (stent) ou chez les malades qui ont eu une douleur thoracique grave (angor instable ou crise cardiaque), Clopidogrel Sandoz eco 75 mg peut être prescrit en association avec de l'acide acétylsalicylique (75–325 mg par jour), une substance présente dans de nombreux médicaments utilisés pour soulager la douleur et faire baisser la fièvre. Dans ces cas, une dose journalière fixe de 100 mg d'acide acétylsalicylique est habituellement recommandée pour une association à long terme avec Clopidogrel Sandoz eco 75 mg. Dans d'autres circonstances, l'utilisation de l'acide acétylsalicylique sur des périodes prolongées nécessite d'être discutée avec votre médecin. Une utilisation occasionnelle d'acide acétylsalicylique (pas plus de 1000 mg sur une période de 24 heures) ne doit pas poser de problème.

Certains médicaments, qu'ils aient été prescrits par votre médecin ou qu'il s'agisse de produits en vente libre, peuvent modifier l'efficacité de ce médicament ou inversement ce médicament peut modifier l'efficacité d'autres médicaments et provoquer des effets indésirables. C'est pourquoi, pendant le traitement par Clopidogrel Sandoz eco 75 mg, demandez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant de prendre tout autre médicament.

La prise des médicaments suivants n'est pas recommandée lors du traitement par Clopidogrel Sandoz eco 75 mg:

- Inhibiteur de la pompe à protons (par ex. oméprazole) pour le traitement des maux d'estomac.



- Médicaments pouvant augmenter votre risque de saignement:
 - Produits qui inhibent la coagulation du sang comme la phenprocoumone (Marcoumar), l'acénocoumarol (Sintrom), l'héparine ou la warfarine.
 - Produits anti-inflammatoires non stéroïdiens type Aspirine/acide acétylsalicylique (médicaments pour le traitement des états douloureux et/ou inflammatoires des muscles et des articulations) qui ne doivent être administrés que sur autorisation et contrôle de votre médecin si vous prenez Clopidogrel Sandoz eco 75 mg.
 - Combinaison avec d'autres traitements antiagrégants plaquettaires utilisés dans la prévention des maladies thrombotiques cérébrovasculaires (trithérapie clopidogrel/aspirine/dipyridamole).
 - Rifampicine, un antibiotique utilisé pour traiter des infections graves (certaines bactéries, la tuberculose, la lèpre).
- Antidépresseurs (fluvoxamine, fluoxétine, moclobémide, ISRS).
- Antimycosiques (voriconazole, fluconazole).
- Antibiotiques (ciprofloxacine).
- Antiépileptiques (carbamazépine).
- Antidiabétiques (répaglinide).
- Anticancéreux (paclitaxel).
- Traitements contre l'hépatite C (dasabuvir).
- Des opioïdes, si vous êtes traité(e) par du clopidogrel, informez votre médecin avant qu'un opioïde ne vous soit prescrit (utilisé pour traiter la douleur intense).
- Statines (rosuvastatine).

Ce médicament contient de l'huile de ricin hydrogénée susceptible de causer des troubles gastriques ou une diarrhée.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique ou
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication!).

Clopidogrel Sandoz eco 75 mg peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Si vous êtes enceinte ou allaitez, il est nécessaire d'en informer votre médecin, car c'est lui qui décidera si vous devez prendre Clopidogrel Sandoz eco 75 mg pendant la grossesse ou l'allaitement.

Dans le cas d'une grossesse survenant pendant le traitement par Clopidogrel Sandoz eco 75 mg, il vous faudrait consulter immédiatement votre médecin.

Pendant le traitement par Clopidogrel Sandoz eco 75 mg il ne faut pas allaiter.

Comment utiliser Clopidogrel Sandoz eco 75 mg?

Avalez le comprimé pelliculé, sans le sucer ou le croquer, avec un peu d'eau. Le comprimé pelliculé peut être pris lors ou indépendamment du repas, mais on recommande de le prendre toujours à la même heure.

Adultes

Prévention des accidents vasculaires ischémiques (attaque cérébrale, crise cardiaque):

Sauf prescription contraire du médecin, prenez 1 comprimé pelliculé de Clopidogrel Sandoz eco 75 mg par jour. Douleurs thoraciques graves (angor instable ou crise cardiaque): votre médecin peut vous prescrire une dose de charge de 300 mg (4 comprimés pelliculés Clopidogrel Sandoz eco 75 mg) en début de traitement suivi au long cours par une prise quotidienne de 1 comprimé pelliculé de Clopidogrel Sandoz



eco 75 mg (en association avec l'acide acétylsalicylique à la dose quotidienne de 75–325 mg).

Prévention des thromboses après la pose d'endoprothèse vasculaire (stent):

1 comprimé pelliculé de Clopidogrel Sandoz eco 75 mg, 1 fois par jour en association avec de l'acide acétylsalicylique (325 mg par jour ont été utilisés lors des essais cliniques). En cas de pose d'un tuteur (stent), on peut éventuellement commencer le traitement en prescrivant une dose de charge le premier jour de 300 mg (4 comprimés pelliculés Clopidogrel Sandoz eco 75 mg).

Chez les patients souffrant de fibrillation auriculaire: 1 comprimé pelliculé de Clopidogrel Sandoz eco 75 mg, 1 fois par jour en association à l'acide acétylsalicylique à la dose quotidienne de 100 mg.

Enfants et adolescents

L'emploi sûr et l'efficacité du médicament n'ont pas été démontrés chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans.

Insuffisants rénaux et hépatiques

Clopidogrel Sandoz eco 75 mg sera utilisé avec prudence chez ce type de malade.

Personnes âgées

Un ajustement de la dose n'est pas nécessaire chez le sujet âgé.

Durée du traitement

Clopidogrel Sandoz eco 75 mg constitue un traitement à long terme. Donc, il vous faut prendre ce médicament aussi longtemps que votre médecin vous le prescrit.

En cas de surdosage (dosage excessif du médicament), veuillez immédiatement consulter votre médecin ou le service des urgences de l'hôpital le plus proche. La prise d'un nombre excessif de comprimés pelliculés pourrait provoquer une hémorragie sévère nécessitant un traitement urgent.

Si vous avez oublié de prendre votre comprimé pelliculé Clopidogrel Sandoz eco 75 mg et si vous vous en apercevez dans les 12 heures suivant l'horaire prévu de la prise, prenez ce comprimé pelliculé immédiatement puis le comprimé pelliculé suivant à l'heure habituelle.

Si vous vous apercevez du comprimé pelliculé oublié plus de 12 heures après l'horaire prévu de la prise, prenez simplement le comprimé pelliculé suivant à l'heure habituelle. Ne prenez pas 2 comprimés pelliculés afin de compenser la dose oubliée.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Clopidogrel Sandoz eco 75 mg peut-il provoquer?

La prise de Clopidogrel Sandoz eco 75 mg peut provoquer les effets secondaires suivants:

Fréquent (concerne 1 à 10 personnes sur 100)

Saignements, dyspepsies, douleurs abdominales, diarrhées, hématomes cutanés peu étendus.

Occasionnel (concerne 1 à 10 personnes sur 1000)

Ulcères et saignements de l'estomac ou de l'intestin, saignements du nez, bleus (ecchymoses), sang dans les urines, saignements oculaires, pulmonaires, musculaires, articulaires et cérébraux. Etourdissements, picotements des mains et des pieds, céphalées. Nausées, gastrites, flatulences, constipation, vomissements. Troubles hépatiques et biliaires. Démangeaisons.

Rare (concerne 1 à 10 personnes sur 10'000)

Vertiges, augmentation du volume des seins chez l'homme.

Très rare (concerne moins d'une personne sur 10'000)



Réactions allergiques généralisées (œdème du visage, des lèvres et/ou de la langue). Des accidents hématologiques sévères (neutropénie: diminution du nombre d'une fraction des globules blancs) peuvent survenir et être responsables d'infections graves, hémophilie acquise (troubles de la coagulation sanguine). Troubles ou perte du goût. Confusion, hallucinations. Inflammation des vaisseaux, hypotension. Difficultés respiratoires. Colites, inflammation du pancréas, stomatites. Hépatite. Eruptions cutanées, eczéma, exfoliation cutanée. Douleurs articulaires, douleurs musculaires. Atteinte rénale. Fièvre.

Fréquence inconnue (ne peut être estimée sur la base des données disponibles)

Certaines personnes peuvent présenter une hypersensibilité au clopidogrel qui peut se manifester par le syndrome de Kounis (troubles cardiaques).

Symptômes persistants d'hypoglycémie (taux faible de sucre dans le sang).

Vous devez arrêter le traitement par Clopidogrel Sandoz eco 75 mg et consulter immédiatement votre médecin en cas d'apparition des symptômes suivants: fièvre, inflammation de la gorge, ulcérations dans la bouche ou le pharynx, saignements importants ou prolongés, hématome, purpura, selles noires.

Si vous prenez du clopidogrel avec de l'acide acétylsalicylique (Aspirine) (substance présente dans de nombreux médicaments, utilisée pour soulager la douleur et faire baisser la fièvre), des anti-inflammatoires non stéroïdiens, de l'héparine ou tout autre médicament qui pourrait entraîner ou prolonger un saignement suite à un traumatisme, une intervention chirurgicale ou pour toute autre cause, vous devez prévenir votre médecin ou votre pharmacien de toute survenue de saignement.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur l'emballage. Si vous avez en votre possession des comprimés pelliculés dont la date de péremption est échue, veuillez les rapporter à votre pharmacien.

Remarques concernant le stockage

Conserver dans l'emballage original, pas au-dessus de 25°C et hors de la portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Clopidogrel Sandoz eco 75 mg?

1 comprimé pelliculé contient:

Principe actif

Clopidogrel 75 mg.

Excipients

Cellulose microcristalline, hydroxypropylcellulose (faiblement substituée), huile de ricin hydrogénée, hypromellose, dioxyde de titane, macrogol, oxyde de fer rouge (E172).

Numéro d'autorisation

60140 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Clopidogrel Sandoz eco 75 mg? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Clopidogrel Sandoz eco 75 mg: emballages de 28 et 84 comprimés pelliculés



Titulaire de l'autorisation

Sandoz Pharmaceuticals SA, Risch; domicile: Rotkreuz

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en septembre 2022 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

