

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

GRANUFINK® Prosta forte, gélule

Perrigo Schweiz AG

Médicament phytothérapeutique

Qu'est-ce que GRANUFINK Prosta forte et quand doit-il être utilisé?

GRANUFINK Prosta forte est traditionnellement utilisé pour soulager les troubles des voies urinaires basses chez les hommes, dus à une vessie hyperactive ou une faiblesse de la vessie ou à une hyperplasie bénigne de la prostate (p.ex. envie fréquente d'uriner, miction fréquente de jour et de nuit, vidange incomplète de la vessie et difficultés à uriner), après exclusion de toute maladie grave par un médecin.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'application indiqué se fonde exclusivement sur un usage traditionnel.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Ce médicament ne soulage que les troubles résultant d'une prostate plus volumineuse. Il ne permet pas d'inverser l'hyperplasie. En conséquence, il est recommandé de se rendre régulièrement chez le médecin.

Veuillez consulter votre médecin en cas d'apparition d'un ou plusieurs des troubles suivants durant l'utilisation du médicament:

- présence de sang dans l'urine,
- apparition de fièvre,
- douleurs lors de la miction,
- rétention urinaire.

Si vous vous sentez plus mal, veuillez vous adresser à un médecin.

Quand GRANUFINK Prosta forte ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution?

GRANUFINK Prosta forte ne doit pas être pris en cas d'allergie au principe actif ou à d'autres plantes proches des courges (p.ex. pastèque, courgette, etc.) ou à l'un des autres composants de ce médicament décrit dans le paragraphe «Que contient GRANUFINK Prosta forte?».

En cas d'aggravation des troubles ou d'apparition de symptômes tels que de la fièvre, des crampes ou du sang dans l'urine, des mictions douloureuses et de la rétention urinaire durant la prise de ce médicament, veuillez consulter un médecin.

La prise de GRANUFINK Prosta forte est déconseillée aux enfants et aux adolescents de moins de 18 ans, car les troubles des voies urinaires basses dans cette catégorie d'âge doivent faire l'objet d'un diagnostic médical. L'utilisation de GRANUFINK Prosta forte n'est pas prévue pour les femmes. Ces groupes de patients ne peuvent prendre GRANUFINK Prosta forte que sur ordonnance médicale.

À ce jour, il n'existe aucune interaction connue.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication!).



GRANUFINK Prosta forte peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

GRANUFINK Prosta forte n'est pas indiqué pour les femmes.

On ne dispose pas de données relatives à la fertilité.

Comment utiliser GRANUFINK Prosta forte?

Hommes

1 gélule 2 fois par jour avec suffisamment de liquide, de préférence avant les repas.

La prise de GRANUFINK Prosta forte est déconseillée aux patients de moins de 18 ans et aux femmes.

De manière générale, l'utilisation n'est pas limitée dans le temps, mais devrait faire l'objet d'un contrôle régulier. Veuillez toutefois tenir compte des avertissements et mesures de précaution énoncés aux paragraphes «À quoi faut-il encore faire attention?» et «Quand GRANUFINK Prosta forte ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution?».

Si vous avez pris par inadvertance plus que la dose recommandée de GRANUFINK Prosta forte, les effets secondaires répertoriés au paragraphe «Quels effets secondaires GRANUFINK Prosta forte peut-il provoquer?» peuvent se manifester de manière plus prononcée.

Ne prenez pas une double dose si vous avez oublié la dose précédente. Prenez la dose suivante au moment habituel, tel que décrit dans ces instructions.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires GRANUFINK Prosta forte peut-il provoquer?

Les effets secondaires suivants peuvent apparaître lors de la prise de GRANUFINK Prosta forte:

Fréquent (concerne 1 à 10 sur 100 personnes)

- problèmes gastro-intestinaux.

Rare (concerne 1 à 10 sur 10'000 personnes)

- réactions d'hypersensibilité (urticaire, œdème facial, choc anaphylactique).

En cas de problèmes gastro-intestinaux ou de réactions d'hypersensibilité, veuillez en informer votre médecin afin qu'il puisse déterminer le degré de gravité des symptômes et éventuellement décider du traitement à suivre.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25°C).

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient GRANUFINK Prosta forte?



GRANUFINK Prosta forte se présente sous forme de gélules de couleur cuivrée dans un emballage blister en PVC-aluminium.

1 gélule contient:

Principes actifs

500 mg d'extrait mou de graines de courge (*Cucurbita pepo* L. convar. *citrullina* L. Greb. var. *styriaca* L. Greb., semen), rapport drogue/extrait 15-25:1, agent d'extraction: éthanol 92% (m/m).

Excipients

Silice hydrophobe colloïdale; gélatine; oxyde de fer noir (E172), oxyde de fer rouge (E172), oxyde de fer jaune (E172).

Numéro d'autorisation

65135 (Swissmedic)

Où obtenez-vous GRANUFINK Prosta forte? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Conditionnements de 40, 80 et 140 gélules

Titulaire de l'autorisation

Perrigo Schweiz AG, Zürich

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en février 2023 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

