

▼ Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Vous pouvez y contribuer en signalant tout effet secondaire. Voir à la fin de la rubrique «Quels effets secondaires Sondelbay peut-il provoquer?» pour savoir comment déclarer les effets secondaires.

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant de prendre ou d'utiliser ce médicament. Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Sondelbay®

Qu'est-ce que Sondelbay et quand doit-il être utilisé?

Selon prescription du médecin.

Sondelbay appartient à une classe de médicaments qui sont des agents de la formation osseuse. Le principe actif, le téraparatide, est une hormone qui agit sur le métabolisme osseux. Il est produit par génie génétique dans des cellules bactériennes. La partie active du principe actif est identique à la parathormone naturelle.

Sondelbay est utilisé pour le traitement de l'ostéoporose. L'ostéoporose (atrophie osseuse) est une maladie dans laquelle les os deviennent plus faibles et friables. La maladie survient particulièrement fréquemment chez les femmes après la ménopause mais elle peut aussi affecter les hommes. Bien que, initialement, aucun symptôme ne doive nécessairement se manifester, si l'ostéoporose n'est pas traitée, la survenue de fractures osseuses - surtout au niveau de la colonne vertébrale, de la hanche et des poignets - est plus probable. Les conséquences peuvent en outre être des douleurs dorsales, une diminution de la taille corporelle et un dos voûté.

Sondelbay favorise la formation osseuse, fortifie les os et diminue de ce fait le risque de fractures osseuses.

Sondelbay est utilisé chez les femmes après la ménopause et les hommes atteints d'ostéoporose ou présentant un risque élevé de fractures osseuses.

L'ostéoporose survient fréquemment chez les patients qui prennent des corticostéroïdes.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Dans des recherches menées dans le cadre du développement et du contrôle du médicament, quelques animaux, traités pendant toute leur vie avec téraparatide (= principe actif de Sondelbay) ont développé un cancer de l'os (ostéosarcome). Chez l'être humain, l'ostéosarcome est un cancer grave mais très rare (environ 4/1 000 000 par année). L'importance de ces résultats pour l'être humain est inconnue; on n'a



observé d'ostéosarcome ni dans les études cliniques ni pendant la surveillance qui a suivi un traitement.

Quand Sondelbay ne doit-il pas être utilisé?

- Sondelbay ne doit pas être utilisé, si vous avez certaines maladies des os. Si vous souffrez d'une maladie des os, veuillez en informer votre médecin.
- si vous souffrez de la maladie de Paget.
- si vous avez pour une raison peu claire un taux sanguin de phosphatases alcalines élevé, qui signifie que vous pourriez avoir la maladie de Paget. Si vous avez des doutes, posez la question à votre médecin.
- si vous avez subi une radiothérapie qui impliquait aussi vos os (squelette).
- si vous avez trop de calcium dans le sang (une hypercalcémie).
- si l'on a diagnostiqué une fois chez vous un cancer des os ou d'autres types de cancer qui se sont propagés dans vos os (métastases).
- si vous souffrez d'une grave maladie rénale.
- chez les enfants ou les adolescents de moins de 18 ans.
- chez les jeunes adultes qui sont encore dans la phase de croissance.
- si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.
- si vous êtes hypersensible (allergique) au principe actif de Sondelbay (tériparatide) ou à l'un des autres composants du médicament.
- si vous avez des difficultés à vous administrer vous-même une injection et qu'il n'y a personne pour vous aider.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Sondelbay?

Sondelbay peut entraîner une augmentation de la quantité de calcium dans votre sang ou votre urine.

Veuillez parler à votre médecin ou à votre pharmacien avant d'utiliser Sondelbay ou si vous l'utilisez:

- si vous souffrez de nausées persistantes, de vomissements, de constipation, de manque d'énergie ou de faiblesse musculaire. Il peut s'agir là des signes d'un taux élevé de calcium sanguin.
- si vous avez ou avez eu dans le passé des calculs rénaux.
- si une maladie rénale est connue chez vous (il y a une limitation modérée de la fonction rénale).

La durée recommandée de traitement de 24 mois ne doit pas être dépassée.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez d'autres médicaments ou en avez pris récemment, car il pourrait y avoir des interactions.

Certains patients peuvent éprouver des vertiges après une injection de Sondelbay. Si vous éprouvez des vertiges, vous ne devez pas vous engager activement dans la circulation routière ou utiliser des machines jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux. Sondelbay ne doit pas être utilisé chez les enfants et les adolescents (de moins de 18 ans).

Sondelbay ne doit pas être utilisé chez de jeunes adultes qui sont encore en phase de croissance.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
-



vous prenez déjà d'autres médicaments+ (même en automédication !) ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe.

Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par dose, c.-à-d. qu'il est essentiellement «sans sodium».

Sondelbay peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

N'utilisez pas Sondelbay si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

Comment utiliser Sondelbay?

Utilisez toujours Sondelbay exactement selon les instructions de votre médecin. Si vous avez d'autres questions, veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien.

Pour administrer Sondelbay, vous avez besoin d'un stylo. Le stylo ne peut être utilisé que pour votre traitement personnel et ne doit jamais être utilisé pour le traitement d'autres patients. N'utilisez pas non plus le stylo d'une autre personne car des maladies pourraient éventuellement être transmises entre patients par le stylo. Votre médecin, votre pharmacien ou le personnel soignant vous expliqueront précisément comment utiliser le stylo Sondelbay. Pour votre information sur l'utilisation du stylo Sondelbay, vous devez également lire attentivement le mode d'emploi avant le début du traitement. Pour le cas où de nouvelles informations seraient disponibles veuillez lire le mode d'emploi et l'information destinée au patient à chaque fois que vous avez reçu un nouvel emballage.

La dose usuelle de Sondelbay est de 20 µg par jour. Sondelbay est injecté de façon sous-cutanée (sous la peau) dans la cuisse ou dans la peau du ventre. Sondelbay peut être utilisé à tout moment de la journée, indépendamment des repas.

La durée du traitement est de 24 mois au maximum. Le traitement de 24 mois avec Sondelbay ne doit pas être répété.

Il est recommandé de prendre du calcium et/ou des préparations de vitamine D pendant le traitement de Sondelbay. Consultez votre médecin ou votre pharmacien pour savoir combien de calcium et de vitamine D par jour vous devez prendre.

Pour que vous pensiez à utiliser Sondelbay, injectez-le de préférence chaque jour à la même heure.

Si vous avez oublié ou n'étiez pas en mesure de vous administrer Sondelbay à l'heure habituelle, utilisez-le ensuite le plus vite possible le même jour. Ne vous administrez pas plus d'une injection par jour.

Si vous vous êtes injecté par inadvertance plus de Sondelbay que prévu, veuillez contacter votre médecin ou votre pharmacien.

N'arrêtez pas d'utiliser Sondelbay sans en avertir au préalable votre médecin.

Comme cela est décrit dans le mode d'emploi, vous devez vous injecter à chaque fois Sondelbay peu de temps après avoir sorti le stylo prérempli du réfrigérateur. Remettez le stylo dans le réfrigérateur directement après l'avoir utilisé. Utilisez une nouvelle aiguille pour chaque injection. N'entrez pas le stylo avec une aiguille fixée sur le stylo car dans ce cas la solution peut s'écouler du stylo et des bulles d'air peuvent se former dans la cartouche.

Sondelbay contient une solution, limpide incolore, stérile. N'utilisez pas Sondelbay si des particules solides se sont formées ou si la solution est trouble ou colorée.



Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Sondelbay peut-il provoquer?

Très fréquent (concerne plus d'une personne sur 10)

Douleurs articulaires.

Douleurs au site d'administration.

Fréquent (concerne 1 à 10 personnes sur 100)

Augmentation du taux de cholestérol.

Dépression.

Douleurs nerveuses dans les jambes (sciatique).

Vertiges, insomnie, évanouissement, céphalées.

Sensation de vertige rotatoire.

Douleurs thoraciques.

Palpitations cardiaques.

Pression artérielle élevée ou basse.

Rhinite, toux accrue, pharyngite, dyspnée, pneumonie.

Nausées, constipation, diarrhée, troubles digestifs, vomissements, troubles gastro-intestinaux, troubles dentaires.

Éruption cutanée, transpiration.

Crampes aux jambes, crampes dorsales.

Sensation de faiblesse, douleurs cervicales, réactions légères et transitoires au site d'injection avec douleurs, gonflements, rougeurs de la peau, hématomes locaux, prurit et légères hémorragies au site d'injection.

Augmentation des taux d'acide urique.

Hémoglobine basse ou nombre réduit de globules rouges (anémie).

Occasionnel (concerne 1 à 10 personnes sur 1000)

Augmentation du taux de calcium dans le sang (> 11 mg/dl).

Tachycardie.

Souffles cardiaques modifiés.

Essoufflement.

Hémorroïdes.

Incontinence urinaire, envie d'uriner, calculs rénaux.

Prise de poids.

Douleurs musculaires, douleurs articulaires, crampes musculaires.

Augmentation d'une enzyme appelée phosphatase alcaline.

Rare (concerne de 1 à 10 personnes sur 10 000)



Diminution de la fonction rénale incluant une insuffisance rénale.

Augmentation du taux de calcium dans le sang (> 13 mg/dl).

Réactions allergiques peu après l'injection, avec des symptômes tels que difficulté à respirer, enflures au visage, éruption cutanée, douleurs thoraciques et malaise prononcé.

Ces réactions allergiques, y compris anaphylaxie, peuvent mettre la vie en danger. Si de tels effets secondaires devaient se manifester, contactez *immédiatement* votre médecin.

Très rare (concerne moins de 1 personne sur 10 000)

Fortes crampes dorsales. Si vous éprouvez des vertiges après une injection, asseyez-vous ou allongez-vous jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux. En l'absence d'amélioration, parlez avec votre médecin avant de poursuivre le traitement.

Veuillez contacter votre médecin si vous souffrez durablement de nausées, de vomissements, de constipation, de manque d'énergie ou de faiblesse musculaire. Ces symptômes peuvent suggérer que la teneur de votre sang en calcium est trop élevée. Pendant le traitement, votre médecin peut prélever des échantillons de sang et d'urine afin de contrôler votre réponse à Sondelbay. En outre, votre médecin peut vous demander de procéder à des examens répétés de votre densité minérale osseuse.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Délai d'utilisation après ouverture

Après la première injection, le stylo prérempli peut être utilisé pendant 28 jours s'il est conservé entre 2° et 8°C. Le stylo prérempli de Sondelbay peut être conservé à température ambiante (pas au dessus de 25 °C) pendant 3 jours maximum si aucune réfrigération n'est disponible. Il doit ensuite être replacé au réfrigérateur et utilisé dans les 28 jours suivant la première injection.

Au bout de 28 jours, le stylo prérempli doit être éliminé de façon appropriée, même s'il reste encore de la solution dans le stylo.

Mention concernant l'élimination des médicaments

Ne jetez aucun médicament avec les eaux usées ou les ordures ménagères. Les médicaments périmés ou qui ne sont plus utilisés dans les ménages peuvent être rapportés dans les pharmacies ou dans les centres de collecte. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

Remarques concernant le stockage

Conserver au réfrigérateur (2-8°C).



Ne congélez pas Sondelbay. Ne placez pas le stylo prérempli à proximité du compartiment à glace du réfrigérateur afin d'éviter qu'il ne gèle. N'utilisez pas le médicament s'il est ou a été congelé. Conserver le récipient dans son carton pour le protéger de la lumière.

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Le stylo prérempli doit être remis au réfrigérateur immédiatement après utilisation. Remettez le capuchon protectif lorsque vous n'utilisez pas le stylo prérempli pour protéger la cartouche des dommages physiques et de la lumière.

Ne conservez pas le stylo prérempli avec l'aiguille attachée.

Sondelbay contient une solution limpide et incolore. N'utilisez pas Sondelbay si des particules solides se sont formées ou si la solution est trouble ou colorée.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Sondelbay?

Solution injectable en stylo prérempli pour utilisation sous-cutanée. Solution incolore, limpide.

Principes actifs

Sondelbay contient comme principe actif le tériparatide.

Chaque millilitre de solution injectable contient 250 microgrammes de tériparatide.

Excipients

Acide acétique glacial (E260), Acétate de sodium (E262), Mannitol (E241), Métacrésol, Acide chlorhydrique (pour l'ajustement du pH, E507), Hydroxyde de sodium (pour l'ajustement du pH, E524) et Eau pour préparations injectables.

Numéro d'autorisation

68534 (Swissmedic).

Où obtenez-vous Sondelbay? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Il existe des emballages avec 1 stylo prérempli de Sondelbay.


Titulaire de l'autorisation




Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en juillet 2026 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

Mode d'emploi

Composants du stylo prérempli Sondelbay*



Les aiguilles ne sont pas fournies*



* Utiliser avec des aiguilles pour stylo prérempli (31G ou 32G; 4 mm, 5 mm ou 8 mm).

Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien pour déterminer le calibre et la longueur d'aiguille qui vous conviennent le mieux.

Utilisez une aiguille neuve pour chaque injection.

Vérifiez la fenêtre du compteur de doses pour déterminer le nombre de doses restant. La flèche ◀ montre le nombre de doses restant. Un stylo prérempli neuf doit contenir 28 doses.




Les points noirs qui sont visibles dans la fenêtre du compteur de doses représentent les nombres impairs de doses restant dans le stylo prérempli.

N'utilisez pas le stylo prérempli si le compteur de doses affiche «00» car cela signifie qu'il ne reste plus aucune dose.

Votre stylo prérempli Sondelbay n'a pas besoin d'être purgé.


1 Préparez-vous





Préparez le site d'injection (la cuisse ou l'abdomen) en suivant les recommandations de votre médecin, pharmacien ou personnel soignant.

- Lavez-vous **toujours** les mains avant chaque injection.
- **Vérifiez** l'étiquette du stylo prérempli pour vous assurer qu'il s'agit du médicament correct.
- **Vérifiez** la date de péremption pour vous assurer qu'elle n'est pas dépassée.
- **Vérifiez** la fenêtre du compteur de doses pour vous assurer qu'il reste des doses dans votre stylo prérempli. Un stylo prérempli neuf doit contenir 28 doses.



Retirez le capuchon du stylo prérempli.


- **Vérifiez** que le stylo prérempli, ainsi que la cartouche de médicament, ne sont pas endommagés.
- **Vérifiez** que la solution de médicament est limpide, incolore et qu'elle ne contient pas de particules.

2 Fixez l'aiguille




Retirez la languette de papier.

Poussez l'aiguille de façon **bien droite** sur la cartouche de médicament.




Vissez l'aiguille jusqu'à ce qu'elle soit **fermement fixée**.



Retirez le capuchon externe de l'aiguille et conservez-le. Vous en aurez besoin pour retirer l'aiguille après avoir utilisé le stylo prérempli.

3 Sélectionnez la dose




Vérifiez qu'un symbole de cercle vide  se trouve dans la fenêtre de sélection de dose.




Tournez le bouton de sélection de dose fermement dans le sens des aiguilles d'une montre, des flèches apparaîtront dans la fenêtre de sélection de dose.



Continuez à tourner jusqu'au bout **et ne relâchez pas le bouton de sélection de dose** jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » et que vous voyiez un **symbole de cercle plein**  dans la fenêtre de sélection de dose.



Lâchez le bouton de sélection de dose. Vous verrez le cercle plein surmonté d'une barre  s'afficher dans la fenêtre de sélection de dose. Cela confirme que vous avez sélectionné votre




Retirez le capuchon interne de l'aiguille et **jetez-le**.




Un relâchement prématuré ou des rotations incomplètes peuvent avoir un impact sur le compteur de doses et réduire le nombre de doses disponibles dans votre stylo prérempli.

dose.


4 Injectez la dose



Pincez doucement une partie de la peau des cuisses ou de l'abdomen. Insérez l'aiguille de façon bien droite dans la peau, en vous assurant que vous pouvez bien voir **la fenêtre de sélection de dose**.




En maintenant l'aiguille dans la peau, faites **glisser** le bouton d'injection jusqu'à la butée. Cela commencera votre injection.



Maintenez l'aiguille dans la peau, patientez jusqu'à ce qu'un symbole de cercle vide  s'affiche dans la fenêtre de sélection de dose. À présent, **comptez lentement jusqu'à 5** et retirez ensuite l'aiguille de la peau.

5 Confirmez la dose




Après avoir effectué l'injection et retiré l'aiguille de la peau, assurez-vous que le symbole de cercle vide  s'affiche dans la fenêtre de sélection de dose.


Si le symbole de cercle vide **ne s'affiche pas** dans la fenêtre de sélection de dose:

- **N'effectuez pas une deuxième injection au cours de la même journée.**
- Par contre, vous devez réinitialiser le stylo prérempli. Reportez-vous au problème D de la rubrique Dépannage.


6 Retirez l'aiguille




Remettez le capuchon externe sur l'aiguille de la manière illustrée ci-dessus, puis **enfoncez-le** pour le fixer. Afin d'éviter les



Dévissez l'aiguille du stylo prérempli en tournant le capuchon externe de l'aiguille dans le sens inverse des aiguilles d'une montre



Retirez l'aiguille et jetez-la conformément aux instructions de votre médecin ou pharmacien.



Remettez le capuchon du stylo prérempli sur celui-ci en poussant fermement. Placez le stylo prérempli au **réfrigérateur**



blessures par piqûre d'aiguille, **n'essayez pas** de remettre en place le capuchon interne de l'aiguille et ne touchez pas celle-ci.

au moins 5 fois.

immédiatement après utilisation.

Dépannage

	Problème	Solution
A.	Je vois une bulle d'air dans mon stylo prérempli Sondelbay	Une petite bulle d'air n'aura aucune incidence sur votre dose et ne vous nuira pas. Vous pouvez continuer l'administration de votre dose comme d'habitude.
B.	Je ne peux pas sélectionner ma dose	1. Vérifiez la fenêtre du compteur de doses et assurez-vous qu'il reste au moins une dose dans votre stylo prérempli Sondelbay. Si vous voyez «00» dans la fenêtre du compteur de dose, cela signifie qu'il ne reste aucune dose dans le stylo prérempli Sondelbay. Vous pouvez voir qu'il reste encore du médicament dans la cartouche, mais il ne peut pas être injecté. Vous devez utiliser un nouveau stylo prérempli Sondelbay pour injecter votre dose suivante. 2. S'il reste au moins une dose dans votre stylo prérempli Sondelbay, et que vous ne pouvez quand même pas sélectionner votre dose, assurez-vous de tourner le bouton de sélection de dose dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un «clic» et que vous voyiez un symbole de cercle plein  dans la fenêtre de sélection de dose. Ne lâchez pas le bouton de sélection de dose tant que vous n'avez pas entendu le «clic» et vu un symbole de cercle plein, sinon, il retournera à sa position d'origine. Une fois que vous entendez le «clic», lâchez le bouton de sélection de dose et vous verrez un symbole de cercle plein surmonté d'une barre  dans la fenêtre de sélection de dose.
C.	Je vois une goutte de médicament à la pointe de l'aiguille lorsque je retire le capuchon interne de l'aiguille pour pratiquer l'injection	La présence d'une petite goutte de médicament à la pointe de l'aiguille n'a aucun effet sur votre dose. Continuez à administrer votre dose de la manière décrite à l'étape 4 des Instructions pour l'utilisation.
D.	Le symbole de cercle vide  ne s'est pas affiché dans la fenêtre de sélection de dose, même après avoir poussé le bouton d'injection jusqu'au bout et après avoir patienté. Que dois-je faire?	Vous devez réinitialiser votre stylo Sondelbay en suivant les étapes ci-dessous: 1. Si vous vous êtes déjà administré une injection, NE PRATIQUEZ PAS l'injection une deuxième fois au cours de la même journée. 2. Retirez l'aiguille usagée en remettant en place avec précaution le gros capuchon externe de l'aiguille sur celle-ci. Ne touchez pas l'aiguille. N'essayez pas de remettre en place le capuchon interne de l'aiguille. Dévissez l'aiguille et jetez-la conformément aux instructions de votre médecin, pharmacien ou personnel soignant. 3. Fixez une nouvelle aiguille, retirez le gros capuchon externe de l'aiguille et conservez-le. 4. Dirigez le capuchon interne de l'aiguille vers un conteneur vide. 5. Retirez le capuchon interne de l'aiguille. Faites attention car cela peut entraîner des projections du médicament. Il est également possible que du médicament ait déjà été expulsé dans le capuchon interne de l'aiguille. Jetez le capuchon interne de l'aiguille. 6. Vous devriez à présent voir le symbole de cercle vide  dans la fenêtre de sélection de dose. Si vous ne pouvez toujours pas le voir, veuillez contacter votre médecin, pharmacien ou personnel soignant. 7.



		Mettez le capuchon externe de l'aiguille sur celle-ci. Ne touchez pas l'aiguille. N'essayez pas de remettre en place le capuchon interne de l'aiguille. Dévissez l'aiguille et jetez-la conformément aux instructions de votre médecin, pharmacien ou personnel soignant. 8. Remettez le capuchon du stylo prérempli sur votre stylo prérempli Sondelbay, et placez celui-ci au réfrigérateur. 9. Lavez-vous les mains. Vous pouvez éviter ce problème en utilisant toujours une aiguille NEUVE pour chaque injection, et en faisant glisser le bouton d'injection jusqu'à la butée. Patientez jusqu'à voir apparaître le symbole de cercle vide  puis comptez lentement jusqu'à 5 avant de retirer l'aiguille de la peau.
E.	Comment savoir que mon stylo prérempli Sondelbay fonctionne?	Votre stylo Sondelbay permet d'injecter une dose complète à chaque utilisation effectuée conformément aux indications de la rubrique Instructions pour l'utilisation. Le symbole de cercle vide  s'affiche dans la fenêtre de sélection de dose après l'injection pour indiquer que la dose complète du médicament a été injectée. La fenêtre du compteur de doses affiche le nombre de doses restant dans le stylo prérempli. Celui-ci décroît d'1 unité chaque fois qu'une injection est administrée. Cela indique également que le stylo prérempli fonctionne. Utilisez une aiguille neuve pour chaque injection afin de vous assurer que votre stylo prérempli Sondelbay fonctionne correctement.
F.	Je n'arrive pas à retirer l'aiguille de mon stylo prérempli Sondelbay.	1. Remettez le capuchon externe sur l'aiguille de la manière illustrée à l'étape 6. 2. Pour dévisser l'aiguille, enfoncez l'aiguille sur du stylo prérempli tout en la faisant tourner à plusieurs reprises en sens inverse des aiguilles d'une montre. 3. Retirez l'aiguille et jetez-la conformément aux instructions de votre médecin, pharmacien ou personnel soignant. 4. Si vous n'arrivez toujours pas à retirer l'aiguille, demandez à quelqu'un de vous aider.

Nettoyage et conservation

Nettoyage de votre stylo prérempli Sondelbay:

- Essuyez l'extérieur de votre stylo prérempli Sondelbay à l'aide d'un tissu humide.
- Ne mettez pas votre stylo prérempli Sondelbay dans l'eau et n'utilisez pas de produit liquide pour le laver/nettoyer.

Conservation de votre stylo prérempli Sondelbay:

- Suivez les instructions de cette Information destinée aux patients sous «À quoi faut-il encore faire attention?»

Élimination du stylo prérempli Sondelbay et des aiguilles

Élimination du stylo Sondelbay:

- Jetez votre stylo prérempli Sondelbay 28 jours après votre première injection, même s'il n'est pas complètement vide.
- Retirez toujours l'aiguille avant de jeter votre stylo prérempli Sondelbay.
- Demandez à votre médecin ou pharmacien comment procéder pour éliminer votre stylo prérempli Sondelbay.

Élimination des aiguilles

- Mettez les aiguilles usagées dans un conteneur à objets pointus/tranchants ou dans un conteneur en plastique résistant à la perforation muni d'un couvercle sécurisé.



- Ne jetez pas les aiguilles directement avec vos ordures ménagères.
- Demandez à votre médecin ou pharmacien comment procéder pour éliminer de manière appropriée le conteneur à objets pointus/tranchants.

Autres informations

- Lisez et suivez les instructions de la notice pour l'utilisation de ce produit.
- L'utilisation du stylo prérempli Sondelbay par des personnes aveugles ou malvoyantes n'est pas recommandée sans l'aide d'une personne formée à l'utilisation du stylo prérempli.
- Ne transférez pas le médicament dans une seringue.
- Contactez votre médecin ou pharmacien si vous constatez que:
 - votre stylo prérempli Sondelbay semble être endommagé
 - votre médicament N'EST PAS limpide, incolore ni exempt de particules
- Notez la date de votre première injection sur l'emballage extérieur du stylo prérempli (voir l'espace prévu à cet effet: Date de 1^{ière} utilisation). Vous devez jeter votre stylo prérempli Sondelbay 28 jours après votre première injection.

