

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di fare uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Spersacarpine® 2%

Che cos'è Spersacarpine 2% e quando si usa?

Spersacarpine 2% serve per la terapia del glaucoma.

Spersacarpine 2% si può usare solamente su prescrizione medica.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico per curare i disturbi agli occhi di cui soffre attualmente. Non lo adoperi per trattare altre malattie o terze persone.

Avvertenza per i portatori di lenti a contatto:

Durante la terapia si sconsiglia di portare lenti a contatto. Se non è possibile rinunciare alle lenti a contatto, le tolga prima dell'uso e aspetti 15 minuti prima di riapplicarle.

Quando non si può usare Spersacarpine 2%?

In caso di ipersensibilità (allergia) conosciuta o presunta ad un costituente di Spersacarpine 2%, di infiammazione acuta dell'iride oppure di glaucoma da blocco ciliare.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Spersacarpine 2%?

Benzalconio cloruro può essere assorbito dalle lenti a contatto morbide e può portare al cambiamento del loro colore.

Benzalconio cloruro può anche causare irritazione agli occhi specialmente se ha l'occhio secco o disturbi alla cornea (lo strato trasparente più superficiale dell'occhio). Se prova una sensazione anomala all'occhio, di bruciore o dolore dopo aver usato questo medicamento, parli con il medico.

Se contemporaneamente a Spersacarpine 2% deve applicare negli occhi anche altre gocce od unguenti, chieda consiglio al medico e rispetti un intervallo di almeno 5 minuti tra un'applicazione e l'altra.

Anche in caso di uso corretto, a seguito di restringimento della pupilla e visione offuscata, la pilocarpina intacca l'acuità visiva e di conseguenza anche la capacità di reazione nel traffico stradale e durante l'uso di macchine.

Informi il suo medico o il suo farmacista, nel caso in cui

—



- soffra di altre malattie (specialmente malattie del cuore, asma, iperfunzione della tiroide, ulcere gastriche o intestinali, malattie occlusive del tratto digerente o disturbi dello svuotamento vescicale);
- soffra di allergie o
 - assuma o applichi agli occhi altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!).

Si può usare Spersacarpine 2% durante la gravidanza o l'allattamento?

Uso durante la gravidanza e l'allattamento soltanto con l'esplicito consenso del medico.

Come usare Spersacarpine 2%?

Salvo diversa prescrizione del medico, instillare 1 goccia 2–4 volte al giorno nel sacco congiuntivale dell'occhio. Con la testa piegata all'indietro e tenendo con una mano il flaconcino contagocce il più possibile verticalmente sopra l'occhio, tirare leggermente con l'altra mano la palpebra inferiore verso il basso e, premendo sul flaconcino, far cadere una goccia nel sacco congiuntivale (evitare il contatto con l'estremità del contagocce!). Dopo aver instillato il collirio si raccomanda di premere (per circa 1 minuto) con la punta del dito sul canale lacrimale vicino all'ala del naso, così da diminuire la distribuzione del principio attivo nel corpo.

L'uso e la sicurezza di Spersacarpine 2%, collirio nei bambini e negli adolescenti finora non sono stati esaminati.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Spersacarpine 2%?

In seguito all'applicazione di Spersacarpine 2% possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Il restringimento della pupilla che si manifesta è un effetto diretto del principio attivo e causa l'auspicata diminuzione della pressione dell'occhio. Può però provocare un peggioramento della visione, specialmente al crepuscolo e nell'oscurità.

Non comune (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 1'000)

Soprattutto all'inizio della terapia Spersacarpine 2% può provocare tremore delle palpebre, mal di testa, aumento della secrezione lacrimale, irritazione e dolore all'occhio e spasmi della pupilla.

Raro (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 10'000)

Reazioni allergiche.

Molto raro (riguarda meno di 1 utilizzatore su 10'000)

In casi estremamente rari, in pazienti predisposti, può verificarsi un distacco della retina.

Molto raramente possono comparire cisti sul margine pupillare. Molto raramente può verificarsi un restringimento della camera anteriore, da cui può eventualmente svilupparsi un glaucoma acuto ad angolo



chiuso (aumento della pressione interna dell'occhio).

I principi attivi contenuti nei preparati per uso oftalmico possono entrare nella circolazione sanguigna, perciò sono possibili anche effetti collaterali nell'organismo, non solo agli occhi.

Frequenza non nota (non può essere definita sulla base dei dati disponibili)

Disturbo della funzionalità cardiaca, ipertensione, contrazioni della muscolatura liscia dei bronchi (broncospasmi), edema polmonare, nausea, vomito, spasmi addominali, salivazione intensa, debolezza muscolare, crampi, evacuazione urgente e dolorosa (tenesmi), sudorazione.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico o farmacista soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Per preservare la sterilità del collirio, l'estremità del contagocce non deve venire a contatto né con le mani né con gli occhi.

Termine di consumo dopo l'apertura

Chiudere bene il flacone subito dopo l'uso.

Dopo l'apertura, consumare entro un mese.

Gli eventuali residui rimasti nel flacone 30 giorni dopo l'apertura devono essere riportati al centro di dispensazione (medico o farmacista), affinché vengano correttamente smaltiti.

Istruzioni di conservazione

Conservare nella confezione originale, a temperatura ambiente (15–25 °C) e fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Spersacarpine 2%?

1 ml di Spersacarpine 2%, collirio contiene:

Principi attivi

20 mg di pilocarpina.

Sostanze ausiliarie

Acido borico (E 284), borace (E 285), ipromellosa, benزالconio cloruro, acqua depurata.



Numero dell'omologazione

26073 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Spersacarpine 2%? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica.

Spersacarpine 2%, collirio, flacone contagocce da 10 ml.

Titolare dell'omologazione

OmniVision AG, 8212 Neuhausen.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'agosto 2021 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

