

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di assumere o fare uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Catapresan®

Che cos'è Catapresan e quando si usa?

Il Catapresan è un medicamento contro la pressione arteriosa troppo alta (ipertensione). Il Catapresan si può assumere soltanto su prescrizione del medico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Solamente il suo medico può decidere la cessazione della terapia col Catapresan, che deve avvenire diminuendo gradualmente la dose nello spazio di 2-4 giorni. Se si smette improvvisamente di assumere il Catapresan possono conseguire un rapido aumento della pressione arteriosa e/o nervosismo, tremito, mal di testa e nausea. Riprendendo il trattamento col Catapresan questi sintomi dovrebbero essere eliminati.

Quando non si può assumere Catapresan?

Il Catapresan non si deve assumere in presenza di malattie del cuore con polso lento (sindrome del nodo sinusale, blocco AV di 2° o 3° grado), come pure in caso di provata ipersensibilità al principio attivo o ad un altro costituente del medicamento.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Catapresan?

In presenza di disfunzioni dei reni, polso lento, disturbi dell'irrorazione sanguigna, malattie del cuore, depressioni, disturbi delle vie nervose (polineuropatia) e tendenza alla stitichezza il medico adeguerà la dose ed eventualmente la convocherà per controlli più frequenti.

Se porta lenti a contatto tenga presente che il Catapresan può diminuire la secrezione lacrimale.

L'effetto dell'alcool, dei sonniferi o dei calmanti può essere potenziato, specialmente all'inizio della terapia.

Le compresse Catapresan contengono lattosio. Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicamento.

Durante il trattamento col Catapresan possono manifestarsi degli effetti indesiderati, quali p.es. vertigini, sonnolenza e offuscamento della vista. Perciò occorre prudenza conducendo un veicolo o utilizzando delle macchine. Se in lei si manifestano gli effetti collaterali menzionati eviti di svolgere attività potenzialmente pericolose come condurre un veicolo o utilizzare delle macchine.

Informi il suo medico o il suo farmacista nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente.



Questo è particolarmente vero quando si assumono sonniferi e calmanti, medicinali contro la depressione (antidepressivi triciclici) o altre malattie psichiche (neurolettici), come pure certi farmaci per il cuore (anche digitalici), altri medicinali antiipertensivi, farmaci che aumentano l'escrezione urinaria (diuretici) ed «antireumatici» (come acido acetilsalicilico e altri FANS = farmaci antiinfiammatori non steroidei). Questi medicinali, presi in concomitanza, possono modificare l'effetto del Catapresan oppure peggiorarne la tollerabilità. Inoltre può manifestarsi una maggior sensibilità all'alcool.

Si può assumere Catapresan durante la gravidanza o l'allattamento?

Solo il suo medico può decidere se lei può assumere il Catapresan durante la gravidanza. Il Catapresan non dev'essere assunto durante l'allattamento. Se è incinta, prevede una gravidanza oppure allatta ne informi il medico o il farmacista.

Come usare Catapresan?

La posologia del Catapresan dev'essere stabilita individualmente dal medico, per cui lei deve attenersi esattamente alla sua prescrizione e non modificare o cessare la terapia senza averlo consultato.

Il Catapresan è destinato soltanto agli adulti.

Normalmente si inizia la terapia prendendo mezza compressa prima di coricarsi. Raramente occorrono più di 2 compresse al giorno (prese mattina e sera).

Eventuali aumenti della dose saranno stabiliti dal medico e generalmente avverranno a intervalli di 2-4 settimane ogni volta. Le compresse si devono deglutire senza masticarle con parecchia acqua. Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Catapresan?

Con l'assunzione del Catapresan possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Molto comune (riguarda più di 1 persona su 10)

All'inizio del trattamento molto frequentemente possono manifestarsi una lieve sonnolenza, vertigini e abbassamento eccessivo della pressione arteriosa (soprattutto quando si sta in piedi), secchezza della bocca. Questi effetti collaterali di solito scompaiono con la prosecuzione del trattamento. In caso contrario, è necessario informare il medico.

Comune (riguarda da 1 a 10 persone su 100)

Disturbi del sonno, umore depresso, mal di testa, costipazione, nausea, vomito, alterazione della funzione epatica, disturbi della potenza, stanchezza

Non comune (riguarda da 1 a 10 persone su 1000)

Allucinazioni, Incubi, disturbi percettivi, reazioni di ipersensibilità (allergie, prurito, orticaria, gonfiore del viso, delle labbra o della lingua), malessere, disturbi dell'irrorazione sanguigna

Raro (riguarda da 1 a 10 persone su 10'000)

Ingrossamento delle ghiandole mammarie (negli uomini), aumento transitorio della glicemia, diminuzione della secrezione lacrimale, naso secco, caduta dei capelli

Frequenza non nota (non può essere definita sulla base dei dati disponibili)



Agitazione, stati ansiosi, confusione, delirio, offuscamento della vista, diminuzione della libido, dolori addominali, dolori muscolari e articolari, crampi alle gambe, pallore, febbre, polso lento o rapido, insufficienza cardiaca, svenimento, aumento di peso

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico o farmacista soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Non conservare a temperature superiori a 30 °C. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Indicazioni per lo smaltimento

Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. I medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, possono essere consegnati nelle farmacie o nei punti di raccolta. Queste misure aiutano a proteggere l'ambiente.

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Catapresan?

Principi attivi

1 compressa contiene 150 microgrammi di clonidina cloridrato.

Sostanze ausiliarie

Lattosio monoidrato, calcio fosfato dibasico, amido di mais, silice colloidale anidra, povidone K-25, amido di mais solubile, acido stearico

Numero dell'omologazione

33148 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Catapresan? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica

Confezione da 100 compresse (con linea di frattura, divisibili)

Titolare dell'omologazione

CPS Cito Pharma Services GmbH, 8610 Uster

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel gennaio 2023 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

