

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant de prendre ou d'utiliser ce médicament. Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Cosentyx® UnoReady®, 300 mg, solution injectable en stylo prérempli

Novartis Pharma Schweiz AG

Qu'est-ce que Cosentyx UnoReady et quand doit-il être utilisé?

Selon prescription du médecin.

Cosentyx contient le principe actif sécukinumab. Le sécukinumab est un anticorps monoclonal entièrement humain. Les anticorps monoclonaux sont des protéines qui reconnaissent des protéines spécifiques de l'organisme et s'y lient.

Cosentyx appartient à un groupe de médicaments nommés inhibiteurs d'interleukine (inhibiteurs d'IL). Ce médicament agit en réduisant l'activité d'une interleukine qui est présente en concentration élevée dans des maladies telles que le psoriasis, le rhumatisme psoriasique, la spondylarthrite axiale et la maladie de Verneuil (hidrosadénite suppurée).

Cosentyx UnoReady est utilisé pour le traitement des maladies inflammatoires suivantes:

- Psoriasis en plaques
- Rhumatisme psoriasique
- Maladie de Verneuil (hidrosadénite suppurée)

Psoriasis en plaques

Cosentyx UnoReady est utilisé pour le traitement d'une maladie de la peau appelée «psoriasis en plaques». Le psoriasis en plaques provoque une inflammation de la peau. Cosentyx UnoReady réduit l'inflammation et d'autres symptômes de la maladie.

Cosentyx UnoReady est utilisé chez les adultes atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère, selon prescription du médecin.

Rhumatisme psoriasique

Cosentyx UnoReady est utilisé pour le traitement d'une maladie appelée «rhumatisme psoriasique». Il s'agit d'une maladie inflammatoire des articulations, souvent accompagnée de psoriasis. Cosentyx UnoReady est utilisé pour réduire les signes et symptômes du rhumatisme psoriasique actif, ralentir les lésions des os et des articulations et améliorer la fonction physique.

Cosentyx UnoReady est utilisé chez les adultes atteints de rhumatisme psoriasique actif qui n'ont pas répondu suffisamment aux traitements conventionnels et il peut être utilisé seul ou en association avec le médicament méthotrexate.

Maladie de Verneuil (hidrosadénite suppurée)

Cosentyx est utilisé pour traiter une maladie appelée hidrosadénite suppurée, parfois aussi nommée maladie de Verneuil. Il s'agit d'une maladie inflammatoire chronique et douloureuse de la peau. Les symptômes comprennent des nodules sensibles à la pression et des abcès desquels peut s'écouler du pus. La plupart du temps, certaines zones de la peau sont touchées, notamment sous les seins, sous les aisselles, à l'intérieur des cuisses, dans l'aîne et sur les fesses. Des cicatrices peuvent également se former sur les zones concernées.



Cosentyx permet de réduire le nombre de nodules et d'abcès et de soulager les douleurs qui accompagnent souvent cette affection.

Cosentyx est utilisé pour le traitement de la maladie de Verneuil (hidrosadénite suppurée) chez les adultes qui n'ont pas suffisamment répondu à un traitement antibiotique.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

On ne connaît pas les risques à long terme liés à l'utilisation de Cosentyx.

Suivez minutieusement toutes les instructions de votre médecin.

Quand Cosentyx UnoReady ne doit-il pas être utilisé?

- Si vous avez présenté une réaction allergique grave au principe actif sécukinumab ou à l'un des excipients contenus dans Cosentyx UnoReady (mentionnés à la rubrique «Que contient Cosentyx UnoReady»).
- Si vous pensez que vous pourriez être allergique, demandez conseil à votre médecin avant d'utiliser Cosentyx UnoReady.
- Si vous souffrez d'une infection grave, par exemple de la tuberculose.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Cosentyx UnoReady?

Si vous êtes dans l'une des situations suivantes, informez-en votre médecin ou votre pharmacien avant de commencer à utiliser Cosentyx UnoReady:

- Si vous avez récemment souffert d'une infection ou si vous souffrez d'une infection chronique ou d'infections à répétition.
- Si vous ou votre enfant souffrez ou avez souffert d'une hépatite B.

Si un de ces symptômes se manifeste pendant le traitement par Cosentyx, veuillez en informer immédiatement votre médecin ou votre pharmacien:

- Si une éruption cutanée qui démange, une peau sèche, des taches sèches, une peau enflammée, des taches en forme de pièce de monnaie sur la peau [dermatite (y compris eczéma)] apparaissent.
- Si une inflammation sévère de l'ensemble de la surface du corps survient (dermite exfoliative).
- Si vous êtes atteint(e) d'une maladie inflammatoire de l'intestin (par exemple, maladie de Crohn ou colite ulcéreuse) ou d'autres maladies chroniques de l'intestin ou en avez été atteint(e) dans le passé.
- Si vous avez été vacciné(e) récemment ou devez être vacciné(e) pendant le traitement par Cosentyx UnoReady.
- Si vous présentez une hypersensibilité (allergie) au latex (caoutchouc naturel).

Si vous remarquez un ou plusieurs des symptômes suivants pendant le traitement par Cosentyx UnoReady, arrêtez immédiatement le traitement et informez-en votre médecin ou votre pharmacien:

Signes ou symptômes d'une infection potentiellement grave. Ceux-ci peuvent inclure:

- fièvre, symptômes de type grippal, sueurs nocturnes;
- sensation de fatigue ou essoufflement; toux persistante;
- peau chaude, rouge et douloureuse ou éruption cutanée douloureuse avec des cloques;
- sensation de brûlure lors de la miction.

Signes ou symptômes d'une réaction allergique. Ceux-ci peuvent inclure:

- difficultés à respirer ou à avaler;
- tension artérielle basse qui peut provoquer des vertiges ou des étourdissements;



- gonflement du visage, des lèvres, de la bouche ou du cou.

Prise d'autres médicaments (interactions avec d'autres médicaments incluant vaccins et médicaments biologiques)

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si

- vous avez récemment été vacciné(e) ou allez être vacciné(e). Certains types de vaccins (vaccins vivants) ne doivent pas vous être administrés pendant l'utilisation de Cosentyx UnoReady;
- vous prenez des médicaments dont la dose doit être ajustée individuellement, tels que:
 - l'atorvastatine, pour réduire les taux de cholestérol,
 - les inhibiteurs des canaux calciques (p.ex. amlodipine), pour le traitement d'une tension artérielle élevée,
 - la théophylline, pour le traitement de l'asthme,
 - l'acénocoumarol, la phénprocoumone, pour le traitement des maladies thromboemboliques (formation de caillots sanguins dans le système circulatoire),
 - la phénytoïne, pour le traitement des convulsions,
 - la cyclosporine, pour réprimer le système immunitaire après une greffe,
 - les benzodiazépines, pour le traitement des états anxieux;
- vous prenez/utilisez déjà, avez récemment pris/utilisé ou allez éventuellement prendre/utiliser d'autres médicaments (même en automédication!).

Ce médicament peut affecter les réactions, l'aptitude à conduire et la capacité à utiliser des outils et des machines.

Cosentyx UnoReady peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

On ne connaît pas l'effet du principe actif de Cosentyx chez les femmes enceintes; par conséquent, Cosentyx ne doit pas être utilisé durant la grossesse. Pendant le traitement par Cosentyx et pendant les 5 mois suivant la dernière prise de Cosentyx, il convient d'éviter une grossesse par l'utilisation d'une méthode de contraception.

Discutez avec votre médecin avant d'utiliser Cosentyx UnoReady si

- vous êtes enceinte, pensez être enceinte ou souhaitez débuter une grossesse. Cosentyx UnoReady n'est pas recommandé pendant la grossesse, sauf si le bénéfice l'emporte clairement sur les risques possibles;
- vous allaitez ou souhaitez allaiter. On ignore si le principe actif de Cosentyx passe dans le lait maternel. Il est donc recommandé de ne pas allaiter pendant le traitement par Cosentyx UnoReady et pendant les 5 mois qui suivent la dernière prise de Cosentyx UnoReady.

Comment utiliser Cosentyx UnoReady?

Utilisez toujours Cosentyx UnoReady en respectant scrupuleusement les instructions de votre médecin. Veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou au personnel soignant en cas de doute.

Cosentyx UnoReady est administré par injection sous la peau («sous-cutanée»).

Vous et votre médecin déciderez si vous pouvez vous injecter vous-même Cosentyx UnoReady.

Il est important que vous n'essayiez pas d'effectuer l'injection vous-même avant d'avoir reçu une formation de la part de votre médecin, de votre pharmacien ou d'un(e) infirmier(ère). Un soignant peut également vous administrer l'injection de Cosentyx UnoReady après avoir reçu une formation appropriée.

Vous trouverez des instructions détaillées pour l'injection de Cosentyx UnoReady dans le mode d'emploi ci-joint.

Quelle quantité de Cosentyx UnoReady est administrée?



Pour l'administration de 300 mg, le stylo prérempli Cosentyx UnoReady 300 mg/2 ml peut être utilisé. Pour une dose de 150 mg, Cosentyx UnoReady *ne doit pas* être utilisé. Pour une dose de 150 mg, votre médecin vous prescrira le stylo prérempli Cosentyx SensoReady ou la seringue préremplie Cosentyx à 150 mg/1 ml.

Psoriasis en plaques

La dose usuelle recommandée s'élève à 300 mg sous forme d'injection sous-cutanée une fois par semaine pendant les 5 premières semaines. La 6^e injection est effectuée 1 mois après la 5^e et les injections suivantes (7^e, 8^e, etc.) sont également administrées une fois par mois. Votre médecin décidera, le cas échéant, si la dose de Cosentyx doit être administrée toutes les 2 semaines plutôt que tous les mois, si votre poids corporel est de 90 kg ou plus.

Chaque dose de 300 mg est administrée sous forme d'une injection sous-cutanée de 300 mg. Il est nécessaire d'injecter la totalité du contenu du stylo prérempli.

Votre médecin décidera s'il est nécessaire, le cas échéant, de réduire la dose de Cosentyx de 300 à 150 mg.

Rhumatisme psoriasique

La dose recommandée s'élève à 150 mg sous forme d'injection sous-cutanée une fois par semaine pendant les 5 premières semaines. La 6^e injection est effectuée 1 mois après la 5^e et les injections suivantes (7^e, 8^e, etc.) sont également administrées une fois par mois. En fonction de votre réponse au traitement, votre médecin peut augmenter la dose à 300 mg. Chez les patients atteints de rhumatisme psoriasique qui souffrent également de psoriasis en plaques modéré à sévère, le médecin pourra adapter la dose recommandée selon les besoins.

Si vous avez répondu de manière insuffisante à un autre traitement (dit inhibiteur du facteur de nécrose tumorale (TNF)), votre médecin décidera si vous devez recevoir une dose plus élevée: dans ce cas, la dose recommandée peut être de 300 mg sous forme d'injection sous-cutanée administrée une fois par semaine pendant les 5 premières semaines. La 6^e injection est effectuée 1 mois après la 5^e et les injections suivantes (7^e, 8^e, etc.) sont également administrées une fois par mois.

Chaque dose de 300 mg est administrée sous forme d'une injection sous-cutanée de 300 mg.

Maladie de Verneuil (hidrosadénite suppurée)

La dose recommandée est de 300 mg en injection sous-cutanée une fois par semaine pendant les 5 premières semaines. La 6^e injection est effectuée 1 mois après la 5^e et les injections suivantes (7^e, 8^e, etc.) sont également administrées une fois par mois. Chaque dose de 300 mg est administrée sous forme d'une injection sous-cutanée de 300 mg. En fonction de votre réponse au traitement, votre médecin peut augmenter la dose ou arrêter le traitement.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Pendant combien de temps Cosentyx UnoReady doit-il être utilisé?

Ce traitement est un traitement à long terme. Votre médecin contrôlera régulièrement votre état de santé afin de vérifier si le traitement produit les effets désirés.

Vous devez poursuivre l'utilisation de Cosentyx UnoReady aussi longtemps que votre médecin vous l'indique.

Si vous avez utilisé une quantité de Cosentyx UnoReady plus importante que vous n'auriez dû

Si vous vous êtes administré accidentellement une dose de Cosentyx UnoReady plus élevée que la dose prescrite par votre médecin ou si vous vous êtes administré accidentellement Cosentyx UnoReady plus tôt que ne l'a prescrit votre médecin, veuillez en informer votre médecin.

Si vous avez oublié d'utiliser Cosentyx UnoReady



Si vous avez oublié d'injecter une dose de Cosentyx UnoReady, injectez-la dès que vous y pensez. Discutez ensuite avec votre médecin pour savoir quand faire l'injection suivante.

Si vous arrêtez d'utiliser Cosentyx UnoReady

L'arrêt de Cosentyx UnoReady est sans danger. Toutefois, si vous arrêtez le traitement, les symptômes du psoriasis, du rhumatisme psoriasique, de la maladie de Bechterew (spondylarthrite ankylosante) ou de la maladie de Verneuil (hidrosadénite suppurée) peuvent réapparaître.

Enfants et adolescents (de moins de 18 ans)

Cosentyx UnoReady n'est pas recommandé pour les enfants et les adolescents (de moins de 18 ans), l'utilisation dans ce groupe de patients n'ayant pas été évaluée.

Quels effets secondaires Cosentyx UnoReady peut-il provoquer?

Comme tous les médicaments, l'utilisation de Cosentyx UnoReady peut entraîner des effets secondaires; toutefois, ceux-ci ne surviennent pas chez tous les patients.

Vous devez ARRÊTER d'utiliser Cosentyx UnoReady et consulter immédiatement un médecin si vous remarquez l'un des signes suivants d'une réaction allergique:

- difficultés à respirer ou à avaler;
- gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou du cou;
- fortes démangeaisons cutanées avec éruption rouge ou papules saillantes.

Les autres effets secondaires possibles comprennent ceux mentionnés ci-dessous. La plupart de ces effets secondaires sont d'intensité légère ou modérée. Si ces effets secondaires s'aggravent, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Très fréquent (concerne plus d'un utilisateur sur 10)

- infections des voies aériennes supérieures accompagnées de symptômes tels que des maux de gorge et une congestion nasale

Fréquent (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 100)

- boutons de fièvre (herpès buccal)
- diarrhée
- nez qui coule
- maux de tête
- nausées
- fatigue

Occasionnel (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 1000)

- mycose de la bouche
- infections de l'œsophage causées par des champignons (Candida)
- éruption cutanée qui démange
- signes indiquant un nombre réduit de globules blancs, tels que fièvre, maux de gorge ou ulcères de la bouche suite à des infections
- écoulement oculaire avec démangeaisons, rougeur et gonflement
- infection des voies aériennes inférieures
- mycose des pieds
-



crampes abdominales et maux de ventre, diarrhée, perte de poids ou sang dans les selles (signes de problèmes intestinaux)

- éruptions cutanées qui démangent, peau sèche, taches sèches, peau enflammée, taches en forme de pièce de monnaie sur la peau [dermatite (y compris eczéma)]

Rare (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 10 000)

- réaction allergique sévère avec choc (réaction anaphylactique)
- rougeur et desquamation de la peau sur des parties du corps plus grandes, qui peuvent démanger ou être douloureuses (dermite exfoliative)
- inflammation des petits vaisseaux sanguins qui peut entraîner une éruption cutanée avec des petites bosses rouges et violettes (vascularite)
- petites cloques qui démangent sur la paume des mains, la plante des pieds ainsi que le bout des doigts et des orteils (eczéma dyshidrosique)

Fréquence inconnue: la fréquence ne peut pas être estimée sur la base des données disponibles

- mycoses de la peau et des muqueuses (muguet)
- gonflements douloureux et ulcères cutanés (Pyoderma gangraenosum)
- inflammation sévère de l'ensemble de la surface de la peau (dermite exfoliative)
- gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge (œdème de Quincke)

Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas décrits ici, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

À quoi faut-il encore faire attention?

Il ne faut pas utiliser le stylo prérempli

- après la date de péremption indiquée sur l'emballage ou sur l'étiquette du stylo prérempli;
- si le liquide contient des particules bien visibles ou s'il est trouble ou nettement marron.

Remarques concernant le stockage

Conserver le médicament hors de portée des enfants.

Conserver le stylo prérempli dans l'emballage d'origine pour le protéger de la lumière.

Conserver au réfrigérateur (2–8 °C). NE PAS CONGELER.

Ne pas secouer.

Si nécessaire, Cosentyx UnoReady peut être conservé en dehors du réfrigérateur, à température ambiante (pas au-dessus de 30 °C) pendant 4 jours au maximum. Après 4 jours de conservation non réfrigérée, le stylo prérempli doit être jeté.

Remarques complémentaires

Élimination du stylo prérempli

Demandez à votre pharmacien comment éliminer le médicament lorsque vous n'en avez plus besoin.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Cosentyx UnoReady?

Principes actifs

Le principe actif de Cosentyx UnoReady est le sécukinumab. Chaque stylo prérempli contient 300 mg de sécukinumab.



Excipients

Les excipients de Cosentyx UnoReady sont le tréhalose dihydraté, la L-histidine/chlorhydrate d'histidine monohydraté, la L-méthionine, le polysorbate 80 et de l'eau pour préparations injectables.

Numéro d'autorisation

68324 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Cosentyx UnoReady? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Cosentyx UnoReady, 300 mg, solution injectable en stylo prérempli est disponible en boîte de 1 stylo prérempli.

Titulaire de l'autorisation

Novartis Pharma Schweiz AG, Risch; domicile: 6343 Rotkreuz

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en mai 2025 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).


MODE D'EMPLOI DE COSENTYX UNOREADY, SOLUTION INJECTABLE EN STYLO PRÉREMPLI DE 300 MG

	Cosentyx UnoReady 300 mg en stylo prérempli Solution injectable en stylo prérempli Stylo prérempli à usage unique pour injection sous-cutanée 300 mg de sécukinumab Mode d'emploi destiné aux patients
--	---

	Lisez ENTièrement ces instructions avant de procéder à l'injection. Ces instructions sont destinées à vous aider à vous injecter correctement Cosentyx UnoReady, solution injectable en stylo prérempli de 300 mg. Il est important de ne pas essayer d'effectuer l'injection vous-même avant d'avoir reçu une formation de la part de votre médecin, de votre pharmacien ou d'un(e) infirmier(ère).
---	--

Description du stylo prérempli Cosentyx UnoReady 300 mg



 Protège-aiguille Capuchon Fenêtre de visualisation Couvre-aiguille interne La figure présente le stylo prérempli après retrait du capuchon.	Conservez le stylo prérempli Cosentyx UnoReady dans la boîte en carton scellée jusqu'à ce que vous soyez prêt(e) à l'utiliser afin de le protéger de la lumière. Conservez le stylo prérempli Cosentyx UnoReady emballé au réfrigérateur à une température comprise entre 2 °C et 8 °C. Ne pas congeler le stylo prérempli Cosentyx UnoReady. Ne pas secouer le stylo prérempli Cosentyx UnoReady. Pour rendre l'injection plus agréable, sortez le stylo prérempli Cosentyx UnoReady du réfrigérateur 30 à 45 minutes avant l'injection et laissez-le atteindre la température ambiante.
--	--

Informations importantes sur la sécurité

Conservez le stylo prérempli emballé **hors de portée des enfants**.

N'utilisez pas le stylo prérempli Cosentyx UnoReady si la boîte en carton est abîmée.

Ne retirez le capuchon que lorsque vous êtes prêt(e) à vous administrer l'injection.

N'utilisez pas le stylo prérempli s'il est **tombé** après que vous avez retiré le capuchon.

L'aiguille est recouverte par le protège-aiguille de sorte qu'elle n'est pas visible. Ne touchez pas le protège-aiguille et n'appuyez pas dessus, car vous pourriez vous blesser avec l'aiguille.

Ce dont vous avez besoin pour votre injection:



La boîte contient: Un nouveau stylo prérempli Cosentyx UnoReady non utilisé. 	La boîte ne contient pas: - Tampon imbibé d'alcool - Coton ou tampon de gaze - Collecteur de seringues	
---	---	--

Avant l'injection

1. Préparation du stylo prérempli de 300 mg pour l'utilisation

- Sortez la boîte contenant le stylo prérempli Cosentyx UnoReady du réfrigérateur et laissez-la pendant environ 30 à 45 minutes pour qu'elle atteigne la température ambiante.



	2. Contrôles de sécurité importants à réaliser avant l'injection: • Pour la «fenêtre de visualisation»: Le liquide doit être limpide. La couleur du liquide peut varier d'incolore à légèrement jaunâtre. • Ne pas utiliser si le liquide contient des particules bien visibles ou s'il est trouble ou nettement marron. Une petite bulle d'air peut être visible; ceci est normal. Pour la «date de péremption»: • Ne pas utiliser le stylo prérempli au-delà de la date de péremption (EXP). • Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est endommagé. • Vérifiez que votre stylo contient le bon médicament à la dose adéquate. • Si l'un de ces contrôles donne lieu à des réclamations, adressez-vous à votre pharmacien.
	3a. Choix du site d'injection: • Le site d'injection recommandé est la région du bas ventre, excepté la zone située dans un rayon de 5 cm autour du nombril. • Choisissez un nouvel endroit pour chaque injection. • N'injectez pas le médicament à un endroit où la peau est sensible, lésée ou rouge, ou si elle pèle ou est durcie. Les zones présentant des cicatrices ou des vergetures sont à éviter.
	3b. Autres sites d'injection: • L'injection peut également être administrée dans la partie avant de la cuisse ou, lorsqu'un soignant ou un professionnel de santé administre l'injection, dans la partie extérieure du bras, si le site d'injection recommandé ne convient pas.






4. Nettoyage du site d'injection:


- Lavez-vous les mains avec de l'eau chaude savonneuse.
- Nettoyez le site d'injection avec un tampon imbibé d'alcool en décrivant un mouvement circulaire. Laissez le site d'injection sécher avant l'injection.
- Ne touchez plus la zone nettoyée avant l'injection.

L'injection




5. Retrait du capuchon:

- Ne retirez le capuchon que lorsque vous êtes prêt(e) à utiliser le stylo prérempli.
- Retirez le capuchon dans le sens de la flèche.
- Jetez le capuchon après l'avoir retiré. **N'essayez pas de remettre le capuchon.**
- Utilisez le stylo prérempli dans un délai de 5 minutes après avoir retiré le capuchon.



6. Comment tenir le stylo prérempli Cosentyx UnoReady:

- Tenez le stylo prérempli à un angle de 90° par rapport au site d'injection nettoyé.



Correct



Incorrect






À LIRE IMPÉRATIVEMENT AVANT DE PROCÉDER À L'INJECTION!

Pendant l'injection, vous **entendrez deux clics sonores distincts**.

Le **premier clic** indique le début de l'injection. Quelques secondes plus tard, un **deuxième clic** signale que l'injection est **presque** terminée.

Appuyez fermement le stylo prérempli contre votre peau jusqu'à ce qu'**un indicateur vert avec un repère gris** remplisse la fenêtre de visualisation et ne bouge plus.




7. Début de l'injection:

- Appuyez fermement le stylo prérempli contre la peau pour commencer l'injection.
- Le **premier clic** indique le début de l'injection.

Continuez à appuyer fermement le stylo prérempli contre votre peau.

- L'**indicateur vert avec le repère gris** montre la progression de l'injection.




8. Fin de l'injection:

- Attendez le **deuxième clic**. Celui-ci signale que l'injection est **presque** terminée.
- Assurez-vous que l'**indicateur vert avec le repère gris** remplit la fenêtre de visualisation et qu'il ne bouge plus.
- Le stylo prérempli peut à présent être retiré.


Après l'injection





9. Assurez-vous que l'indicateur vert remplit la fenêtre de visualisation:

- Cela signifie que le médicament a été injecté. Consultez votre médecin si l'indicateur vert n'est pas visible.
- Une faible quantité de sang peut être visible au site d'injection. Vous pouvez appuyer pendant 10 secondes sur le site d'injection avec un coton ou un tampon de gaze. Ne frottez pas le site d'injection. Vous pouvez, si nécessaire, recouvrir le site d'injection avec un petit pansement.



10. Élimination du stylo prérempli Cosentyx UnoReady:

- Jetez le stylo prérempli usagé dans un collecteur de seringues (c-à-d. un récipient résistant à la perforation pouvant être refermé ou un récipient similaire).
- Le stylo prérempli est à usage unique et ne doit pas être réutilisé.

