

Remarques importantes concernant les opioïdes comme Coditussin pastilles bronchiques:

- **Dépendance et abus:** l'utilisation répétée d'opioïdes comme Coditussin pastilles bronchiques peut entraîner le développement d'une tolérance et d'une dépendance physique et/ou psychique ainsi que des abus.
- **Troubles respiratoires:** l'utilisation de Coditussin pastilles bronchiques peut entraîner une respiration dangereusement lente ou superficielle et provoquer une éventuelle chute de la tension artérielle. Le cas échéant, veuillez consulter votre médecin.
- **Association avec de l'alcool ou prise concomitante d'autres médicaments:** l'utilisation concomitante de Coditussin pastilles bronchiques avec de l'alcool ou d'autres médicaments susceptibles de vous rendre somnolents augmente le risque de réactions indésirables dangereuses pouvant être mortelles.
- **Exposition involontaire:** l'administration par inadvertance de Coditussin pastilles bronchiques, en particulier chez les enfants, peut entraîner un surdosage mortel.
- **Grossesse:** la consommation prolongée d'opioïdes pendant la grossesse peut entraîner un syndrome de sevrage néonatal des opioïdes, potentiellement mortel, lorsqu'il n'est pas identifié et traité à temps. (Coditussin pastilles bronchiques est contre-indiqué chez les femmes enceintes, voir rubrique «Quand Coditussin pastilles bronchiques ne doit-il pas être pris?».)

Pour plus d'informations, veuillez référer à la rubrique «Quelles sont les précautions à observer lors de la prise de Coditussin pastilles bronchiques?».

Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant le médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par le pharmacien. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications du médecin ou du pharmacien. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Coditussin® Pastilles bronchiques

Dr. Heinz Welti AG

Qu'est-ce que les Coditussin pastilles bronchiques et quand sont-elles utilisées?

Coditussin pastilles *bronchiques* contiennent le principe actif codéine. La codéine augmente l'excitabilité du centre de la toux, atténue ainsi le réflexe tussigène et diminue la fréquence des quintes de toux. Coditussin pastilles bronchiques sont indiquées pour atténuer la toux irritative lors de refroidissements.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Le tabagisme contribue à la constitution de la toux (toux du fumeur). Si vous fumez, vous pourrez renforcer l'effet des Coditussin pastilles bronchiques en renonçant à la consommation de tabac.

Quand les Coditussin pastilles bronchiques ne doivent-elles pas être utilisées?

Coditussin pastilles bronchiques ne doivent pas être utilisées dans les situations suivantes:

- d'hypersensibilité à la codéine ou à l'un des composants.
- d'intolérance au fructose (un trouble héréditaire rare affectant le métabolisme du glucose)
- dans la phase aiguë d'une crise d'asthme bronchique et autres états qui s'accompagnent d'une limitation sévère de la fonction respiratoire.



certaines inflammations intestinales (diverticulite) et dans les suites immédiates d'une intervention chirurgicale du tube digestif.

- dépendance aux substances qui sont apparentées à la codéine sur le plan chimique (les substances dites opioïdes).
- après une intervention chirurgicale gastro-intestinale.
- en cas d'obstruction du cardia, du pylore ou du duodénum.
- lors de la prise de certains médicaments traitant les troubles psychiques (médicaments dénommés inhibiteurs de la monoamine-oxidase (inhibiteurs de la MAO) en cas de dépression).
- au cours de la grossesse et de l'allaitement. Les femmes qui allaitent ne doivent pas prendre de codéine. La codéine peut nuire au nourrisson, car elle est excrétée dans le lait maternel.
- les médicaments à base de codéine pour traiter la toux et le refroidissement ne doivent pas être utilisés chez les enfants âgés de moins de 12 ans en raison du risque d'effets secondaires graves, y compris des troubles respiratoires.
- les patients de tout âge, qui sont connus pour être des «métaboliseurs ultrarapides», pouvant par conséquent convertir très rapidement la codéine en morphine, ne doivent pas utiliser la codéine pour traiter la toux et le refroidissement, car ils présentent un risque plus élevé d'effets indésirables graves liés à la codéine.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Coditussin pastilles bronchiques?

En cas de maladie hépatique ou rénale ou en cas de ralentissement de l'élimination du principe actif codéine dû à un facteur génétique, Coditussin pastilles bronchiques ne doit pas être pris sans prescription médicale par mesure de précaution.

Dépendance et abus

L'utilisation répétée d'opioïdes comme Coditussin pastilles bronchiques peut entraîner le développement d'une tolérance et d'une dépendance physique et/ou psychique ainsi que des abus. Une utilisation abusive de Coditussin pastilles bronchiques peut entraîner un surdosage potentiellement mortel. Si vous craignez de devenir dépendant de Coditussin pastilles bronchiques, consultez impérativement votre médecin.

Troubles respiratoires

L'utilisation de Coditussin pastilles bronchiques peut entraîner une respiration dangereusement lente ou superficielle (dépression respiratoire) et provoquer une éventuelle chute de la tension artérielle. Il se peut que votre état de conscience soit diminué, que vous vous sentiez somnolent ou que vous ayez l'impression que vous allez vous évanouir. Le cas échéant, veuillez consulter votre médecin. Coditussin pastilles bronchiques peut entraîner des troubles respiratoires associés au sommeil tels que l'apnée du sommeil (arrêt respiratoire pendant le sommeil) et une hypoxémie liée au sommeil (faible teneur en oxygène du sang). Les arrêts respiratoires durant le sommeil, les réveils nocturnes dus à un essoufflement, les troubles de la continuité du sommeil ou une somnolence excessive pendant la journée font partie des symptômes. Veuillez consulter votre médecin si vous ou un tiers observez ces symptômes. Votre médecin pourra envisager une diminution de la dose.

La codéine est déconseillée aux adolescents âgés de 12 à 18 ans qui souffrent de troubles respiratoires, car cette population de patients est plus sensible aux troubles respiratoires induits par la codéine dans certaines circonstances.

Exposition involontaire

L'administration par inadvertance de Coditussin pastilles bronchiques, en particulier chez les enfants, peut entraîner un surdosage mortel. Coditussin pastilles bronchiques doit être conservé hors de portée des enfants et les doses unitaires entamées ou non utilisées doivent être éliminées correctement.

Insuffisance surrénalienne



Des symptômes tels que faiblesse, fatigue, perte d'appétit, nausées, vomissements ou pression artérielle basse peuvent indiquer une production insuffisante de l'hormone cortisol par les glandes surrénales: il peut se révéler nécessaire de prendre un supplément d'hormones.

Affections hépatobiliaires

Si vous souffrez de maladies hépatiques et rénales ou s'il s'avère que l'ingrédient actif codéine est excrété plus lentement en raison d'une prédisposition héréditaire, vous ne devez prendre les pastilles bronchiques Coditussin qu'à titre de précaution sur ordonnance d'un médecin.

Diminution des niveaux d'hormones sexuelles et augmentation des concentrations de prolactine

L'utilisation à long terme d'opioïdes peut entraîner une diminution des niveaux d'hormones sexuelles et une augmentation des concentrations de l'hormone prolactine. Veuillez consulter votre médecin si vous constatez des symptômes tels qu'une diminution de la libido, un dysfonctionnement érectile ou une absence de menstruation (aménorrhée).

Douleurs abdominales / Inflammation du pancréas

Veuillez consulter votre médecin si vous ressentez une douleur intense dans la partie supérieure de l'abdomen qui peuvent éventuellement irradier dans le dos, des nausées, des vomissements ou de la fièvre, ces symptômes pouvant être liés à une inflammation du pancréas (pancréatite) ou des canaux biliaires.

Prise / Utilisation de Coditussin pastilles bronchiques avec d'autres médicaments

Veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser Coditussin pastilles bronchiques avec d'autres médicaments: L'utilisation concomitante Coditussin pastilles bronchiques avec de l'alcool ou d'autres médicaments susceptibles de vous rendre somnolent (comme les somnifères, les médicaments utilisés pour traiter l'épilepsie, les névralgies ou l'anxiété, certains médicaments contre les réactions allergiques (antihistaminiques) ou les tranquillisants (comme les benzodiazépines)) augmente le risque de réactions indésirables dangereuses pouvant être mortelles. Informez votre médecin de tous les médicaments que vous prenez et respectez exactement les recommandations de dosage de votre médecin.

Le risque d'effets secondaires augmente si vous utilisez Coditussin pastilles bronchiques en même temps que des antidépresseurs (comme les médicaments Citalopram, Duloxetin, Escitalopram, Fluoxetin, Fluvoxamin, Paroxetin, Sertralin, Venlafaxin, Amitriptylin, Clomipramin, Imipramin, Nortriptylin). Consultez votre médecin si les symptômes suivants surviennent: modifications de l'état de conscience (par ex. agitation, hallucinations, coma), rythme cardiaque rapide, tension artérielle instable, fièvre, renforcement des réflexes, coordination altérée, rigidité musculaire, symptômes gastro-intestinaux (par ex. nausées, vomissements, diarrhée).

Ce médicament peut affecter les réactions, l'aptitude à la conduite et l'aptitude à utiliser des outils ou des machines! Ceci est particulièrement valable lors de consommation concomitante de boissons alcoolisées.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique,
- vous prenez ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication)!

Coditussin pastilles bronchiques peuvent-elles être prises pendant la grossesse ou l'allaitement?

Coditussin pastilles bronchiques ne doivent pas être administrées au cours de la grossesse. Les femmes qui allaitent ne doivent pas prendre de codéine. La codéine peut nuire au nourrisson, car elle est excrétée dans le lait maternel.

Comment utiliser les Coditussin pastilles bronchiques?



Adulte et adolescent de plus de 12 ans: laisser fondre lentement dans la bouche 1 pastille toutes les 1 à 2 heures, toutefois au maximum 9 pastilles par jour. Si au décours d'un traitement de 5 – 7 jours, vous notez une persistance ou une recrudescence importante voire même une aggravation de votre toux, veuillez consulter un médecin afin que l'origine de la toux puisse être diagnostiquée et qu'un traitement adapté soit initié si besoin.

Veuillez-vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez-vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien.

Veuillez vous adresser à votre médecin si vous avez dépassé le dosage indiqué Coditussin pastilles bronchiques:

Un surdosage de Coditussin pastilles bronchiques peut provoquer une pathologie du cerveau (connue sous le nom de leucoencéphalopathie toxique).

Quels effets secondaires les Coditussin pastilles bronchiques peuvent-elles provoquer?

L'utilisation des Coditussin pastilles bronchiques peuvent provoquer les effets secondaires suivants:

On observe fréquemment une constipation, des troubles gastro-intestinaux ainsi qu'une fatigue et des maux de tête.

Occasionnellement, la prise de doses élevées peut donner lieu à des troubles visuels (vision trouble, strabisme), une chute de la tension artérielle (voiles noirs devant les yeux, vertiges), et des troubles respiratoires (respiration ralentie et superficielle).

Dans des rares cas, on note une perte de l'initiative, des sauts d'humeur, des troubles du sommeil, des bourdonnements d'oreille, des spasmes bronchiques, une sécheresse de la bouche et dans de très rares cas des réactions d'hypersensibilité (allergies) ou une euphorie. Les réactions allergiques se manifestent sous forme de démangeaisons, de rougeurs cutanées, d'une transpiration excessive, de palpitations et de malaises, pouvant, dans des cas isolés, aller jusqu'à l'évanouissement. La survenue de difficultés respiratoires soudaines ou d'une réaction d'hypersensibilité doit entraîner un arrêt immédiat du traitement et la consultation d'un médecin.

Fréquence inconnue (ne peut pas être estimée avec précision sur la base des données disponibles):

Dépendance, Troubles respiratoires (dépression respiratoire), arrêt respiratoire pendant le sommeil (apnée du sommeil), Symptômes associés à une inflammation du pancréas (pancréatite) et du système biliaire, tels que de fortes douleurs dans la partie supérieure de l'abdomen, qui peuvent éventuellement irradier dans le dos, des nausées, des vomissements ou de la fièvre.

En raison de la présence de l'édulcorant sorbitol, des ballonnements ou une légère diarrhée peuvent être observés lors de la prise de doses élevées, ceux-ci disparaissent lors de la diminution de la dose.

En ce qui concerne les effets indésirables survenant lors de la prise concomitante d'autres médicaments, veuillez vous référer à la rubrique «Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Coditussin pastilles bronchiques?».

Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

A quoi faut-il encore faire attention?

Conserver hors de portée des enfants.

Conserver à la température ambiante (15-25 °C) et à l'abri de la lumière.

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contiennent les Coditussin pastilles bronchiques?



Une pastille contient: le principe actif 5.0 mg de phosphate de codéine. Ce médicament contient des excipients supplémentaires tels que sorbitol, maltitol, colorant: caramel (E150), des arômes et ainsi que d'autres excipients.

Numéro d'autorisation

66331 (Swissmedic).

Où obtenez-vous les Ceditussin pastilles bronchiques? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

Peut être remis sans ordonnance médicale en pharmacie par un pharmacien après un conseil spécialisé personnalisé.

Emballages de 40 pastilles

Titulaire de l'autorisation

Dr. Heinz Welti AG, Gebenstorf.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en mars 2024 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

