

Avvertenza importante per l'impiego di oppioidi come Coditussin pastiglie bronchiali:

- **Dipendenza e abuso:** con l'impiego ripetuto di oppioidi come Coditussin pastiglie bronchiali possono verificarsi assuefazione e dipendenza fisica e/o psichica, nonché abuso.
- **Problemi respiratori:** con l'impiego di Coditussin pastiglie bronchiali la Sua respirazione può diventare pericolosamente lenta o superficiale e la pressione arteriosa può diminuire. In questo caso, si rivolga al Suo medico.
- **Impiego insieme ad alcolici o altri medicinali:** l'uso contemporaneo di Coditussin pastiglie bronchiali e alcolici o medicinali che possono indurre sonnolenza, aumenta il rischio di comparsa di effetti collaterali pericolosi, potenzialmente mortali.
- **Uso non intenzionale:** l'uso accidentale di Coditussin pastiglie bronchiali, specie nei bambini, può causare un sovradosaggio mortale.
- **Gravidanza:** l'uso prolungato di oppioidi in gravidanza può scatenare sintomi di astinenza nel neonato. Questi sintomi possono essere mortali se non vengono riconosciuti e trattati. (Coditussin pastiglie bronchiali non dev'essere usato in gravidanza, v. rubrica «Quando non si può assumere Coditussin pastiglie bronchiali?»).

Per ulteriori informazioni, consulti la rubrica «Quando è richiesta prudenza nell'uso di Coditussin pastiglie bronchiali?».

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni. Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia. Faccia uso corretto del medicamento o segua le indicazioni del suo medico o del suo farmacista, al fine di ottenere il maggior beneficio. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Coditussin® Pastiglie bronchiali

Dr. Heinz Welti AG

Che cosa sono le Coditussin pastiglie bronchiali e quando si usano?

Le Coditussin pastiglie bronchiali contengono come principio attivo la codeina, una sostanza che aumenta la soglia di stimolazione del centro della tosse, attenuando così lo stimolo a tossire e riducendo la frequenza degli attacchi.

Le Coditussin pastiglie bronchiali, sono da utilizzare per alleviare il sintomo della tosse stizzosa in caso di raffreddore.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Il fumo contribuisce allo sviluppo della tosse (tosse da fumatori). Se siete fumatori, potete favorire l'effetto delle Coditussin pastiglie bronchiali astenendovi dal fumo.

Quando non si possono usare le Coditussin pastiglie bronchiali?

Coditussin pastiglie bronchiali non devono essere impiegate nei seguenti casi:

- ipersensibilità nei confronti della codeina o di uno degli altri componenti;
- intolleranza al fruttosio (raro disturbo congenito del metabolismo degli zuccheri);
- attacco asmatico acuto o altre condizioni che si accompagnano a una grave limitazione delle funzioni respiratorie;



- determinate malattie intestinali di natura infiammatoria (diverticolite) o immediatamente dopo un intervento chirurgico all'intestino;
- dipendenza da sostanze chimicamente affini alla codeina (cosiddetti oppiacei);
- dopo interventi chirurgici a carico dell'apparato gastrointestinale;
- restringimento del cardias, del duodeno o del piloro;
- trattamento con determinati farmaci contro i disturbi dell'umore (cosiddetti inibitori MAO o inibitori delle monoammino-ossidasi) nelle depressioni;
- durante la gravidanza e l'allattamento. Donne che allattano non devono assumere la codeina. La codeina può nuocere al neonato, che la assume attraverso il latte materno.
- I medicinali a base di codeina per il trattamento della tosse e dei raffreddori non devono essere utilizzati nei bambini sotto i 12 anni per il rischio di forti effetti secondari gravi, compreso disturbi di respirazione.
- Pazienti di tutte le età, che sono conosciuti per avere un «metabolismo ultra rapido» possono per conseguenza convertire molto rapidamente la codeina in morfina. In questo caso non deve essere utilizzata la codeina per trattare la tosse e il raffreddore perché il rischio di effetti collaterali indesiderabili è troppo alto.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Coditussin pastiglie bronchiali?

In caso di abbondante produzione di muco bronchiale per prudenza non si dovrebbero assumere le Coditussin pastiglie bronchiali, in quanto, a causa dell'inibizione del riflesso della tosse, il muco bronchiale non può essere espettorato.

Dipendenza e abuso

Con l'impiego ripetuto di oppioidi come Coditussin pastiglie bronchiali possono verificarsi assuefazione e dipendenza fisica e/o psichica, nonché abuso. L'abuso di Coditussin pastiglie bronchiali può causare un sovradosaggio potenzialmente fatale e persino la morte. Se teme di poter sviluppare dipendenza nei confronti delle Coditussin pastiglie bronchiali, si rivolga assolutamente al Suo medico.

Problemi respiratori

Con l'impiego di Coditussin pastiglie bronchiali la Sua respirazione può diventare pericolosamente lenta o superficiale (depressione respiratoria) e la pressione arteriosa può diminuire. È possibile che il suo stato di coscienza sia compromesso, che accusi sonnolenza o che si senta vicino allo svenimento. In questo caso, si rivolga al Suo medico. Coditussin pastiglie bronchiali può causare disturbi respiratori del sonno come l'apnea notturna (interruzioni della respirazione durante il sonno) e ipossiemia del sonno (una minore quantità di ossigeno nel sangue). I sintomi comprendono apnea notturna, risveglio notturno per mancanza di respiro, interruzioni del sonno o eccessiva sonnolenza durante il giorno. Se Lei o un'altra persona dovesse osservare questi sintomi, si rivolga al Suo medico. Il Suo medico prenderà in considerazione una riduzione della dose.

La codeina è sconsigliata agli adolescenti dai 12 ai 18 anni che soffrono di disturbi alle vie respiratorie. La codeina in questo tipo di pazienti più sensibili può provocare ulteriori disturbi alle vie respiratorie.

Uso non intenzionale

L'uso accidentale di Coditussin pastiglie bronchiali, specie nei bambini, può causare un sovradosaggio mortale. Conservare le Coditussin pastiglie bronchiali fuori dalla portata dei bambini e provvedere allo smaltimento dei blister incominciati o inutilizzati secondo le prescrizioni del caso.

Insufficienza surrenalica

Debolezza, stanchezza, mancanza di appetito, nausea, vomito o pressione bassa possono essere sintomi che indicano che le ghiandole surrenali producono una quantità insufficiente dell'ormone cortisolo: in questo caso può essere necessario ricevere un'integrazione ormonale.

Malattie epatiche o renali



Se soffri di malattie epatiche e renali o se si scopre che il principio attivo codeina viene escreto più lentamente a causa di una predisposizione ereditaria, dovresti assumere Coditussin pastiglie bronchiali solo come precauzione su prescrizione medica.

Diminuzione degli ormoni sessuali e aumento della prolattina

L'impiego a lungo termine di oppioidi può causare una riduzione del livello degli ormoni sessuali e un aumento del livello dell'ormone prolattina. Contatti il Suo medico, se compaiono sintomi come diminuzione del desiderio sessuale, impotenza o assenza di mestruazioni (amenorrea).

Dolori addominali / infiammazione del pancreas

Si rivolga al Suo medico, se compaiono forti dolori nella parte alta dell'addome che possono irradiarsi anche alla schiena, nausea, vomito o febbre, poiché potrebbe trattarsi di sintomi di un'infiammazione del pancreas (pancreatite) e delle vie biliari.

Assunzione/impiego di Coditussin pastiglie bronchiali con altri medicinali

Consulti il Suo medico prima di prendere le Coditussin pastiglie bronchiali con altri medicinali. L'uso contemporaneo di Coditussin pastiglie bronchiali con alcolici o medicinali che possono indurre sonnolenza (p.es. sonniferi, medicinali per il trattamento dell'epilessia, di dolori ai nervi o di stati d'ansia, alcuni medicinali contro le reazioni allergiche (antistaminici) o calmanti (come p.es. le benzodiazepine), aumenta il rischio della comparsa di pericolosi effetti collaterali che possono essere mortali. Informi il Suo medico di tutti i medicinali che sta prendendo e assuma esattamente le dosi prescritte dal Suo medico.

Il rischio di effetti collaterali aumenta, se prende le Coditussin pastiglie bronchiali insieme ad antidepressivi (come citalopram, duloxetina, escitalopram, fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina, sertralina, venlafaxina, amitriptilina, clomipramina, imipramina, nortriptilina). Si rivolga al Suo medico se compaiono i sintomi seguenti: alterazioni dello stato di coscienza (p.es. agitazione, allucinazioni, coma), battito cardiaco accelerato, pressione arteriosa instabile, febbre, riflessi aumentati, compromissione della coordinazione, rigidità muscolare, sintomi gastrointestinali (p.es. nausea, vomito, diarrea).

Questo farmaco può compromettere le capacità di reazione, di guidare veicoli e di azionare apparecchiature o macchinari. Ciò vale in misura maggiore con l'assunzione concomitante di bevande alcoliche.

Informi il suo medico o il suo farmacista nel caso in cui:

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume o applica esternamente altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!)

Si può assumere le Coditussin pastiglie bronchiali durante la gravidanza o l'allattamento?

Le Coditussin pastiglie bronchiali non devono essere assunte durante la gravidanza. Donne che allattano, non devono assumere la codeina. Questa può nuocere al neonato che la può assumere attraverso il latte materno.

Come usare le Coditussin pastiglie bronchiali?

Adulti e bambini a partire dai 12 anni di età: lasciar sciogliere in bocca 1 pastiglia ogni 1 – 2 ore (dose massima: 9 pastiglie al giorno). Qualora, dopo 5 – 7 giorni di trattamento, la tosse non sia scomparsa o non si sia attenuata in modo considerevole, o sia addirittura peggiorata, è necessario consultare un medico per chiarire l'origine della tosse ed avviare eventualmente una terapia mirata.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole oppure troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Se ha assunto più Coditussin pastiglie bronchiali di quanto doveva, si rivolga a un medico:

Il sovradosaggio di Coditussin pastiglie bronchiali i può scatenare una malattia del cervello (nota come leucoencefalopatia tossica).



Quali effetti collaterali possono avere le Coditussin pastiglie bronchiali?

In seguito all'applicazione delle Coditussin pastiglie bronchiali possono essere osservati i seguenti effetti collaterali:

Frequentemente possono verificarsi stitichezza e disturbi dell'apparato gastrointestinale, nonché fiacchezza o mal di testa. Occasionalmente dosi più elevate possono comportare disturbi della vista (difficoltà di messa a fuoco, strabismo), calo della pressione arteriosa (oscuramento della vista, capogiri) e difficoltà respiratorie (respiri rallentati e superficiali). In casi rari si possono verificare apatia, sbalzi d'umore, disturbi del sonno, ronzio nelle orecchie, spasmo bronchiale, secchezza delle fauci e in casi molto rari reazioni di ipersensibilità (allergie) o euforia. Le reazioni allergiche, che si manifestano con prurito, arrossamento della cute, sudorazione, palpitazioni e malessere, possono in casi isolati portare fino a perdere coscienza. Se si verificano improvvisamente difficoltà respiratorie o reazioni di ipersensibilità, sospendere immediatamente il farmaco e consultare un medico.

Frequenza sconosciuta (non può essere stimata in base ai dati disponibili):

Tossicodipendenza, problemi respiratori (depressione respiratoria), interruzioni respiratorie durante il sonno (apnea notturna), sintomi legati all'infiammazione del pancreas (pancreatite) e del sistema del dotto biliare, come forte dolore nella parte superiore dell'addome che può irradiarsi alla schiena, nausea, vomito o febbre.

Il dolcificante sorbitolo a dosi elevate può verificare episodi di flatulenza o lieve diarrea, che comunque scompaiono con la riduzione del dosaggio.

Per gli effetti collaterali in caso di assunzione concomitante di altri farmaci, consultare: «Quando è richiesta prudenza nell'uso di Coditussin pastiglie bronchiali?»

Se osserva effetti collaterali qui non descritti dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

Conservare il farmaco fuori della portata dei bambini!

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C) e al riparo della luce.

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Il medico o il farmacista che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contengono le Coditussin pastiglie bronchiali?

1 pastiglia contiene: il principio attivo Codeina fosfato 5,0 mg. Questo prodotto contiene sostanze eccipienti quali sorbitolo, maltitolo, colorante: caramello (E150), aromi e altre sostanze ausiliarie.

Numero dell'omologazione

66331 (Swissmedic).

Dove sono ottenibili le Coditussin pastiglie bronchiali? Quali confezioni sono disponibili?

Disponibile nelle farmacie senza prescrizione medica ma previa consulenza specialistica delle/del farmacista.

Confezioni da 40 pastiglie

Titolare dell'omologazione

Dr. Heinz Welti AG, Gebenstorf.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel marzo 2024 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

