

Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant le médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par le pharmacien ou le droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications du médecin, du pharmacien ou du droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Santasapina®

Sirop sans alcool en cas de toux

Médicament phytothérapeutique

Qu'est-ce que Santasapina et quand est-il utilisé?

Santasapina est un sirop béchique sans alcool à base d'extrait de bourgeons frais de sapin rouge (épicéa), de concentré de poires, de sucre de canne intégral et de miel. Santasapina peut être utilisé en cas de toux avec mucosités tenaces due à un refroidissement et consécutive à une bronchite aiguë ou de catarrhe des voies respiratoires.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si la toux persiste plus de sept jours, consulter un médecin.

Informations pour diabétiques:

Teneur en glucides : 10.3 g/10 ml 10 ml = 180 kJ (42 kcal) = 1,0 VP (0,9 UP)

Quand Santasapina ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution?

Chez les enfants de moins de 2 ans, Santasapina (comme tous les sirops pour la toux) ne doit être utilisé que sur avis médical. Santasapina ne convient pas en cas d'hypersensibilité connue à l'un ou à plusieurs de ses composants, ainsi que lors d'asthme ou de coqueluche. Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, si vous souffrez d'une autre maladie, vous êtes allergique ou vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication)!

Santasapina peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et la période d'allaitement ou demander l'avis du médecin, du pharmacien ou du droguiste.

Comment utiliser Santasapina?

Enfants de 2 à 10 ans : 5 ml 1 à 2 fois par jour, enfants de 10 à 16 ans : 10ml 2 à 4 fois par jour, adultes : 15 ml 2 à 4 fois par jour, à prendre en se servant de la mesurette incluse. A prendre de préférence avant les repas. Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.



Quels effets secondaires Santasapina peut-il provoquer?

L'emploi approprié du médicament n'a donné lieu à aucun effet secondaire attesté à ce jour. Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

A quoi faut-il encore faire attention?

Le sirop doit être conservé à température ambiante (15 – 25° C) et hors de portée des enfants.

Santasapina ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient. Les emballages périmés ou non utilisés intégralement devront être rapportés au pharmacien ou au droguiste, qui se chargera de leur élimination. Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient Santasapina?

15ml de Santasapina contiennent : extrait mou (Extr. spiss.) de bourgeons frais de sapin rouge (épicéa) 4.3 g (DER 0.9-1.2:1), agent d'extraction: eau. Cette préparation contient en outre des excipients, dont du sucre de canne brut 7.8 g, du miel 4.9 g et du concentré de poires 3.9 g, ainsi que des substances aromatisantes.

Numéro d'autorisation

53839 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Santasapina? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale, en flacons de 200 ml.

Titulaire de l'autorisation

A.Vogel SA, CH-9325 Roggwil

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en novembre 2004 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

